

Epidemiología y prevención del VPH en Pediatría y Atención Primaria

Comenzado el	lunes, 2 de marzo de 2020, 20:56
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 2 de marzo de 2020, 21:40
Tiempo empleado	43 minutos 28 segundos
Puntos	17,00/20,00
Calificación	8,50 de 10,00 (85%)

Pregunta 1

Incorrecta

Puntuación 0,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

¿Recomendaría vacunarse frente al VPH a una mujer con una prueba de VPH positiva?

Seleccione una:

- a. a) Sí. La vacuna no tiene ningún efecto terapéutico, pero le puede conferir inmunidad para aquellos tipos vacunales para los que todavía no esté infectada.
- b. a) Sí. Quedaría inmunizada igualmente frente a los tipos vacunales que contiene. La eficacia de la vacuna es independiente de una infección previa.
- c. a) No. La vacuna no sería perjudicial pero tampoco le causaría ningún efecto beneficioso al ya estar infectada por el VPH.

Retroalimentación

Respuesta incorrecta.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la indicación de las vacunas de VPH?

Seleccione una:

- a. Profiláctica frente a nuevas infecciones de VPH
- b. Terapéutica frente a infecciones y/o lesiones prevalentes
- c. Ambas indicaciones

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación con la papilomatosis respiratoria recurrente (PRR) es la correcta?

Seleccione una:

- a. La papilomatosis respiratoria recurrente es una infección de las vías respiratorias por el VPH, que se producen principalmente en los niños menores de 10 años de edad.
- b. La papilomatosis respiratoria recurrente está causada principalmente por los tipos 6 y 11 del VPH.
- c. Ambas respuestas son correctas.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

Muchas mujeres adquieren una infección por VPH, pero la gran mayoría de estas infecciones no progresan a cáncer de cérvix. Así pues, probablemente otros co-factores intervienen en el proceso patológico.

¿Cuáles de estos co-factores han sido establecidos en la carcinogénesis cervical?

Seleccione una:

- a. Dieta rica en grasas saturadas y el uso de algunos fármacos.
- b. Antecedentes familiares y ser fumadora.
- c. Alta paridad, uso a largo plazo de anticonceptivos orales, ser fumadora y co-infección por otros agentes de transmisión sexual.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

¿Una mujer ya vacunada, es necesario que continúe acudiendo al cribado de cáncer de cuello uterino?

Seleccione una:

- a. Sí, a los 5 años de la vacunación se le hará una prueba de VPH. Si esta es negativa ya no hace falta que continúe con el cribado.
- b. No, porque al estar vacunada, la probabilidad de infección por VPH es muy baja.
- c. Sí, porque la vacuna no protege contra todos los tipos de VPH.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 6

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

¿Está recomendada la vacunación en España para una mujer de 33 años con una vida sexualmente activa y con pruebas de cribado negativas?

Seleccione una:

- a. No, porque las recomendaciones de vacunación en España y en Europa no incluyen a mujeres mayores de 26 años.
- b. Sí, porque la vacuna es también eficaz en mujeres adultas.
- c. No, porque la vacuna sólo es eficaz en niñas de 9 a 14 años de edad.

Retroalimentación

Respuesta incorrecta.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

¿Qué afirmación es cierta sobre la mortalidad por cáncer de cuello uterino?

Seleccione una:

- a. La tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino es mucho más baja respecto a la incidencia.
- b. El cáncer de cuello uterino afecta a mujeres relativamente jóvenes por lo que representa una importante causa de años potenciales de vida perdidos.
- c. Ambas respuestas son ciertas.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

Seleccione una:

- a. A medida que disminuye la severidad de las lesiones, también aumenta el papel del VPH del tipo 16.

b. A medida que se incrementa la severidad de las lesiones, también aumenta el papel del VPH del tipo 16.

c. La proporción del tipo 16 del VPH es similar en las mujeres con lesiones precancerosas que en las mujeres con cáncer de cuello uterino.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

¿Está la mujer protegida con una sola dosis de vacuna?

Seleccione una:

a. Por el momento no existen pruebas suficientes de que con una sola dosis la mujer quede totalmente protegida.

b. Sí, pero sólo en aquellas mujeres menores de 20 años, ya que su sistema inmunitario es mucho más eficaz que el de las mujeres mayores a esa edad.

c. No, con una sola dosis el sistema inmunológico no tiene el tiempo suficiente para generar anticuerpos contra los tipos que incluye la vacuna.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 10

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

¿Qué comportamientos aumentan el riesgo de exposición al VPH?

Seleccione una:

a. Tener nuevas parejas sexuales e Iniciación sexual a una edad temprana.

b. La paridad y el uso a largo plazo de anticonceptivos hormonales.

c. Todas las anteriores.

Retroalimentación

Respuesta incorrecta.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

¿Según datos de incidencia del 2012, cuántos casos se estiman que fueron causados por VPH?

Seleccione una:

- a. 630.000 casos
- b. 100.000 casos
- c. 530.000 casos

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

¿Cómo definiría el papel del VPH en la etiología del cáncer de cuello uterino?

Seleccione una:

- a. Es necesario haber sido infectado por VPH para desarrollar cáncer de cuello uterino pero solo un porcentaje de estas infecciones progresaran a cáncer.
- b. El VPH puede causar cáncer de cuello uterino pero una mujer no infectada también puede desarrollar cáncer.
- c. El VPH no es una causa para el desarrollo del cáncer de cuello uterino, sino una consecuencia de la inmunosupresión asociada a cáncer.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas afirmaciones **NO** es la correcta?

Seleccione una:

a.

La mayoría de las infecciones en las mujeres jóvenes no desaparecen.

b.

Las infecciones por VPH, que persisten durante 2 o más años están altamente vinculadas a las lesiones precancerosas.

c.

El cáncer de cuello uterino es el resultado final de una cadena de eventos que pueden tardar más de 10 años en desarrollarse.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

Aunque los tipos del VPH 16, 18 y 45 son los más frecuentes en los casos de cáncer de cuello uterino, su distribución varía de manera significativa entre el carcinoma de células escamosas (CEC) y el adenocarcinoma (ADC).

¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

Seleccione una:

a. Los tipos del VPH 18 y 45 se encuentran con mayor frecuencia en los adenocarcinomas que en carcinomas de células escamosas.

b. Los tipos del VPH 18 y 45 se detectan con mayor frecuencia en los CEC's que en los adenocarcinomas.

c. Los tipos del VPH 18 y 45 se detectan con igual frecuencia en los CEC's que en los adenocarcinomas.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

¿Se puede vacunar a las mujeres embarazadas?

Seleccione una:

- a. No, porque los datos que existen son insuficientes para recomendar el uso de la vacuna durante el embarazo.
- b. Sí, la evidencia científica demuestra que no hay ningún peligro ni para la madre ni para el feto.
- c. No, porque la evidencia científica ha demostrado que hay más riesgo de aborto y anomalías congénitas.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

¿Cuántas dosis y cada cuanto tiempo se recomienda administrar la vacuna del VPH?

Seleccione una:

- a. De manera generalizada, en personas de 9 a 14 años se recomiendan dos dosis distanciadas en un intervalo de 6 meses. A partir de los 15 años de edad se recomiendan 3 dosis, siguiendo la pauta de 0, 2 y 6 meses para Gardasil 4 y 9 y la pauta de 0, 1 y 6 meses para Cervarix.
- b. A partir de los 9 años de edad se recomiendan 3 dosis siguiendo la pauta de 0, 2 y 6 meses para Gardasil 4 y 9 y la pauta de 0,1 y 6 meses para Cervarix.
- c. En menores de 15 años se recomiendan dos dosis distanciadas en un intervalo de un año. De 15 años en adelante se recomiendan 3 dosis, siguiendo la pauta de 0, 2 y 6 meses para Gardasil 4 y Cervarix y la pauta de 0, 1 y 6 meses para Gardasil 9.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

¿Se podría vacunar a una paciente con VIH?

Seleccione una:

- a. Sí se podría vacunar. El hecho de estar infectada por el VIH no representa, en ningún caso, una contraindicación para la vacuna frente al VPH.
- b. No se recomienda la administración de la vacuna en pacientes VIH positivos, pues se ha establecido que no se segura.
- c. No, no se podría vacunar en ningún caso, porque en personas inmunodeprimidas, el riesgo de quedar infectadas por los tipos del VPH que contiene la vacuna es muy alto

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

¿Para qué sirve la vacuna frente el VPH?

Seleccione una:

- a. Es una vacuna diseñada principalmente para tratar las displasias cervicales intraepiteliales de alto grado (CIN 2/3) y el carcinoma cervical relacionado causalmente con diferentes tipos de VPH.
- b. Es una vacuna diseñada principalmente para sustituir, a lo largo del tiempo, los programas de cribado de cáncer de cuello uterino.

c. Es una vacuna para proteger contra las lesiones precancerosas en el cuello uterino, la vulva, la vagina y el ano y los cánceres cervicales y anales causados por tipos específicos del VPH

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas afirmaciones es la correcta?

Seleccione una:

- a. La vacuna bivalente es la única que puede prevenir la aparición de verrugas genitales
- b. Las vacunas VPH no sirven para prevenir las verrugas genitales
- c. Las vacunas tetravalente y nonavalentes son las únicas vacunas que pueden prevenir la aparición de verrugas genitales

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

Seleccione una:

- a. Aproximadamente el 60% de los cánceres de cavidad oral y de orofaringe son atribuibles al VPH.
- b. Aproximadamente el 25% de los cánceres de vulva y el 80% de cánceres de vagina son atribuibles al VPH.
- c. Aproximadamente el 100% de los cánceres de pene y el 40% de los cánceres anales son atribuibles al VPH.

Retroalimentación

Respuesta correcta