

EXPERTO UNIVERSITARIO EN EL MANEJO DEL POLITRAUMATIZADO PARA ENFERMERÍA (NXT31)

Área personal > MÁSTERES, ESPECIALISTAS Y EXPERTOS > ENFERMERÍA >
EXPERTOS 20 ECTS NEBRIJA > NXT31 > UNIDAD 3 > TEST UNIDAD 3

Comenzado el	sábado, 2 de octubre de 2021, 12:31
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 2 de octubre de 2021, 14:54
Tiempo empleado	2 horas 22 minutos
Puntos	83,00/100,00
Calificación	8,30 de 10,00 (83%)
Comentario -	EXCELENTE

Pregunta 1

Correcta

Puntuaje 1,00 sobre 1,00

199.- Cuando en un traumatismo raquímedular se produce parálisis y pérdida de sensibilidad profunda ipsilateral junto con pérdida contralateral de la sensibilidad para el dolor y temperatura, sospechamos:

Seleccione una:

- a. Hemisección medular o síndrome de Brown – Sequard. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Síndrome medular anterior.
- c. Síndrome medular posterior.
- d. Síndrome medular central.

Pregunta 2

Correcta

Puntuaje 1,00 sobre 1,00

251.- Ante un traumatismo abdominal cerrado y con estabilidad hemodinámica realizaremos:

Seleccione una:

- a. ECO.
- b. Rx.
- c. TAC.
- d. A y c son verdaderas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

146.- ¿Qué tipo de hematomas son producto de los mecanismos de golpe y contragolpe?

Seleccione una:

- a. Epidurales
- b. Subdurales
- c. Intraparenquimatosos ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Subaracnoideas

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

200.- En la exploración neurológica de la función medular debemos realizar:

Seleccione una:

- a. Valoración de sensibilidad y fuerza muscular.
- b. Valoración de la función de los segmentos medulares sacros y disfunción autonómica.
- c. Palpación de la columna vertebral en sentido craneocaudal.
- d. A y b son verdaderas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

233.- El diagnóstico definitivo de un neumotórax es por:

Seleccione una:

- a. Clínica.
- b. TAC.
- c. Rx. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Todas las anteriores son falsas.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

271.- La prioridad de atención a una embarazada que sufre un traumatismo es:

Seleccione una:

- a. Primero la madre. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Primero el estado circulatorio del feto.
- c. Primero el feto.
- d. Todas las anteriores son verdaderas.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

184.- El tratamiento de las fracturas faciales que no afectan al cóndilo, la fijación debe de ser:

Seleccione una:

- a. 3-4 semanas.
- b. 4-6 semanas.
- c. 1-2 semanas. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. 6-7 semanas.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

261.- El tórax del niño debe bajar en el masaje cardiaco en un:

Seleccione una:

- a. 1/2 de la profundidad.
- b. 1/5 de la profundidad.
- c. 1/3 de la profundidad. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Da igual la profundidad.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

264.- Una de las características especiales del TCE en niños respecto de los adultos es:

Seleccione una:

- a. Menos susceptible a la hipoxia.
- b. A partir de 3 años peor pronóstico.
- c. Menor tolerancia de las masas intracraneales.
- d. Mayor tendencia al edema cerebral. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 10

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

154.- ¿Dónde se realiza la punción para la vía intraósea en menores de 6 años?

Seleccione una:

- a. Maleolo interno ✗ Mal, debes repasar un poco
- b. Cresta iliaca
- c. Esternón
- d. Tibia proximal

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

173.- Según protocolo de TCE el TAC debe de realizarse:

Seleccione una:

- a. Al ingreso, a las 24 horas y 7 días después.
- b. Al ingreso, a las 48 horas y 7 días después. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Al ingreso, a las 24 horas y 8 días después.
- d. Al ingreso, a las 48 horas y 8 días después.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

262.- La correcta colocación del tubo en el niño se comprueba mediante:

Seleccione una:

- a. Auscultación.
- b. Simetría de movimientos.
- c. Tirando un poco del tubo.
- d. A y b son verdaderas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

254.- La causa más frecuente en el traumatismo abdominal de la embarazada de muerte fetal es:

Seleccione una:

- a. Rotura uterina.
- b. Desprendimiento de placenta. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. CID.
- d. Contracciones uterinas.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

203.- Son signos de disfunción autonómica:

Seleccione una:

- a. Priapismo. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Afectación del reflejo bulbocavernoso.
- c. Afectación de la sensibilidad perianal.
- d. Respiración paradójica.

Pregunta 15

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

177.- La intubación nasotraqueal ante un traumatismo maxilofacial se realizará a excepción de que tenga una lesión:

Seleccione una:

- a. Traumatismo facial severo.
- b. Fractura mandibular.
- c. Fractura de malar.
- d. A y b son verdaderas. **✗** Mal, debes repasar un poco

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

263.- En el traumatismo craneoencefálico del niño es característica la tríada de:

Seleccione una:

- a. Cushing. **✓** ¡Bien, correcto!
- b. Beck.
- c. Truth.
- d. Holver.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

220.- Para la reducción de la fractura de Colles se debe realizar una férula dorsal de yeso cuya longitud será igual a la distancia entre:

Seleccione una:

- a. Entre el codo y la muñeca.
- b. Entre el olecrano y la punta de los dedos.
- c. Entre el olecrano y la cabeza de los metacarpianos. **✓** ¡Bien, correcto!
- d. Todas las anteriores son falsas.

Pregunta 18

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

253.- Cuando nos encontramos hematomas vesicales y perivesicales en un traumatismo vesical estamos ante:

Seleccione una:

- a. Rotura vesical. **✗** Mal, debes repasar un poco
- b. Contusión vesical.
- c. Rotura intraperitoneal.
- d. Rotura extraperitoneal.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

156.- Las quemaduras que tienen un aspecto carbonáceo y blanco nacarado son:

Seleccione una:

- a. Subdérmicas profundas (tipo IV)
- b. Subdérmicas superficiales (tipo III) ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Dérmicas profundas tipo IIb
- d. Dérmicas superficiales (tipo IIa)

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

234.- El tratamiento del neumotórax a tensión es descompresión mediante punción en:

Seleccione una:

- a. 2º espacio intercostal línea media clavicular. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. 3º espacio intercostal línea media clavicular.
- c. 2º espacio intercostal línea media axilar.
- d. 3º espacio intercostal línea media axilar.

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

209.- Ante una fractura de C1 la tratamos con:

Seleccione una:

- a. Tracción con peso.
- b. Elevación mandibular.
- c. Collarín tipo Philadelphia. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Cirugía.

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

181.- Cuando procedemos a la exploración del conducto auditivo externo debemos valorar:

Seleccione una:

- a. Sangre o LCR.
- b. Heridas en pabellón.
- c. Otoposmatoma.
- d. Todas las anteriores son verdaderas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

247.- Para realizar la paracentesis generalmente se utiliza un calibre de aguja de punción lumbar del:

Seleccione una:

- a. 16 F.
- b. 18 F. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. 20 F.
- d. 22 F.

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

207.- El TAC de columna vertebral permite visualizar:

Seleccione una:

- a. Rotura de ligamento.
- b. Lesión medular espinal.
- c. Todas las vértebras cervicales. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Hernias discales traumáticas.

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

152.- ¿Con qué aguja y dónde se realiza la punción en la toracocentesis?

Seleccione una:

- a. Aguja 18G, 2º espacio intercostal, línea paraesternal
- b. Aguja 14G, 2º espacio intercostal, línea medioclavicular ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Aguja 16G, 3º espacio intercostal, línea medioclavicular
- d. Aguja 20G, 5º espacio intercostal, línea medioaxilar

Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

197.- El examen neurológico incluido en la evaluación primaria consta de:

Seleccione una:

- a. Valoración del nivel de conciencia.
- b. Evaluación del tamaño, simetría y reactividad pupilar.
- c. Estudiar posibles síntomas de focalidad neurológica.
- d. Todas las anteriores son verdaderas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

216.- En la luxación de hombro con una fractura de troquíter asociada se engloba en:

Seleccione una:

- a. Grupo II.
- b. Grupo IV. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Grupo VI.
- d. Grupo V.

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

171.- Cuando un paciente con TCE presenta hipertensión intracraneal con GCS < 9 el tratamiento inicial debe de ser agresivo, a base de:

Seleccione una:

- a. Hiperventilación.
- b. Administración de Manitol.
- c. Adecuado control hemodinámico.
- d. Todas las anteriores son verdaderas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

195.- Hemos de sospechar traumatismo raquímedular en las siguientes situaciones:

Seleccione una:

- a. Traumatizado inconsciente con TCE.
- b. Traumatizado en un accidente de tráfico.
- c. Traumatizado en situación de shock.
- d. Todas las anteriores son verdaderas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 30

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

168.- En el manejo del paciente con TCE es prioritario:

Seleccione una:

- a. Asegurar una adecuada oxigenación, ventilación y estado circulatorio.
- b. Diagnosticar las diferentes lesiones intracraneales mediante técnicas de imagen.
- c. Aplicar tratamiento neuroquirúrgico.
- d. Realizar la exploración física completa del paciente. ✗ Mal, debes repasar un poco

Pregunta 31

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

267.- Los factores de riesgo para que un niño sufra malos tratos son:

Seleccione una:

- a. Edad.
- b. Familiares.
- c. Sociales.
- d. B y c son verdaderas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 32

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

211.- En un 20% de los traumatismos raquimedulares se producen unas alteraciones que son:

Seleccione una:

- a. Hemorragias intestinales. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Desnutrición.
- c. Ulceras por decúbito.
- d. Todas las anteriores son verdaderas.

Pregunta 33

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

255.- Normalmente la tráquea del niño es menor que la del adulto. La del adolescente mide:

Seleccione una:

- a. 8 cm.
- b. 9 cm.
- c. 10 cm.
- d. 12 cm. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 34

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

202.- La exploración de la función de los segmentos medulares sacros incluye:

Seleccione una:

- a. Exploración de reflejos osteotendinosos.
- b. Valoración del tono del esfínter rectal mediante tacto rectal. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Exploración de sensibilidad dolorosa.
- d. Valoración del priapismo.

Pregunta 35

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

250.- Si tenemos una herida abdominal penetrante estable por arma de fuego, su actitud es:

Seleccione una:

- a. Laparotomía. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Punción lavado peritoneal.
- c. Observación.
- d. Todas las anteriores son falsas.

Pregunta 36

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

172.- ¿Cuál sería, según se indica en el temario, el método de monitorización de la PIC más utilizado?:

Seleccione una:

- a. Sensor epidural.
- b. Catéter intraventricular. ✗ Mal, debes repasar un poco
- c. Microsensor intraparenquimatoso.
- d. Todas las anteriores.

Pregunta 37

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

281.- La causa más común de muerte fetal en traumatismos cerrados son

Seleccione una:

- a. Muerte de la madre.
- b. Shock materno.
- c. Desprendimiento placentario. ✗ Mal, debes repasar un poco
- d. Todas las anteriores son verdaderas.

Pregunta 38

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

182.- Cuando tenemos una herida en la región frontal y superciliar lo que no debemos hacer es:

Seleccione una:

- a. Rasurar las cejas. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Poner anestesia.
- c. Suturar la zona.
- d. Todas las anteriores son verdaderas.

Pregunta 39

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

266.- Ante una herida pequeña de la piel a nivel abdominal tendremos que:

Seleccione una:

- a. Desinfectar.
- b. No darle importancia.
- c. Puede haber una lesión superficial.
- d. Puede haber una lesión severa. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 40

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

210.- Cuando se produce una hiperreflexión autonómica la afectación medular es por encima de:

Seleccione una:

- a. L5.
- b. C6.
- c. D7. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. D3.

Pregunta 41

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

228.- La localización del síndrome compartimental es en cualquier lugar de la pierna pero más frecuente en:

Seleccione una:

- a. Región anterior.
- b. Región posterior.
- c. Región inferior.
- d. A y c son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 42

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

249.- Si tenemos una lesión penetrante con pérdida de tejido sin invasión peritoneal; laceración superficial de un órgano peritoneal es:

Seleccione una:

- a. Traumatismo abdominal penetrante severo.
- b. Traumatismo abdominal penetrante crítico.
- c. Traumatismo abdominal penetrante moderado. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Traumatismo abdominal penetrante leve.

Pregunta 43

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

248.- En la punción lavado peritoneal se considera positivo cuando el recuento de hematíes es de:

Seleccione una:

- a. > 50.000 ml. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. > 5.000 ml.
- c. > 500 ml.
- d. > 50 ml.

Pregunta 44

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

158.- Definimos Traumatismo Craneoencefálico como:

Seleccione una:

- a. Traumatismo craneal que genera algún tipo de hemorragia.
- b. Todo golpe en la cabeza.
- c. Traumatismo craneal que genera algún trastorno neurológico o de la conciencia. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. A y c son verdaderas.

Pregunta 45

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

243.- Signos de rotura esofágica son:

Seleccione una:

- a. Enfisema cervical.
- b. Neumomediastino.
- c. Derrame pleural.
- d. Todas las anteriores son verdaderas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 46

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

246.- Un tipo de proyección radiográfica nos puede ayudar a detectar presencia de neumoperitoneo:

Seleccione una:

- a. Frontal.
- b. Anteroposterior.
- c. Latero-lateral. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Todas las anteriores son verdaderas.

Pregunta 47

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

241.- El lavado peritoneal se utiliza en el traumatismo diafragmático para:

Seleccione una:

- a. Ver si existe lesión de vesícula.
- b. Ver si existe lesión pulmonar.
- c. Ver si hay lesión toraco-abdominal.
- d. Todas las anteriores son falsas. **✗** Mal, debes repasar un poco

Pregunta 48

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

245.- El principal mecanismo lesional en caídas o precipitaciones es:

Seleccione una:

- a. Aceleración.
- b. Desaceleración.
- c. Impacto. **✗** Mal, debes repasar un poco
- d. Todas las anteriores son falsas.

Pregunta 49

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

221.- El sitio más común de las fracturas del escafoides es:

Seleccione una:

- a. Mitad proximal.
- b. Mitad dista.
- c. Cuello. **✓** ¡Bien, correcto!
- d. Diáfisis.

Pregunta 50

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

224.- El método Simson se utiliza:

Seleccione una:

- a. Como primer tratamiento.
- b. Como tratamiento conservador.
- c. Se utiliza cuando no puede administrarse anestesia general. **✓** ¡Bien, correcto!
- d. A y b son verdaderas.

Pregunta 51

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

239.- Ante un traumatismo aórtico el 80-90% de la localización de la rotura es:

Seleccione una:

- a. Aorta abdominal.
- b. Aorta con femoral.
- c. Istmo aórtico. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Todas las anteriores son falsas.

Pregunta 52

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

215.- Las subluxaciones esternoclaviculares se producen generalmente por:

Seleccione una:

- a. Formación espontánea.
- b. Por caídas.
- c. Por golpes.
- d. B y c son verdaderas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 53

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

206.- La fractura de apófisis odontoides:

Seleccione una:

- a. Se produce por mecanismos de flexión o extensión bruscos o importantes de cuello. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. La fractura tipo I se localiza a nivel de la base de apófisis odontoides.
- c. La fractura tipo II afecta al cuerpo vertebral de C2.
- d. La fractura tipo II se sitúa por encima de la base del odontoides.

Pregunta 54

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

188.- La confirmación de la fractura del arco zigomático se realiza mediante:

Seleccione una:

- a. Radiografía en posición de Hirsch. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Con RNM.
- c. Palpación .
- d. Todas las anteriores son falsas.

Pregunta 55

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

167.- Se considera que un TCE tiene categoría de grave cuando presenta:

Seleccione una:

- a. Glasgow menor o igual a 8 puntos. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Glasgow mayor de 9 puntos.
- c. Hematoma o scalp de cuero cabelludo.
- d. Convulsiones postraumáticas.

Pregunta 56

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

149.- La conmoción medular es una alteración funcional traumática transitoria que revierte a las:

Seleccione una:

- a. 12 horas
- b. 24 horas
- c. 36 horas
- d. 48 horas ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 57

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

190.- La triada clásica de las fracturas de suelo de órbita es:

Seleccione una:

- a. Diplopía, HIC e hipoestesia del nervio infraorbitario.
- b. Diplopía, enoftalmos e hipoestesia del nervio infraorbitario. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Diplopía, exoftalmos e hipoestesia del nervio infraorbitario.
- d. Diplopía, aumento de la grasa ocular e hipoestesia del nervio infraorbitario.

Pregunta 58

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

178.- En las exploraciones complementarias una de las más importantes para el diagnóstico de senos maxilares, orbitas y de los arcos zigomáticos es:

Seleccione una:

- a. Proyección de Hirtz.
- b. Proyección de Hiss.
- c. Proyección de Waters. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Todas las anteriores son falsas.

Pregunta 59

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

176.- En la clasificación de los tejidos blandos por traumatismos faciales encontramos las lesiones subdérmicas que son:

Seleccione una:

- a. Abrasiones y quemaduras de 1º grado.
- b. Abrasiones y quemaduras de 2º grado.
- c. Laceraciones y quemaduras de 3º grado. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Todas las anteriores son falsas.

Pregunta 60

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

196.- En el manejo de todo paciente con sospecha de traumatismo raquímedular el primer paso a llevar a cabo es:

Seleccione una:

- a. Analizar la situación y asegurar la vía aérea.
- b. Valorar el estado respiratorio del paciente y garantizar una ventilación adecuada. ✗ Mal, debes repasar un poco
- c. Evaluar la función cardiovascular.
- d. Realizar examen neurológico.

Pregunta 61

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

187.- El tratamiento de LeFort tipo I sigue los siguientes pasos excepto:

Seleccione una:

- a. Bloqueo intermaxilar con apertura precoz.
- b. Fijación externa. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Abordaje vestibular.
- d. Reducción cerrada.

Pregunta 62

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

282.- Los traumatismos directos tienen más posibilidades de presentarse en:

Seleccione una:

- a. Primer trimestre.
- b. Segundo trimestre.
- c. Tercer trimestre.
- d. Todas las anteriores son falsas. ✗ Mal, debes repasar un poco

Pregunta 63

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

238.- La sintomatología de un taponamiento cardíaco es mediante:

Seleccione una:

- a. La tríada de Gussy.
- b. La tríada de Trust.
- c. La tríada de Beck. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Todas las anteriores son correctas.

Pregunta 64

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

217.- La reducción abierta de luxación de radio lleva un riesgo de:

Seleccione una:

- a. Mala reducción.
- b. Luxaciones recidivantes.
- c. Miositis. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Todas las anteriores son falsas.

Pregunta 65

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

162.- El daño encefálico se puede empeorar si, indique la falsa:

Seleccione una:

- a. Aparece hipotensión.
- b. Hipoxemia.
- c. Hipertensión. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Hiper-capnia.

Pregunta 66

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

205.- La fractura de atlas (C1):

Seleccione una:

- a. Se produce por sobrecarga axial.
- b. Se considera inestable.
- c. Se visualiza en Rx AP odontoidea con boca abierta. ✗ Mal, debes repasar un poco
- d. Todas las anteriores son verdaderas.

Pregunta 67

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

208.- La dosis de Manitol 20% en lesiones raquimedulares es de:

Seleccione una:

- a. 0,25 gr/Kg/4 h. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. 0,5 gr/Kg/4 h.
- c. 0,15 gr/Kg/4 h.
- d. 0,1 gr/Kg/4 h.

Pregunta 68

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

218.- La lesión de Monteggia es:

Seleccione una:

- a. Fractura de cúbito con luxación de la cabeza de radio. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Fractura de cúbito con luxación de trocar de radio.
- c. Fractura de radio con luxación de la cabeza de cúbito.
- d. Todas las anteriores son verdaderas.

Pregunta 69

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

174.- Si tenemos una contusión con HIC que no responde a tratamiento médico:

Seleccione una:

- a. Pondremos dexametasona.
- b. Haremos cirugía descompresiva. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Pondremos vasopresores.
- d. Todas las anteriores son falsas.

Pregunta 70

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

194.- La zona de columna vertebral afectada con más frecuencia en el traumatismo raquimedular es:

Seleccione una:

- a. Región dorsal.
- b. Región cervical media baja. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Región toracolumbar.
- d. Región lumbar.

Pregunta 71

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

272.- En el embarazo la aldosterona está:

Seleccione una:

- a. Igual.
- b. Depende del trimestre de gestación.
- c. Disminuida.
- d. Aumentada. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 72

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

150.- ¿Qué parte de la columna se ve lesionada por una sobrecarga axial?

Seleccione una:

- a. Dorsal
- b. Lumbar
- c. Sacra
- d. Cervical ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 73

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

268.- El comportamiento de un niño con maltrato físico es:

Seleccione una:

- a. Cauteloso.
- b. Aprensivo.
- c. Conductas extremas.
- d. Todas las anteriores son verdaderas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 74

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

277.- Aunque no exista una lesión que comprometa la salud de la embarazada siempre hay que:

Seleccione una:

- a. Intubar.
- b. Hacer una cricotomía.
- c. Poner oxígeno. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Todas las anteriores son falsas.

Pregunta 75

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

226.- Para el tratamiento de Luxación de rodilla está indicada la cirugía si:

Seleccione una:

- a. Si fracasa la reducción cerrada.
- b. Si hay alteraciones circulatorias.
- c. Todas las anteriores son verdaderas. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Todas las anteriores son falsas.

Pregunta 76

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

145.- El TCE que produce alteración transitoria de la conciencia, sin que se pueda objetivar déficit neurológico, se denomina:

Seleccione una:

- a. Comoción cerebral
- b. Contusión cerebral
- c. Concusión cerebral
- d. A y c son correctas ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 77

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

242.- Ante un paciente sin signos clínicos ni datos radiológicos descartaremos rotura traqueobronquial siempre:

Seleccione una:

- a. Verdadero. ✗ Mal, debes repasar un poco
- b. Falso porque el 10% no presenta ningún síntoma.
- c. Falso porque el 20% no presenta ningún síntoma.
- d. Falso siempre hay síntomas.

Pregunta 78

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

179.- Cuando valoramos la cavidad intraoral detectamos equimosis en el velo del paladar estamos ante:

Seleccione una:

- a. Disfunción intermaxilar.
- b. Fracturas pterigoideas. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Fractura del malar.
- d. Todas las anteriores son falsas.

Pregunta 79

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

160.- El edema cerebral es producido por un acumulo de líquido en:

Seleccione una:

- a. La base del cráneo.
- b. Parénquima cerebral.
- c. A nivel subdural.
- d. Todas son verdaderas. ❌ Mal, debes repasar un poco

Pregunta 80

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

236.- Se considera hemotórax moderado cuando la colección de sangre es:

Seleccione una:

- a. < 300 ml.
- b. 200-300 ml.
- c. 300-1.500 ml. ✅ ¡Bien, correcto!
- d. 1.500-3.000 ml.

Pregunta 81

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

201.- Para determinar el nivel de lesión sensitiva debemos explorar inicialmente:

Seleccione una:

- a. Sensibilidad dolorosa. ✅ ¡Bien, correcto!
- b. Sensibilidad táctil.
- c. Sensibilidad térmica.
- d. Sensibilidad vibratoria.

Pregunta 82

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

230.- En la insuficiencia arterial aguda la causa más frecuente es:

Seleccione una:

- a. Por rotura de arteria. ❌ Mal, debes repasar un poco
- b. Por necrosis vascular.
- c. Torsión de tronco arterial.
- d. Todas las anteriores son falsas.

Pregunta 83

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

157.- En un paciente que ha sufrido una PCR y con un traumatismo torácico, no hemos conseguido coger una vía periférica ni central la medicación endotraqueal será:

Seleccione una:

- a. A la misma dosis que endovenosa.
- b. No está aconsejado su utilización. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. A doble dosis que la endovenosa.
- d. A dosis triple que la endovenosa.

Pregunta 84

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

278.- En el abruptioplacentae es posible el desarrollo de diversos tipos de lesión renal en la mujer sin afectación renal previa, pero la mas destacada es:

Seleccione una:

- a. Fracaso renal crónico.
- b. Fracaso renal agudo.
- c. Pielonefritis. ✗ Mal, debes repasar un poco
- d. Todas las anteriores son verdaderas.

Pregunta 85

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

213.- Ante el examen físico de las fracturas de extremidades, la asimetría del contorno nos sugiere:

Seleccione una:

- a. Fracturas de huesos largos.
- b. Fracturas subyacentes desplazadas. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Fracturas con impactación.
- d. Todas las anteriores son falsas.

Pregunta 86

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

212.- Los mecanismos de producción de las fracturas son:

Seleccione una:

- a. Golpes directos.
- b. Golpes indirectos.
- c. Por acción muscular enérgica.
- d. Todas las anteriores son verdaderas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 87

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

259.- En niños menores de 6 años la obtención de una vía intraosea se realiza en:

Seleccione una:

- a. Fémur.
- b. Cara anterior externa de la extremidad proximal de la tibia.
- c. Cara anterior interna de la extremidad proximal de la tibia. ✓
¡Bien, correcto!
- d. Todas las anteriores son falsas.

Pregunta 88

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

198.- El síndrome de lesión medular transversa completa:

Seleccione una:

- a. Se produce una destrucción completa de un segmento medular. ✓
¡Bien, correcto!
- b. Se caracteriza por conservación de zonas motoras y sensitivas por debajo del nivel de la lesión.
- c. Es previsible la recuperación.
- d. Ausencia de afectación de segmentos sacros.

Pregunta 89

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

155.- ¿Hasta qué semana de embarazo protege la pelvis ósea al útero?

Seleccione una:

- a. 8
- b. 10
- c. 12 ✓ ¡Bien, correcto!
- d. 14

Pregunta 90

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

235.- En un neumotórax abierto el aire pasará a través del traumatismo, si el diámetro de la lesión es mayor al diámetro de la traquea en un:

Seleccione una:

- a. 1/2.
- b. 2/3. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. 1/5.
- d. 2/5.

Pregunta 91

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

151.- En el caso de la mano y el pie, cuando la Rx lateral puede crear confusión, se usa la proyección:

Seleccione una:

- a. Clásica
- b. Focalizada **✗** Mal, debes repasar un poco
- c. Oblicua
- d. En posición forzada

Pregunta 92

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

166.- En un paciente de 54 años con TCE se valora la escala de Glasgow y tenemos: apertura ocular a orden verbal, respuesta motora localiza el dolor y respuesta verbal no hay ¿qué puntuación tiene?:

Seleccione una:

- a. 9. **✓** ¡Bien, correcto!
- b. 8.
- c. 10.
- d. 11.

Pregunta 93

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

163.- La presión de perfusión cerebral es igual a:

Seleccione una:

- a. PAM / PIC.
- b. PAM – PIC. **✓** ¡Bien, correcto!
- c. PIC + PAM.
- d. PIC x PAM.

Pregunta 94

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

265.- El tratamiento definitivo del neumotórax a tensión en el niño es de:

Seleccione una:

- a. Colocación del catéter a nivel de 2º espacio intercostal línea medio axilar.
- b. Colocación del catéter a nivel de 3º espacio intercostal línea medio axilar.
- c. Colocación del catéter a nivel de 5º espacio intercostal línea medio axilar. **✓** ¡Bien, correcto!
- d. Colocación del catéter a nivel de 7º espacio intercostal línea medio axilar.

Pregunta 95

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

280.- En presencia de cuello inmaduro y con una RPM en embarazos de 34 ó más semanas no debe iniciarse la inducción ocitócica más allá de:

Seleccione una:

- a. 6 horas. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. 4 horas.
- c. 8 horas.
- d. 3 horas.

Pregunta 96

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

270.- Ante un abuso tanto físico como psicológico:

Seleccione una:

- a. El médico informará a un familiar que no será ni la madre ni el padre.
- b. El médico informará previamente a los padres del informe legal. ✓
¡Bien, correcto!
- c. El médico no está obligado a informar a los padres.
- d. Todas las anteriores son falsas.

Pregunta 97

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

175.- Un acumulo de líquido cefalorraquídeo en el espacio subdural por una rotura traumática de la aracnoides se le llama:

Seleccione una:

- a. Hematoma subdural.
- b. Hemorragia intraventricular.
- c. Higroma subdural. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Lesión axonal difusa.

Pregunta 98

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

153.- ¿Qué criterio clínico indica laparotomía inmediata?

Seleccione una:

- a. TAS < 100mmHg
- b. Hemorragia incontrolable a través de la herida ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Hemoptisis
- d. Todas son correctas

Pregunta 99

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

193.- En la columna vertebral existen:

Seleccione una:

- a. 7 vértebras cervicales. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. 6 vértebras lumbares.
- c. 13 vértebras dorsales.
- d. 6 vértebras cervicales.

Pregunta 100

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre
1,00

189.- Las fracturas malares se diagnostican con una radiografía:

Seleccione una:

- a. Posteroanterior 10°.
- b. Anteroposterior.
- c. Lateral.
- d. Todas las anteriores son falsas. ✗ Mal, debes repasar un poco