

EXPERTO UNIVERSITARIO EN EL MANEJO DEL POLITRAUMATIZADO PARA ENFERMERÍA (NXT31)

Área personal > MÁSTERES, ESPECIALISTAS Y EXPERTOS > ENFERMERÍA >
EXPERTOS 20 ECTS NEBRIJA > NXT31 > UNIDAD 2 > TEST UNIDAD 2

Comenzado el	sábado, 2 de octubre de 2021, 12:01
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 2 de octubre de 2021, 12:29
Tiempo empleado	28 minutos 7 segundos
Puntos	29,00/30,00
Calificación	9,67 de 10,00 (97%)
Comentario -	EXCELENTE


Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

124.- A la hora de utilizar la camilla de cuchara o de palas la primera actuación será:

Seleccione una:

- ☒ a. Medir al paciente.  ¡Bien, correcto!
- ☐ b. Abrir la camilla primero por la cabeza.
- ☐ c. Abrir la camilla primero por los pies.
- ☐ d. Todas las anteriores son falsas.


Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

144.- A la respiración que permite que el paciente respire de forma espontánea y suplementa las ventilaciones del paciente con un número preestablecido de respiraciones guiadas por el respirador se llama:

Seleccione una:

- ☐ a. PIC.
- ☐ b. VMC.
- ☒ c. VMI.  ¡Bien, correcto!
- ☐ d. SIM.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

125.- La inmovilización tetracameral o inmovilizador de cabeza evita principalmente los movimientos de:

Seleccione una:

- ☐ a. Lateralización.
- ☐ b. Flexión cervical.
- ☒ c. A y b son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. Todas las anteriores son falsas.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

140.- Las complicaciones que se pueden producir por una punción cricotiroides son:

Seleccione una:

- ☐ a. Hipoxia.
- ☐ b. Aspiración.
- ☐ c. Hemorragias.
- ☒ d. Todas las anteriores son verdaderas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

119.- El principal problema que se genera cuando se utilizan férulas de vacío es:

Seleccione una:

- ☐ a. Son muy incómodas.
- ☐ b. No inmovilizan bien.
- ☒ c. En traslados aéreos pierden consistencia. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. Todas las anteriores son falsas.

Pregunta 6

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

110.- La apertura de la vía aérea en un paciente politraumatizado se realizará con la técnica de:

Seleccione una:

- ☒ a. Frente-mentón. ✗ Mal, debes repasar un poco
- ☐ b. Elevación mandibular.
- ☐ c. Triple maniobra.
- ☐ d. Todas las anteriores son verdaderas.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

116.- Hay una premisa en la extricación del paciente atrapado:

Seleccione una:

- ☐ a. El rescate prima sobre la atención.
- ☐ b. La atención prima sobre el rescate.
- ☒ c. La atención prima sobre el rescate a excepción de que ponga en peligro la vida del herido u otra víctima. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. Todas las anteriores son falsas.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

114.- La principal causa que produce en un politraumatizado una PCR es:

Seleccione una:

- ☐ a. Hipovolemia.
- ☐ b. Dolor.
- ☐ c. Obstrucción de la vía aérea.
- ☒ d. Hipoxia. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

139.- Si por un casual no podemos intubar o llevamos más de 30 segundos procedemos a:

Seleccione una:

- ☐ a. Abandonar las maniobras y ponerle una mascarilla con oxígeno.
- ☒ b. Hiperventilar durante unos minutos. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. Seguiremos unos segundos a ver si logramos la vía aérea.
- ☐ d. A y b son verdaderas.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

138.- La manera de comprobar que el tubo endotraqueal está situado en su sitio y no en esófago es:

Seleccione una:

- ☐ a. Tirar del tubo con el neumotaponamiento inflado.
- ☐ b. Moverlo con cuidado a ver si ventila bien.
- ☒ c. Auscultar ambos campos pulmonares. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. Todas las anteriores son falsas.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

141.- La punción cricotiroidea se realiza con una angulación de:

Seleccione una:

- ☐ a. 30°.
- ☐ b. 50°.
- ☒ c. 45°. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. 90°.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

135.- En un paciente con TCE está indicada la intubación si:

Seleccione una:

- ☒ a. Puntuación igual o menor a 8 en la escala de Glasgow. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ b. Ventilación eficaz.
- ☐ c. Pupilas normales.
- ☐ d. B y c son correctas.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

111.- Hay muchas lesiones que pueden comprometer la respiración pero la que no compromete seriamente es:

Seleccione una:

- ☐ a. Volet costal.
- ☐ b. Neumotórax abierto.
- ☒ c. Contusión de la parrilla costal. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. Neumotórax a tensión.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

120.- A la hora de evaluar la columna cervical y cuello hay que observar la tráquea y nos encontramos ante una patología cuando ésta se encuentra:

Seleccione una:

- ☐ a. Desviada a la izquierda.
- ☐ b. Medial.
- ☐ c. Desviada a la derecha.
- ☒ d. A y c son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

128.- Según la SEMES la causa de obstrucción de la vía aérea se produce por diferentes tipos a excepción de uno:

Seleccione una:

- ☐ a. Alteración del nivel de conciencia.
- ☒ b. Dolor intenso. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. Traumatismos craneales.
- ☐ d. Grandes quemados.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

129.- Hay pacientes que por su anatomía no se le puede hacer una elevación mentoniana por lo que no se asegura la vía aérea, a estos pacientes se les realizará la técnica de:

Seleccione una:

- ☒ a. Elevación desde el arco mandibular. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ b. Apertura frente-mentón.
- ☐ c. Triple maniobra.
- ☐ d. Todas las anteriores son falsas.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

134.- Cuando usamos un balón ventilatorio o ambú con reservorio obtenemos concentraciones de oxígeno de:

Seleccione una:

- ☐ a. 30%.
- ☐ b. 50%.
- ☐ c. 80%.
- ☒ d. 100%. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

130.- Una de las técnicas para la desobstrucción de la vía aérea en atragantamientos es la maniobra de Heimlich ¿cuál sería el lugar de presión en personas obesas o embarazadas?

Seleccione una:

- ☐ a. Zona periumbilical.
- ☐ b. Epigastrio.
- ☐ c. Por encima de la 10ª costilla.
- ☒ d. En el tercio inferior esternal. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

108.- Una de las premisas en una actuación de emergencias es la valoración de la zona y antes de abandonar el vehículo habrá que establecer medidas de seguridad:

Seleccione una:

- ☐ a. Si hay mercancías peligrosas.
- ☐ b. Si hay riesgo de explosión.
- ☐ c. Si existen líquidos inflamables.
- ☒ d. Todas las anteriores son verdaderas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

131.- En una actuación sobre vía aérea la valoración se realizará mediante: Mirar-escuchar-sentir. Cuando miramos vamos buscando una serie de signos que nos refieren dificultad respiratoria como son:

Seleccione una:

- ☐ a. Tiraje costal.
- ☐ b. Aleteo nasal.
- ☐ c. Depresión de fosas supraesternal.
- ☒ d. Todas las anteriores son verdaderas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

112.- Una medida de valorar la tensión arterial sistólica, cuando no tenemos un esfigmomanómetro, es tomando el pulso, si tenemos un pulso femoral tendremos una TAS:

Seleccione una:

- ☐ a. > de 90 mmHg.
- ☐ b. > de 100 mmHg.
- ☒ c. > de 70 mmHg. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. Todas las anteriores son falsas.

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

107.- Al segundo pico de muerte en el politraumatizado se le llama:

Seleccione una:

- ☐ a. Minuto de oro.
- ☐ b. Pico crítico.
- ☐ c. Pico decisivo.
- ☒ d. Hora de oro. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

117.- Los materiales de inmovilización deben de tener una serie de características:

Seleccione una:

- ☒ a. Deben de inmovilizar. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ b. Tienen que tener efectos secundarios.
- ☐ c. Pueden ser incómodos.
- ☐ d. Todas las anteriores son falsas.

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

137.- Si tuviéramos dificultad a la hora de intubar se puede facilitar haciendo la maniobra de:

Seleccione una:

- ☐ a. Paund.
- ☐ b. Stronsky.
- ☒ c. Sellick. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. Babinsky.

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

115.- El primer acceso venoso en un politraumatizado es el antero cubital, si fuera posible su calibre debe ser:

Seleccione una:

- ☒ a. El mayor posible. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ b. Catéter 16 G.
- ☐ c. Catéter 18 G.
- ☐ d. Catéter 20 G.

Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

118.- Para la inmovilización de la columna vertebral se utiliza un corsé llamado Kendrick y el mínimo para colocarlo es de:

Seleccione una:

- ☐ a. 3 personas.
- ☒ b. 2 personas. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. 1 persona.
- ☐ d. 4 personas.

Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

132.- La inserción de la cánula orofaríngea o Guedel se mide desde:

Seleccione una:

- ☐ a. Punta de la nariz hasta el arco mandibular.
- ☐ b. Lóbulo de la oreja hasta malar.
- ☒ c. Comisura del labio hasta arco mandibular. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. Todas las anteriores son verdaderas.

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

122.- La diferencia entre el transporte urgente y programado es:

Seleccione una:

- ☐ a. Depende del vehículo utilizado.
- ☐ b. Si lleva uno o varios pacientes.
- ☒ c. Limitación o no en el tiempo disponible para su realización. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. Todas las anteriores son verdaderas.

Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

109.- En el paciente politraumatizado las funciones vitales deben de ser evaluadas de manera:

Seleccione una:

- ☐ a. Rápida.
- ☐ b. Tranquilamente.
- ☐ c. Eficientemente.
- ☒ d. A y c son verdaderas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

143.- En un paciente hipoventilado obtenemos una serie de valores:

Seleccione una:

- ☐ a. La PaO₂ es > 50 mmHg y la PaCO₂> 50 mmHg.
- ☒ b. La PaO₂ es < 50 mmHg y la PaCO₂> 50 mmHg. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. La PaO₂ es > 50 mmHg y la PaCO₂< 50 mmHg.
- ☐ d. La PaO₂ es < 50 mmHg y la PaCO₂< 50 mmHg.