

## **FARMACOLOGÍA PRÁCTICA EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS**

¿Cuál NO es una propiedad del sistema nervioso Simpático?

Seleccione una:

- a. Inhibe la salivación.
- b. Dilatación de pupilas.
- c. Relaja los bronquios.
- d. Contrae la pupila.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Contrae la pupila.

### **PREGUNTA 2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de los simpaticomiméticos encontramos:

Seleccione una:

- a. Adrenalina.
- b. Dopamina.
- c. Salbutamol.
- d. todos son correctos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: todos son correctos.

### **PREGUNTA 3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la OMS, en el primer escalón de la analgesia nos encontramos:

Seleccione una:

- a. Tramadol.
- b. Metamizol.
- c. Meperidina.
- d. Fentanilo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Metamizol.

#### PREGUNTA 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿A qué grupo de antiarrítmicos pertenece la Amiodarona?

Seleccione una:

- a. Grupo IA
- b. Grupo II
- c. Grupo III
- d. Grupo IV

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Grupo III

#### PREGUNTA 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué ventajas presenta la vía sublingual?

Seleccione una:

- a. Precisa dosis más altas
- b. En pacientes agitados su acción es inmediata
- c. La absorción es más lenta pero constante
- d. Se absorbe directamente a la sangre, no tiene efecto del primer paso hepático.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se absorbe directamente a la sangre, no tiene efecto del primer paso hepático.

#### PREGUNTA 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿A qué grupo de antiarrítmicos pertenece la Procainamida?

Seleccione una:

- a. Grupo IA
- b. Grupo II
- c. Grupo III
- d. Grupo IV

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Grupo IA

PREGUNTA 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La buscapina se considera un fármaco. Seleccione una:

Seleccione una:

- a. Simpaticomimético
- b. Parasimpaticomimético
- c. Parasimpaticolítico
- d. Simpaticolítico

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Parasimpaticolítico

PREGUNTA 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En cuál de estas situaciones no estaría indicado la colocación de una vía intraósea?

Seleccione una:

- a. PCR
- b. Shock hipovolémico severo
- c. Osteoporosis
- d. Gran quemado

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Gran quemado

#### PREGUNTA 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadas [Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

Un porcentaje alto de la administración de medicamentos en un centro de salud son los inyectables administrados por la vía intramuscular, ¿cuál es la cantidad máxima de volumen que podemos administrar por esta vía?. Seleccione una:

Seleccione una:

- a. 7 cc
- b. 4 cc
- c. 5 cc
- d. 3 cc

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 7 cc

#### PREGUNTA 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadas [Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estos fármacos no es un analgésico opiode? Seleccione una:

Seleccione una:

- a. Fentanilo.
- b. Clorhidrato de morfina.
- c. Tiopental.
- d. Meperidina.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tiopental.

#### PREGUNTA 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadas [Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

Está preparando la medicación para una intubación urgente, le han pedido que prepare una ampolla de Succinilcolina. Señala la afirmación incorrecta respecto a este fármaco. Seleccione una:

Seleccione una:

- a. La principal aplicación es su empleo en aquellas situaciones clínicas que precisan relajación intensa de corta duración.
- b. EL fármaco puede encontrarse dentro del carro de PCR a temperatura ambiente.
- c. Los efectos indeseables más graves son el paro cardíaco, la hipertermia maligna, el shock anafiláctico y la parálisis prolongada
- d. También se utiliza en la terapia electroconvulsiva con el fin de evitar luxaciones y fracturas en los pacientes sometidos a este procedimiento.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: EL fármaco puede encontrarse dentro del carro de PCR a temperatura ambiente.

#### PREGUNTA 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué vía de administración solo permite volúmenes inferiores a 0,5ml? Seleccione una:

Seleccione una:

- a. Intramuscular
- b. Intradérmica
- c. Subcutánea.
- d. Intraósea.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Intradérmica

#### PREGUNTA 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las acciones de la adrenalina, encontramos:

Seleccione una:

- a. Aumento de la FC.
- b. Reduce la contracción uterina.
- c. Relaja el detrusor.
- d. todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: todas son correctas.

#### PREGUNTA 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes respuestas NO relacionaría con el Sistema nervioso simpático?

Seleccione una:

- a. Miosis
- b. Inhibición de la salivación
- c. Taquicardia
- d. Relajación bronquial

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Miosis

#### PREGUNTA 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La atropina se usa para:

Seleccione una:

- a. antiespasmódico.
- b. intoxicación por organofosforados.
- c. Intoxicación por algunos tipos de setas.
- d. Todos son correctos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos son correctos.

#### PREGUNTA 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Como relajante muscular despolarizante, tenemos:

Seleccione una:

- a. Rocuronio
- b. Succinilcolina.
- c. Vecuronio.
- d. Ninguno es correcto.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Succinilcolina.

PREGUNTA 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El antagonista del paracetamol es:

Seleccione una:

- a. Flumazenilo.
- b. Naloxona.
- c. N-Acetilcisteína.
- d. Glucosmón

Retroalimentación

La respuesta correcta es: N-Acetilcisteína.

PREGUNTA 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El antagonista de las Benzodiacepinas es:

Seleccione una:

- a. Flumazenilo.
- b. Naloxona.
- c. N-Acetilcisteína.
- d. Glucosmón

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Flumazenilo.

#### PREGUNTA 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El antagonista de los Opiáceos es:

Seleccione una:

- a. Flumazenilo.
- b. Naloxona.
- c. N-Acetilcisteina.
- d. Glucosmón

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Naloxona.

#### PREGUNTA 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué escalón analgésico se encuentra la Buprenorfina?

Seleccione una:

- a. Primero.
- b. Segundo.
- c. Tercero.
- d. Cuarto.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tercero.