

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [Cursos cortos](#) / [CFC](#) / [Quirófano](#)

/ [Actuación de Enfermería en Neurocirugía, Cirugía Pediátrica y Ginecológica. Trasplante de órganos](#) / [Secciones](#) / [Tema 2](#)

/ [Examen Unidad II](#)

Comenzado el jueves, 9 de junio de 2022, 03:32

Estado Finalizado

Finalizado en jueves, 9 de junio de 2022, 03:39

Tiempo empleado 6 minutos 48 segundos

Puntos 30,00/30,00

Calificación 100,00 de 100,00

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es una histerectomía tipo Wertheim-Meigs?

Seleccione una:

- ☐ A. Es aquella en la que se conserva el cuello del útero.
- ☒ B. Es una histerectomía radical con linfadenectomía pélvica.
- ☐ C. Es la extirpación del útero, ovarios y trompas.
- ☐ D. Ninguna respuesta es correcta.



La respuesta correcta es: Es una histerectomía radical con linfadenectomía pélvica.

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En casos de gestación ectópica puede ser necesario una salpinguectomía. Se debe tener en cuenta:

Seleccione una:

- ☐ A. Puede existir hemoperitoneo por estallido tubular, comprometiendo la situación hemodinámica de la paciente.
- ☐ B. La unión de la trompa con la vagina se pinza y se liga con Poliglactina del 0.
- ☐ C. El lavado de la cavidad abdominal para eliminar restos de coágulos se realiza con suero fisiológico caliente.
- ☒ D. Las respuestas a y c son correctas.



La respuesta correcta es: Las respuestas a y c son correctas.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la preparación de la paciente para una intervención de mama se debe tener en cuenta aspectos como:

Seleccione una:

- ☐ A. El manguito para la toma de PA no invasiva se coloca en la pierna.
- ☐ B. La canalización de la vía venosa periférica es en el brazo contrario a la lesión.
- ☐ C. Los electrodos se colocan generalmente en la espalda.
- ☒ D. Todas son correctas.



La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La caja de instrumental de cirugía abdominal ginecológica debería contener instrumental específico como:

Seleccione una:

- ☐ A. Pinzas de Dartigues o histerolabo.
- ☐ B. Tirabuzón.
- ☐ C. Tijera de Wescot.
- ☒ D. Las respuestas a y b son correctas.



La respuesta correcta es: Las respuestas a y b son correctas.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué causas pueden motivar la cesárea? Señala la respuesta incorrecta.

Seleccione una:

- ☐ A. Desproporción Pélvico cefálica
- ☐ B. Presentaciones anómalas (podálica, transversa)
- ☐ C. Placenta previa
- ☒ D. Todas las anestias epidurales



La respuesta correcta es: Todas las anestias epidurales

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De los siguientes instrumentos quirúrgicos, indique cuál no sería imprescindible en un instrumental de legrado:

Seleccione una:

- ☐ A. Valvas vaginales.
- ☐ B. Tallos de Hegar o dilatadores.
- ☐ C. Legras fenestradas de Recamier.
- ☒ D. Separadores Farabeuf.



La respuesta correcta es: Separadores Farabeuf.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es un cerclaje cervical y cuándo esta indicado?:

Seleccione una:

- ☐ A. Se trata de evitar la dilatación prematura del orificio cervical interno mediante una sutura continua con cerviz-set y cinta de PET.
- ☐ B. Se realizará después de la 16 semana de embarazo.
- ☐ C. Puede ser una intervención de urgencia si existe amenaza de aborto o de parto prematuro.
- ☒ D. Todas las anteriores son correctas.



La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué consiste la mastectomía radical tipo Maden?

Seleccione una:

- ☐ A. Se realiza ante tumores malignos mamarios sin afectación ganglionar.
- ☐ B. Es la extirpación del cuadrante de la mama donde se encuentra el tumor.
- ☐ C. Se reseca toda la mama y se conserva el pezón y la areola intactos.
- ☒ D. Se extirpa toda la mama, ganglios linfáticos axilares y tejido adiposo, conservando el músculo pectoral menor.



La respuesta correcta es: Se extirpa toda la mama, ganglios linfáticos axilares y tejido adiposo, conservando el músculo pectoral menor.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La colocación de la paciente en la mesa quirúrgica para realizar una intervención de mama ha de ser:

Seleccione una:

- ☐ A. Decúbito dorsal con los brazos sujetos al cuerpo.
- ☐ B. Decúbito dorsal con los brazos extendidos en cruz en una angulación máxima de 45°.
- ☒ C. Decúbito dorsal con el brazo de la mama afectada extendido en un soporte con una angulación máxima de 90 °.
- ☐ D. Decúbito lateral del lado de la mama afectada y el brazo homolateral levantado y sujeto sobre la cabeza.



La respuesta correcta es: Decúbito dorsal con el brazo de la mama afectada extendido en un soporte con una angulación máxima de 90 °.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El útero se encuentra suspendido en la cavidad pelviana por una serie de ligamentos que lo cubren, que son: Señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☐ A. Los ligamentos anchos que le proporcionan estabilidad dentro de la cavidad pélvica.
- ☐ B. Los ligamentos cardinales que evitan que el útero se colapse.
- ☐ C. Los ligamentos redondos que ayudan a mantener el útero sostenido y orientado hacia delante.
- ☒ D. Todas son correctas.



La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de sutura se utiliza para realizar la histerorrafia en la intervención de Cesárea?

Seleccione una:

- ☐ A. Seda trenzada 1
- ☒ B. Poliglactina 1
- ☐ C. Nylon 0
- ☐ D. Monofilamento no reabsorbible 1



La respuesta correcta es: Poliglactina 1


Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La cesárea es la extracción del feto por vía abdominal y puede ser de forma programada o urgente. Indique la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- ☒ A. Se administra 1000 UI de oxitocina para evitar la contracción uterina. 
- ☐ B. Se deben tener preparados un equipo textil, caja de instrumental para cirugía abdominal y unos forceps.
- ☐ C. Si el tipo de anestesia es general la preparación de la paciente y la colocación del campo quirúrgico es previa a la inducción anestésica.
- ☐ D. La placenta se retira de forma manual y se comprueba su integridad.

La respuesta correcta es: Se administra 1000 UI de oxitocina para evitar la contracción uterina.


Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de óptica se utiliza en este procedimiento quirúrgico (histeroscopia)?

Seleccione una:

- ☐ A. Óptica de 70°
- ☒ B. Óptica de 30° 
- ☐ C. Óptica de 0°
- ☐ D. Óptica de 45°

La respuesta correcta es: Óptica de 30°


Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En caso de microcalcificaciones en la mama puede ser necesario:

Seleccione una:

- ☒ A. Realizar un marcaje previo a la intervención mediante un arpón colocado en el Servicio de Radiología. 
- ☐ B. Realizar una mastectomía bilateral como tratamiento de elección.
- ☐ C. Siempre será necesaria un linfadenectomía axilar.
- ☐ D. Todas las respuestas son correctas.

La respuesta correcta es: Realizar un marcaje previo a la intervención mediante un arpón colocado en el Servicio de Radiología.

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En cuál de las siguientes intervenciones es necesario el recuento de compresas y gasas?

Seleccione una:

- ☐ A. Miomectomía
- ☐ B. Quistectomía ovárica
- ☐ C. Anexectomía
- ☒ D. Todas son correctas



La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En una histeroscopia la distensión del espacio uterino puede ser con. Señala la respuesta incorrecta

Seleccione una:

- ☐ A. Histeroinsuflador de CO2.
- ☐ B. Glicina.
- ☐ C. Suero fisiológico.
- ☒ D. Suero Glucosado 5%



La respuesta correcta es: Suero Glucosado 5%

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los tumores benignos de ovario más frecuentes son de naturaleza quística. Entre ellos se encuentran:

Seleccione una:

- ☒ A. Teratomas benignos o quistes dermoides.
- ☐ B. De Tarlov.
- ☐ C. De epidídimo.
- ☐ D. Las respuestas a y b son correctas.



La respuesta correcta es: Teratomas benignos o quistes dermoides.

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La glándula de Bartholino segrega moco y puede infectarse provocando un absceso que puede requerir cirugía. Señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- ☒ A. La enfermera instrumentista preparará lo necesario para una intervención abdominal.
- ☐ B. Se realiza una incisión, drenaje de la cavidad y desbridamiento digital.
- ☐ C. Se realiza lavado de arrastre con povidona yodada y suero fisiológico a partes iguales.
- ☐ D. Si se marsupializa se impide el cierre inmediato de la cavidad quística mediante puntos sueltos.



La respuesta correcta es: La enfermera instrumentista preparará lo necesario para una intervención abdominal.

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son los instrumentos que se utilizan en la dilatación cervical para la introducción del histertoscopio?

Seleccione una:

- ☐ A. Dilatadores de Bakey
- ☐ B. Tallos de Allis
- ☒ C. Tallos de Hegar
- ☐ D. Dilatadores de Mayo



La respuesta correcta es: Tallos de Hegar

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La histerectomía vaginal puede ir acompañada de la reparación del cistocele. Señale la respuesta incorrecta.

Seleccione una:

- ☐ A. La posición quirúrgica es litotomía, protegiendo los huecos poplíteos con un almohadillado.
- ☒ B. La reparación del cistocele es previa a la histerectomía.
- ☐ C. Una vez que se ha alcanzado el cuello vesical, se dan puntos en la aponeurosis para tensar y evitar el abombamiento de la vejiga.
- ☐ D. La cúpula vaginal se cierra con sutura reabsorbible y sirve de anclaje para los pedículos.



La respuesta correcta es: La reparación del cistocele es previa a la histerectomía.

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los miomas son tumores benignos que se deben extirpar en caso de presentar sintomatología, gran tamaño o provocar problemas de fertilidad. Señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ A. Una vez abierta la cavidad abdominal se exterioriza el útero para poder examinarlo mejor.
- ☐ B. El lecho del mioma, una vez extirpado, se cierra con Poliglactina del 0 evitando los espacios muertos.
- ☒ C. Habitualmente, la miomectomía se acompaña de una doble anexectomía.
- ☐ D. Las piezas resecadas se envían al servicio de Anatomía Patológica.



La respuesta correcta es: Habitualmente, la miomectomía se acompaña de una doble anexectomía.

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La histeroscopia consiste en la introducción de una videocámara dentro del útero a través del cérvix con fines diagnósticos o terapéuticos, como pueden ser:

Seleccione una:

- ☐ A. Miomectomía.
- ☐ B. Evaluar los osteum tubáricos y canalización tubárica retrógrada.
- ☐ C. Liberación de adherencias que dificultan la implantación de un embarazo.
- ☒ D. Todas son correctas.



La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique la respuesta incorrecta en la preparación mínima de la paciente sometida a cirugía laparoscópica.

Seleccione una:

- ☒ A. Monitorización de ECG, PA invasiva, pulsioximetría y capnografía.
- ☐ B. Canalización de vía venosa periférica.
- ☐ C. Posición de litotomía modificada y refuerzo con hombreras para evitar desplazamientos.
- ☐ D. Lavado y desinfección con suero fisiológico y solución antiséptica de abdomen y región perineal, incluyendo la bóveda vaginal.



La respuesta correcta es: Monitorización de ECG, PA invasiva, pulsioximetría y capnografía.

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En las intervenciones abdominales se pueden practicar dos tipos de incisiones: Pfannenstiel y laparotomía media infraumbilical. Señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☐ A. En la laparotomía media infraumbilical se realiza apertura longitudinal de la aponeurosis abdominal.
- ☐ B. En la Pfannenstiel la apertura de la aponeurosis abdominal es de forma transversal.
- ☐ C. La incisión de Pfannenstiel es más estética porque la cicatriz queda cubierta por el vello púbico.
- ☒ D. Todas son correctas.



La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En cuanto al procedimiento quirúrgico de la histerectomía, cabe destacar:

Seleccione una:

- ☒ A. Las asas intestinales se rechazan y protegen con un paño humedecido en suero fisiológico caliente.
- ☐ B. La paciente se coloca en posición de anti-Trendelenburg.
- ☐ C. Para el cierre de la cúpula vaginal se utiliza Polipropileno de 8/0.
- ☐ D. Todas las anteriores son correctas.



La respuesta correcta es: Las asas intestinales se rechazan y protegen con un paño humedecido en suero fisiológico caliente.

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En las intervenciones quirúrgicas por vía vaginal, ¿cuál es la posición correcta de la paciente?

Seleccione una:

- ☐ A. Decúbito dorsal.
- ☒ B. Litotomía.
- ☐ C. Decúbito lateral derecho.
- ☐ D. Todas son correctas.



La respuesta correcta es: Litotomía.

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué instrumentos se utilizan para cortar el cordón umbilical?

Seleccione una:

- ☐ A. Pinzas de disección y bisturí eléctrico
- ☐ B. Pinzas de disección y bisturí frío
- ☐ C. Tijeras de Mayo
- ☒ D. 2 pinzas de Kocher y tijeras rectas



La respuesta correcta es: 2 pinzas de Kocher y tijeras rectas

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Con respecto a los ovarios, señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ A. Son de color gris claro y brillante.
- ☐ B. En niñas y mujeres postmenopáusicas son de menor tamaño.
- ☐ C. Su irrigación es a través de la arteria ovárica.
- ☒ D. Su posición en la cavidad pélvica no varía después del primer parto.



La respuesta correcta es: Su posición en la cavidad pélvica no varía después del primer parto.

Pregunta **29**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es una conización?

Seleccione una:

- ☒ A. Es la resección de un cono de tejido del cuello uterino.
- ☐ B. Es el drenaje de la cavidad quística mediante un Penrose cónico.
- ☐ C. Normalmente se asocia a la histerectomía radical.
- ☐ D. Todas las anteriores son correctas.



La respuesta correcta es: Es la resección de un cono de tejido del cuello uterino.

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué material no se prepararía para realizar una laparoscopia?

Seleccione una:

- ☐ A. Óptica y cable de luz
- ☐ B. Instrumentos específicos para hemostasia, disección y exéresis de la lesión.
- ☒ C. Inmovilizador uterino para nulípara.
- ☐ D. Trócares de laparoscopia



La respuesta correcta es: Inmovilizador uterino para nulípara.

[◀ Tema 2: Cirugía Obstétrica y Ginecológica](#)

Ir a...

[Desarrollo de la unidad ►](#)