

Pregunta1

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué porcentaje de la población reclusa en España ha consumido alguna vez en su vida drogas ilegales?

a.
El 66%

b.
El 26%

c.
El 46%

d.
El 75%

Pregunta2

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los ingresos hospitalarios de las personas privadas de libertad se realizan...

a.
en la Unidad de Custodia del hospital de referencia de la prisión.

b.
en el Hospital General Penitenciario (HGP) de Madrid.

c.
en el Hospital que el paciente tiene asignado de manera previa al ingreso en prisión.

d.
no se contempla la atención hospitalaria.

Pregunta3

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

En relación al consumo de drogas ilegales, señala la correcta:

a. Como norma general el drogadicto consume mucho más cuando se encuentra en la cárcel que cuando está en libertad.

b. En los centros penitenciarios los internos drogadictos por vía endovenosa nunca comparten los utensilios de venopunción.

c. Las drogas ilegales más prevalentes en la cárcel son el cannabis y la cocaína.

d. El consumo de heroína endovenosa ha aumentado en los últimos años.

Pregunta4

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación con la protección ante enfermedades infecciosas señala la frase INCORRECTA:

a. Hay que actuar para evitar la exposición, evitar la infección de la persona expuesta y evitar la enfermedad en la persona infectada.

b. La manera más efectiva de reducir la transmisión de enfermedades infecciosas o transmisibles es mediante el diagnóstico precoz y el tratamiento efectivo de los casos.

c. Las medidas individuales como el lavado de manos, la protección al toser y el uso de mascarilla, no se han demostrado útiles en la prevención de enfermedades infecciosas.

d. Una buena ventilación, el suministro de agua, la existencia de alcantarillas y el control de infestaciones, son medidas ambientales que protegen de enfermedades infecciosas.

Pregunta5

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación a la quimioprofilaxis post-exposición:



a.
Todas las opciones de respuesta son correctas.



b.
La PEP se utiliza en situaciones de emergencia.



c.
La profilaxis post-exposición (PEP) significa tomar medicamentos frente al VIH poco tiempo después de una posible exposición al VIH para prevenir la infección.



d.
La PEP debe iniciarse dentro de las primeras 72 horas (los primeros 3 días) tras una posible exposición al VIH.

Pregunta6

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

¿En qué caso no es obligatoria la prueba de determinación del VIH?



a.
Estudios en donantes de tejidos y órganos.



b.
Cirugía mayor.



c.
Usuarios de técnicas de reproducción. Esta mal no es



d.
Donantes de sangre

Pregunta7

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

En referencia al estudio de inicio, ¿cuál de las siguientes pruebas complementarias es obligatoria?



a.
Tropismo viral. Esta mal no es



b.

Determinación CD8 y cociente CD4/CD8.

c.
Serología toxoplasma (IgG).

d.
Serología de citomegalovirus (IgG).

Pregunta8

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

Por lo que respecta al tratamiento retroviral de gran actividad, ¿qué afirmación es correcta?

a.
En 1981 se inició una estrategia terapéutica basada en inhibidores de proteínas.

b.
Hasta 1996 no tuvimos tratamiento retroviral de gran actividad.

c.
En 1985 se inició el tratamiento retroviral de gran actividad.

d.
Hasta 1996 no tuvimos el primer tratamiento efectivo. Esta mal no es

Pregunta9

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

La hepatitis B adquirida mediante transmisión vertical se hace crónica:

a.
En el 10-30% de los casos.

b.
En el 80-90% de los casos.

c.
En el 30-50% de los casos.

d.
En el 60-75% de los casos.

Pregunta10

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

En cuanto a la hepatitis "C" es cierto:

a.

La recidiva post-RVS se calcula que afecta al 30% de los tratados.

b.

Que la eliminación podrá llegar a España aproximadamente en el 2030.

c.

Que el tratamiento de la hepatitis C crónica es actualmente pangenotípico, de poca duración, sencillo, prácticamente sin efectos adversos y muy eficaz.

d.

El tratamiento es muy eficaz, pero hay que hacer cribado de hepatocarcinoma mediante estudio ecográfico en todos los casos tratados.

Pregunta11

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la hepatitis A en reclusos de Cataluña es correcta:

a.

No se recomienda vacunar, ya que es autolimitada, no se hace crónica y no guarda relación con la hepatitis B y/o C.

b.

La incidencia de infección es del 20-30%.

c.

Las epidemias por el VHA en internos de prisiones son habituales. Esta mal no es

d.

La mayoría de los internos están inmunizados.

Pregunta12

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

El tratamiento más corto de la TB en EEUU , en la fase intensiva se basará en:



a.
2 meses de HRZ + moxifloxacino.



b.
2 meses de HRZE.



c.
3 meses de RH.



d.
2 meses de HRZ.

Pregunta13

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un vacunado con BCG elegiremos el QTF sobre la prueba de la tuberculina para que el QTF:



a.
Presentará en infectado respuesta negativa.



b.
Es ampliamente disponible.



c.
Presentará en no infectados respuesta negativa.



d.
Es más barato.

Pregunta14

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

La estrategia End TB de la OMS tiene por objetivo conseguir entre 2015 y 2035 una reducción de la incidencia del:

- a. 50%
- b. 75%
- c. 25%
- d. 90%

Pregunta15

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

En relación a la recogida de muestra anal es importante:

- a. Que si la persona se hace auto-toma, conozca bien cuál es la técnica correcta de la recogida.
- b. La recogida de muestra rectal no está sujeta a ninguna condición especial.
- c. Todas las otras opciones de respuesta son ciertas. Esta mal no es
- d. Que las condiciones de recogida sean adecuadas (muestras limpias de masa heces, evitación del uso reciente de enemas y/o cremas que puedan alterar el proceso).

Pregunta16

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

En cuanto a la recogida de muestras, es cierto:

- a.

Siempre que hay exudado, sobre todo si es purulento, hay que recoger una muestra del lugar anatómico concreto con el fin de hacer cultivo y antibiograma para determinar la sensibilidad a los antibióticos.



b.

Todas las otras opciones de respuesta son ciertas. Esta mal no es



c.

Muestra en orina en mujeres.



d.

Solo hay que recoger una muestra para cultivo, las muestras para la realización de la PCR no son necesarias pero se podrían hacer (orina del primer rayo o PCR sobre muestra uretral en caso de los hombres, muestra endocervical en mujeres, muestras faringias y rectales, según clínica y practicas sexuales.

Pregunta17

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto a la gonocóccia:



a.

Puede ser asintomática en el 70% de las mujeres y sólo en un 10% de los hombres.



b.

Una de las vías de transmisión más importante en nuestro entorno son las prácticas de sexo oral.



c.

Todas las otras opciones de respuesta son ciertas.



d.

En cuanto a esta localización, el hecho de que en la faringe puedan haber otros coccus, puede tener un papel de sinergia en las resistencias contra los antibióticos y por este motivo, siempre se debe hacer test of cure a las 4 semanas del tratamiento.

Pregunta18

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

En el caso de la <i>pediculosis pubis</i>, ¿cómo se acostumbra a establecer el diagnóstico?



a.

Se observan signos y síntomas compatibles.



b. Se requiere la observación al microscopio para el diagnóstico de certeza.



c. Se visualizan directamente los piojos o las liendres.



d. Se visualiza el parásito mediante dermatoscopio.

Pregunta19

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a las medidas ambientales sobre la sarna, señale la respuesta falsa.



a. La ropa que no se pueda limpiar (mantas, etc.) permanecerá en una bolsa de plástico 7 días.



b. Se desparasitará toda la ropa íntima, de cama y las toallas utilizadas en la última semana.



c. Se limpiará con lejía el mobiliario que haya tocado el paciente.



d. Se procederá a fumigar la habitación, especialmente si es una celda en la que haya más reclusos.

Pregunta20

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto al surco acarino, ¿cuál es la respuesta correcta?



a. Es fácilmente visible en axilas.



b. Se visualiza mejor en las zonas donde hay lesiones de rascado.



c. Se visualiza mejor con tinta china.



d.
Su presencia confirma el diagnóstico de sarna.