

[Página Principal](#) » [Mis cursos](#) » [AV.Q042\\_23](#) » [Evaluación Abril](#) »

[Curso: Valoración y cuidados enfermeros a personas con problemas gastrointestinales](#)

<b>Comenzado el</b>	miércoles, 19 de abril de 2023, 18:52
<b>Estado</b>	Finalizado
<b>Finalizado en</b>	miércoles, 19 de abril de 2023, 19:21
<b>Tiempo empleado</b>	28 minutos 16 segundos
<b>Puntos</b>	30,00/30,00
<b>Calificación</b>	10,00 de 10,00 (100%)
<b>Comentario</b>	- Apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el Cribado del cáncer colorrectal (CCR) es cierto que:

Seleccione una:

- a. La detección de sangre oculta en heces cada 2 años entre los 40 y los 50 años de edad se ha demostrado como una estrategia efectiva en nuestro medio.
- b. La dieta rica en vitamina D en dosis elevadas (1.000-2.000 U/día) se asocia con la reducción de riesgo de CCR en la población de riesgo medio. ✓
- c. En la población de riesgo medio, la administración de ácido acetil salicílico (AAS) no se asocia de forma consistente con la reducción de CCR.
- d. Los individuos con historia familiar de CCR deberían iniciar el cribado mediante colonoscopia a partir de los 30 años de edad, o 5 años antes de la edad de diagnóstico del familiar afectado más joven.

La respuesta correcta es: La dieta rica en vitamina D en dosis elevadas (1.000-2.000 U/día) se asocia con la reducción de riesgo de CCR en la población de riesgo medio.

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes áreas del aparato gastro-intestinal está en especial riesgo de sufrir isquemia?

Seleccione una:

- a. El duodeno.
- b. El recto.
- c. La flexión esplénica. ✓
- d. El estómago.

La respuesta correcta es: La flexión esplénica.

---

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las manifestaciones clínicas en el adulto de la enfermedad celiaca son todas EXCEPTO:

Seleccione una:

- a. Hiperactividad. ✓
- b. Parestesias.
- c. Anemia ferropénica.
- d. Neuropatía periférica.

La respuesta correcta es: Hiperactividad.

---

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La sonda más adecuada para realizar un lavado gástrico es:

Seleccione una:

- a. Sonda de Salem.
- b. Sonda de Sengstaken-Blakemore.
- c. Sonda de Foley.
- d. Sonda de Levi. ✓

La respuesta correcta es: Sonda de Levi.

---

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un paciente portador de una colostomía descendente las heces serán:

Seleccione una:

- a. Muy líquidas.
- b. Sólidas no irritantes. ✓
- c. Muy irritantes.
- d. Semilíquidas muy irritantes.

La respuesta correcta es: Sólidas no irritantes.

---

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale la afirmación FALSA en relación al sondaje con una sonda sengstaken-Blakemore:

Seleccione una:

- a. Es necesario desinflar el balón esofágico 30 minutos cada 12 horas para evitar necrosis de la mucosa esofágica.
- b. Los balones esofágico y gástrico se inflan con aire.
- c. Para retirar la sonda se desinfla primero el balón gástrico y a las 12 horas el esofágico. ✓
- d. Precisa vaciamiento previo del contenido gástrico mediante sonda nasogástrica para reducir las posibilidades de aspiración.

La respuesta correcta es: Para retirar la sonda se desinfla primero el balón gástrico y a las 12 horas el esofágico.

---

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la enfermedad celiaca los marcadores serológicos son:

Seleccione una:

- a. Anticuerpos anti gliadina.
- b. Anticuerpos anti endomisio.
- c. Anticuerpos anti transglutaminasa.
- d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

---

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale la respuesta incorrecta acerca del síndrome de Mallory Weiss:

Seleccione una:

- a. Es una hemorragia digestiva alta.
- b. El sangrado no cesa espontáneamente en la mayor parte de los casos. ✓
- c. Es más frecuente en alcohólicos.
- d. Habitualmente se produce tras intensos vómitos o incluso tos.

La respuesta correcta es: El sangrado no cesa espontáneamente en la mayor parte de los casos.

---

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las ostomías se pueden dividir en dos grandes grupos: nutricionales y de eliminación. Señale cuál de estas ostomías se considera únicamente de eliminación:

Seleccione una:

- a. Faringostomía.
- b. Gatrostomía.
- c. Yeyunostomía.
- d. Ileostomía. ✓

La respuesta correcta es: Ileostomía.

---

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El dolor en un enfermo con pancreatitis suele situarse:

Seleccione una:

- a. Retroesternal, puede irradiar al dorso.
- b. Epigástrico, puede irradiar al dorso, especialmente en la zona subescapular derecha.
- c. Epigástrico, puede irradiar al dorso o a la zona lumbar izquierda. ✓
- d. Hipogástrico, cuadrante inferior izquierdo o derecho.

La respuesta correcta es: Epigástrico, puede irradiar al dorso o a la zona lumbar izquierda.

---

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Respecto a las ostomías digestivas: ¿qué afirmación es la correcta?

Seleccione una:

- a. Según su localización podemos clasificarlas como colostomías de descompresión o colostomías de protección.
- b. No todos los tipos de colostomías podrán ser permanentes o temporales, cada una tiene su indicación.
- c. La cecostomía, es la ostomía de la porción inicial del colon ascendente y las deposiciones serán líquidas. ✓
- d. Para el cuidado del estoma y la piel circundante, se lava con agua templada y jabón neutro y se aplicara un desinfectante acuoso para evitar la infección.

La respuesta correcta es: La cecostomía, es la ostomía de la porción inicial del colon ascendente y las deposiciones serán líquidas.

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Respecto al lavado gástrico, es cierto que:

Seleccione una:

- a. Utilizaremos lubricante liposoluble.
- b. Colocaremos al paciente en decúbito lateral derecho.
- c. La hipotermia es una complicación en los niños. ✓
- d. Está indicado en la ingesta de sustancias cáusticas.

La respuesta correcta es: La hipotermia es una complicación en los niños.

Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo puede estimarse la longitud adecuada para la colocación de una sonda nasogástrica?

Seleccione una:

- a. Desde la punta de la nariz del paciente hasta el cuadrante superior del abdomen.
- b. Desde la punta de la nariz del paciente hasta el apéndice xifoides y desde ahí hasta el lóbulo de la oreja.
- c. Desde la punta de la nariz del paciente hasta el lóbulo de la oreja y desde ahí hasta el apéndice xifoides. ✓
- d. Desde la punta de la nariz del paciente hasta el hipocondrio derecho.

La respuesta correcta es: Desde la punta de la nariz del paciente hasta el lóbulo de la oreja y desde ahí hasta el apéndice xifoides.

---

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un paciente con dolor abdominal, ictericia y fiebre, presenta:

Seleccione una:

- a. Colelitiasis.
- b. Colecistitis.
- c. Coledocolitiasis.
- d. Colangitis. ✓

La respuesta correcta es: Colangitis.

---

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La irrigación a través de un estoma, para promover una evacuación intestinal de forma regular estaría indicada en:

Seleccione una:

- a. Ileostomía.
- b. Colostomía ascendente.
- c. Colostomía sigmoidea. ✓
- d. Colostomía transversa.

La respuesta correcta es: Colostomía sigmoidea.

---

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De los siguientes enunciados NO supone una complicación de la úlcera péptica:

Seleccione una:

- a. Perforación de estómago.
- b. Hemorragia digestiva.
- c. Obstrucción pilórica.
- d. Shock neurogénico. ✓

La respuesta correcta es: Shock neurogénico.

---

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de dieta está indicada en un enfermo cirrótico con encefalopatía hepática?

Seleccione una:

- a. Dieta hipoproteica. ✓
- b. Dieta hipersódica.
- c. Dieta hiperproteica.
- d. Dieta hipocalórica.

La respuesta correcta es: Dieta hipoproteica.

---

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes patologías NO se relaciona con un cuadro de abdomen agudo?

Seleccione una:

- a. Apendicitis aguda.
- b. Perforación de un divertículo de Meckel.
- c. Reflujo gastroduodenal. ✓
- d. Rotura de aneurisma de aorta abdominal.

La respuesta correcta es: Reflujo gastroduodenal.

---

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué tipo de colostomías está indicado el uso de una irrigación?

Seleccione una:

- a. Colostomías terminales sigmoideas. ✓
- b. Colostomías con prolapso.
- c. Ileostomía.
- d. Colostomías ascendente.

La respuesta correcta es: Colostomías terminales sigmoideas.

---

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Por qué es importante la eliminación de los pólipos de colon?:

Seleccione una:

- a. Porque sirve para identificar las posibles alteraciones genéticas.
- b. Para prevenir desarrollo de cáncer de colon. ✓
- c. Para facilitar un mejor examen del intestino.
- d. Para aminorar los futuros problemas de estreñimiento.

La respuesta correcta es: Para prevenir desarrollo de cáncer de colon.

---



Pregunta

21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las úlceras pépticas pueden desarrollar complicaciones potencialmente mortales, como son: señale la incorrecta:

Seleccione una:

- a. Penetración.
- b. Diarrea. ✓
- c. Perforación.
- d. Hemorragia.

La respuesta correcta es: Diarrea.

---

Pregunta

22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El señor Sanz se encuentra ingresado desde ayer en el hospital a consecuencia de una cirrosis. ¿cuál de las siguientes manifestaciones le haría sospechar de un nuevo episodio de ascitis?:

Seleccione una:

- a. Amonio elevado, aumento de peso.
- b. Amilasa sérica elevada, disminución de la diuresis.
- c. Distensión abdominal, disminución de la diuresis, aumento del peso. ✓
- d. Hiperglucemia, distensión abdominal.

La respuesta correcta es: Distensión abdominal, disminución de la diuresis, aumento del peso.

---

Pregunta

23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique cuál de las siguientes repuestas se corresponde con los cambios del sistema hepatobiliar relacionados con la edad:

Seleccione una:

- a. Se produce un aumento del metabolismo de los medicamentos.
- b. Se produce una disminución de la frecuencia de los cálculos biliares debido a la disminución de secreción de colesterol en la bilis.
- c. Se produce una disminución de la contracción de la vesícula biliar después de una comida.
- d. Se produce una reducción del flujo sanguíneo. ✓

La respuesta correcta es: Se produce una reducción del flujo sanguíneo.

---

Pregunta

24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La posición correcta para un lavado gástrico en un paciente intoxicado es:

Seleccione una:

- a. Sentado.
- b. Decúbito lateral izquierdo. ✓
- c. Decúbito lateral derecho.
- d. Da igual la postura.

La respuesta correcta es: Decúbito lateral izquierdo.

---

Pregunta

25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando hablamos de un proceso patológico intraabdominal, de reciente inicio, que cursa con dolor, repercusión sistémica y requiere un rápido diagnóstico y tratamiento, estamos hablando de:

Seleccione una:

- a. Diarrea.
- b. Gastritis.
- c. Abdomen agudo. ✓
- d. Colecistitis.

La respuesta correcta es: Abdomen agudo.

Pregunta

26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un paciente al que se le ha practicado una gastrectomía, de cuál de las siguientes vitaminas puede tener un déficit varios años después de la intervención:

Seleccione una:

- a. Vitamina B12. ✓
- b. Vitamina B3.
- c. Vitamina K.
- d. Vitamina E.

La respuesta correcta es: Vitamina B12.

Pregunta

27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La causa más frecuente de hemorragia digestiva alta es:

Seleccione una:

- a. Gastritis.
- b. Úlcera Péptica. ✓
- c. Varices esofágicas.
- d. Gastropatía portal hipertensiva.

La respuesta correcta es: Úlcera Péptica.

Pregunta

28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La determinación de grasa en heces se realiza mediante un test llamado:

Seleccione una:

- a. Test de Graham.
- b. Test de Guayaco.
- c. Test de Van de Kamer. ✓
- d. Todas son falsas.

La respuesta correcta es: Test de Van de Kamer.

---

Pregunta

29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La triada de Charcot es característica de:

Seleccione una:

- a. Colangitis.
- b. Colecistitis.
- c. Colelitiasis. ✓
- d. Todas son ciertas.

La respuesta correcta es: Colelitiasis.

---

Pregunta

30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El síndrome de ZOLLINGER-ELLISON es la úlcera péptica causada por un:

Seleccione una:

- a. Glucagoma.
- b. Gastrinoma. ✓
- c. Insulinoma.
- d. Vipoma.

La respuesta correcta es: Gastrinoma.

---

Actividad previa

◀ Valoración y cuidados enfermeros a personas con problemas gastrointestinales Material Complementario

Ir a...

Siguiente actividad

Encuesta de satisfacción del alumnado ▶

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <https://www.fuden.es>