

## Comentario -



**¡Lo sentimos!**

No has superado el examen. Estamos seguros de que eres capaz de hacerlo mejor. Para considerar el examen como superado **tienes que tener una nota igual o superior a 70**. Dispones de **dos intentos**.

[Volver a portada](#)

## Pregunta 1

¿A qué se deben adaptar las actuaciones sanitarias dentro de los centros penitenciarios?

- a. A las especificidades sociodemográficas de la población reclusa.
- b. A las características epidemiológicas de la población reclusa.
- c. A las características penitenciarias.
- d. A las especificidades sociodemográficas, las características epidemiológicas y las características penitenciarias de la población reclusa.
- 

## Pregunta 2

¿Cuáles son las drogas ilegales más prevalentes dentro de los centros penitenciarios?

- a. La cocaína y el cannabis
- b. La heroína y el cannabis
- c. Las drogas de diseño
- d. La heroína y la cocaína
-

**Pregunta 3**

En relación con las actuaciones en el ámbito de salud se debe tener presente ante la población migrante que ingresa en los centros penitenciarios:

- a. Se aplicarán medidas higiénicas y de prevención.
- b. Siempre debemos procurar individualizarlas según características personales, procedencia y sus circunstancias.
- c. Todas las opciones de respuesta son correctas.
- d. Hay que realizar cribados de enfermedades infecciosas y parasitarias.
- 

**Pregunta 4**

Respecto a los beneficios que tiene la práctica habitual de ejercicio sobre la salud, es cierto que:

- a. En personas con obesidad sólo se aconseja los ejercicios de fuerza para mejorar la calidad de vida.
- b. Todas las opciones de respuesta son ciertas.
- c. En las personas con diabetes tipo 2 se ha visto que una dieta correcta y un ejercicio bien programado podría revertir, no eliminar, la enfermedad.
- d. El ejercicio no ha demostrado tener buenos resultados, como tratamiento coadyuvante, en pacientes con cáncer.
- 

**Pregunta 5**

La población penitenciaria se caracteriza por:

- a. Haber inmigrantes procedentes de países con altas prevalencias de algunas infecciones (TBC, VHC...).
- b. Ser una población con pocos hábitos saludables.
- c. Todas las opciones de respuesta son correctas.
- d. Acoger a un alto número de usuarios de drogas.
- 

**Pregunta 6**

Respecto a *Test and treat*, ¿qué afirmación es FALSA respecto a la evidencia clínica existente?

- a. *Test and treat*, sin necesidad de test de resistencias genotípicas.
- b. *Test and treat*, compromiso de adherencia farmacológica.
- c. *Test and treat*, sin necesidad de serología de coinfección (VHC/VHB).
- d. *Test and treat*, sin necesidad de determinación de l'HLA-B 5701.
-

**Pregunta 7**

La Organización Mundial de la Salud ha establecido 16 objetivos como estrategia global del VIH, ¿cuál de los siguientes objetivos no es uno de esos 16?

- a. Reducir las muertes por tuberculosis en pacientes VIH un 75%.
- b. Reducir a un 2% las nuevas infecciones en bebés.
- c. Reducir las nuevas infecciones por el VIH a menos de 500.000 casos.
- d. Asegurar que todos los países tengan integrados los servicios esenciales para los pacientes VIH en los acuerdos nacionales de financiación de la salud.
- e. Reducir la mortalidad por VIH a menos de 1 millón de casos.

**Pregunta 8**

Según la "Guía de recomendaciones para el diagnóstico precoz del VIH en el ámbito sanitario", ¿en qué caso no se recomienda hacer una determinación de VIH de forma dirigida anualmente?

- a. Personas que ejercen la prostitución.
- b. Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.
- c. Emigrantes de zonas de alta prevalencia.
- d. Usuarios de drogas por vía intravenosa.
- e. Mujeres que tienen relaciones sexuales con hombres.

**Pregunta 9**

En cuanto a la hepatitis "E" es una afirmación correcta:

- a. Raramente provoca epidemias.
- b. La prevalencia de infección es más alta en trabajadores de la industria del cerdo.
- c. Otros casos de infección aguda son asintomáticos.
- d. La vigilancia epidemiológica muestra que ha disminuido su incidencia en los últimos años.
- e. La prevalencia de infección es más alta en trabajadores de la industria del cerdo.

**Pregunta 10**

En cuanto a la incidencia del VHD en pacientes que presentan hepatitis B crónica:

- a. En España la incidencia es del 10% aproximadamente.
- b. En el área de Rusia y otras antiguas repúblicas soviéticas la incidencia supera el 20%.
- c. Está distribuida de forma homogénea en el mundo.
- d. La incidencia en inmigrantes irregulares no es alta.
- e. La incidencia en inmigrantes irregulares no es alta.

**Pregunta 11**

¿Qué respuesta es correcta respecto al tratamiento de la hepatitis "B" crónica?

- a. A menudo eliminamos el HbsAg.
- b. Es caro y obliga a que la adherencia sea muy alta.
- c. Reduce, aunque no elimina el riesgo de hepatocarcinoma.
- d. Inhibe la progresión de la fibrosis, excepto en caso de cirrosis.
- 

**Pregunta 12**

La COVID ha afectado a la prevención y el control de la TB, por los siguientes motivos menos uno:

- a. Gran disponibilidad de PCR para el SARS-COV2.
- b. TB y COVID son una sindemia.
- c. El retraso diagnóstico en TB favorece la transmisión.
- d. Los recursos de TB se han derivado a la COVID.
- 

**Pregunta 13**

La probabilidad de un tuberculín convertor de presentar TB en el resto de su vida es aproximadamente de:

- a. 10
- b. 30
- c. 20
- d. 40
- 

**Pregunta 14**

La estrategia End TB de la OMS tiene por objetivo conseguir entre 2015 y 2035 una reducción de la incidencia del:

- a. 50%
- b. 25%
- c. 90%
- d. 75%
-

**Pregunta 15**

En relación a las pruebas diagnosticas de la sífilis, NO es cierto que:

- a. Los primeros test serológicos que positivizan son los tests reaginicos.
- b. Hay pruebas indirectas (tests treponémicos y tests reagínicos).
- c. Hay pruebas directas (detección de treponema sobre las lesiones, campo oscuro y PCR multitest PCR sobre frotis de chancro).
- d. Los primeros test serológicos que positivizan son los test treponémicos, que pueden permanecer positivos durante toda la vida.
- 

**Pregunta 16**

Según el ECDC (European Centre for Disease Control and Prevention) los países de la UE/EEA han notificado (marca la INCORRECTA):

- a. Un aumento consistente de casos de sífilis infecciosa (2010-2017) sobre todo en el grupo de hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres.
- b. Una disminución de casos de sífilis infecciosa (2010-2017) en el grupo de hombres que tienen relaciones sexuales con mujeres.
- c. El perfil predominante de los casos de sífilis infecciosa corresponde a hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, en edad entre los 20 y los 45 años.
- d. Un aumento discreto y con cierta estabilización de casos de sífilis infecciosa (2010-2017) entre las mujeres.
- 

**Pregunta 17**

En relación a las resistencias antibióticas de *Neisseria gonorrhoeae*, es FALSO que:

- a. El gonococo no presenta resistencias antimicrobianas, por lo que su tratamiento es sencillo y se pueden utilizar diferentes antibióticos.
- b. En un estudi realizado en el Servicio de Microbiología del Vall d'Hebron, se pudo observar que la sensibilidad a las cefalosporinas de tercera generación se mantenía alta y que la resistencia a la ceftriaxona había disminuido desde que se había introducido la biterapia en 2012; sin embargo, la resistencia a la azitromicina había aumentado en el periodo 2014-2017.
- c. En las últimas décadas, en diferentes países del mundo y debido a mecanismos diversos, *Neisseria gonorrhoeae* ha ido desarrollando resistencias a algunos antibióticos, como sulfonamidas, penicilinas, tetraciclinas, macrólidos y fluoroquinolonas.
- d. Con estos datos locales, y para evitar la aparición de resistencias de NG, se recomendó aumentar la dosis de ceftaxiona de 500mg a 1g en monoterapia en diciembre de 2019.
- 

**Pregunta 18**

Del tratamiento de la sarna típica, ¿qué afirmación es la correcta?

- a. Se aplica a los contactos de riesgo desde 8 semanas anteriores al inicio de síntomas del caso índice.
- b. El tratamiento a los contactos debe realizarse una vez tratado el paciente índice.
- c. Se aplica a los contactos directos y prolongados desde el inicio de los síntomas en el paciente.
- d. Se aplica a todos los contactos que presenten prurito o lesiones cutáneas.
-

**Pregunta 19**

Entre los medios de diagnóstico de la sarna, ¿cuál no es de utilidad?

- a. El examen dermatoscópico.
- b. El test de la tinta china.
- c. El test de rascado de piel y el examen microscópico.
- d. La luz de Wood.
- 

**Pregunta 20**

¿Cuál es la actuación más adecuada en cuanto al tratamiento de los piojos?

- a. En niños se recomienda no ir a la escuela hasta no haber terminado el tratamiento.
- b. Aplicar un champú de permetrina al 1%.
- c. Se aconseja limpiar los muebles de la casa con un desparasitador.
- d. Aplicar permetri
-