

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [Cáncer de Cuello Uterino: Prevención y Cribado 2023](#) / [CURSO](#)  
/ [Evaluacion módulos 1 a 4 \(Grupo Mayo\)](#).

**Comenzado el** viernes, 19 de mayo de 2023, 11:53

**Estado** Finalizado

**Finalizado en** viernes, 19 de mayo de 2023, 12:20

**Tiempo empleado** 26 minutos 18 segundos

**Puntos** 14,00/20,00

**Calificación** 7,00 de 10,00 (70%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**?

Seleccione una:

- a. Aunque la mayoría de las lesiones remiten, al aumentar la gravedad de las lesiones se asocia a tasas de regresión son más bajas.
- b. CIN1 es un diagnóstico histopatológico de infección productiva por el VPH. La mayoría de estas lesiones remiten por si solas por si solas.
- c. La mayor prevalencia de las lesiones de bajo grado tiene lugar a principios de la veintena, mientras que en el caso de las lesiones de alto grado se produce cerca de la treintena.
- d. La prevalencia de lesiones cervicales según la edad es siempre la misma independientemente de la población de estudio. ✓

Pregunta **2**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

**El VPH hace referencia a...**

Seleccione una:

- a. Virus del papiloma de alto riesgo, un único virus
- b. Virus del papiloma humano, más de 200 tipos de virus
- c. Virus del papiloma humano, un único virus
- d. Virus del papiloma de alto riesgo, más de 200 tipos de virus ✗

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

**Acerca de la prevención del cáncer, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CIERTA?**

Seleccione una:

- a. El cribado se centra en la detección de la enfermedad en un estadio clínico
- b. El uso de la prueba del VPH en un programa de cribado del cáncer de cuello uterino es un ejemplo de prevención primaria.
- c. El uso de la citología en un programa de cribado del cáncer de cuello uterino es un ejemplo de prevención secundaria. ✓
- d. Los esfuerzos de prevención secundaria tienen como objetivo reducir la incidencia de la enfermedad.

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

**¿Por qué son importantes los controles de calidad en el cribado del cáncer de cuello uterino?**

Seleccione una:

- a. Para garantizar la fiabilidad y exactitud de los resultados obtenidos mediante actividades de cribado.
- b. Para identificar posibles errores o fallos en el sistema de procesamiento de muestras.
- c. A y B son correctas. ✓
- d. Ninguna de las anteriores es correcta

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

**¿Cuántos cánceres se estima que son causados por el VPH?**

Seleccione una:

- a. Alrededor de 1 millón
- b. Alrededor de 200.000
- c. Alrededor de 700.000. ✓
- d. Alrededor de 400.000

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

**El triaje de las mujeres positivas al VPH identificadas en los programas de cribado basados en el VPH es necesario para:**

Seleccione una:

- a. Limitar la carga de las visitas de seguimiento para las mujeres y los servicios sanitarios.
- b. Evitar el sobreatamiento de las mujeres que dan positivo en el cribado pero que no tienen la enfermedad cervicouterina.
- c. Identificar a las mujeres con mayor riesgo de precáncer o cáncer de cuello uterino para su posterior manejo/vigilancia.
- d. Todo lo anterior

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

**El VPH causa todos o algunos, de los siguientes tipos de cáncer:**

Seleccione una:

- a. Cáncer de cuello uterino
- b. Otros cánceres anogenitales como cáncer anal, vulvar, vaginal y de pene
- c. Cánceres de cabeza y cuello, como cavidad bucal, laringe y orofaringe
- d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas

Pregunta **8**

Sin contestar

Puntúa como 1,00

**Prevalencia del VPH en lesiones precancerosas**

Seleccione una:

- a. Es siempre del 100 %
- b. Aumenta con el aumento de la gravedad de la lesiones
- c. Disminuye con el aumento de la gravedad de la lesiones
- d. No hay ningún patrón

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

**Una prueba de cribado debe ser:**

Seleccione una:

- a. Precisa y fiable
- b. Aceptable y segura
- c. Sencilla, barata y accesible
- d. Todas las anteriores son correctas



Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

**¿Qué prueba de triaje es la recomendada ante un resultado de citología ASCUS?**

Seleccione una:

- a. Prueba de VPH
- b. Repetir la citología
- c. Metilación
- d. Ninguna de las anteriores



Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

**Que indicador es mas importante para evaluar una prueba de triaje?**

Seleccione una:

- a. Su aplicación en auto-toma
- b. Su coste
- c. Su sensibilidad
- d. Su valor predictivo o riesgo de lesión



Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

**En general, en una población determinada, ¿a qué edad se produce la mayor prevalencia de la infección por el VPH?**

Seleccione una:

- a. En la adolescencia, justo después de las primeras relaciones sexuales
- b. Alrededor de principios de la veintena, algunos años después del inicio de relaciones sexuales, cuando el número de parejas sexuales en general es más elevado ✓
- c. Cerca de la treintena, cuando las mujeres dejan de usar preservativos al estar en relaciones estables.
- d. Ninguna de las anteriores ya que la prevalencia no varía según la edad

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

**Uno de los cambios más relevantes en la última clasificación de la OMS de lesiones escamosas de cuello uterino es que:**

Seleccione una:

- a. Los biomarcadores como p16 son considerados en el diagnóstico de lesiones relacionadas con el VPH
- b. HSIL y LSIL son los términos preferidos para designar el resultado tanto de muestras histológicas como de muestras citológicas del cuello uterino
- c. Los tumores escamosos del tracto genital femenino inferior también se dividen en asociados al VPH e independientes del VPH
- d. Todas las respuestas anteriores son correctas ✓

Pregunta **14**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

**El objetivo de la colposcopia basada en el riesgo es...**

Seleccione una:

- a. Conseguir coherencia con las estrategias de cribado propuestas recientemente
- b. Incorporar la información proporcionada por la colposcopia a los resultados de la prueba de cribado para definir un perfil de riesgo para cada caso en particular ✗
- c. Guiar el manejo de la colposcopia y la práctica de la biopsia de acuerdo con el riesgo del HSIL/CIN3+ subyacente
- d. Todas las respuestas anteriores son correctas

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

**El diagnóstico definitivo de adenocarcinoma in situ (AIS)**

Seleccione una:

- a. permite el seguimiento con la prueba del VPH y la colposcopia, pero no con citología debido a su baja sensibilidad para las lesiones glandulares
- b. debe realizarse en una conización cervical, no en una citología o una biopsia
- c. debe realizarse en una conización cervical junto con un resultado positivo en la prueba del VPH
- d. A y C son correctas

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes puntos son válidos con respecto a los requisitos de las pruebas de detección de VPH para ser usadas en regiones con bajos recursos?

Seleccione una:

- a. Bajo Coste
- b. Posibilidad de realización de pruebas rápidas
- c. Baja necesidad de infraestructura laboratorial
- d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas

Pregunta **17**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la prueba del VPH en comparación con la citología es **FALSA**?

Seleccione una:

- a. La prueba del VPH permite alargar el intervalo de tiempo hasta la siguiente prueba.
- b. La prueba del VPH es más específica.
- c. La prueba del VPH es más sensible para detectar CIN3+.
- d. La prueba del VPH es más coste-efectiva.



Pregunta **18**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

**¿Qué es la sensibilidad de una prueba de cribado?**

Seleccione una:

- a. La proporción de negativos reales (es decir, sujetos sin enfermedad real) entre los identificados mediante la prueba como negativos.
- b. La probabilidad de que un sujeto con un resultado negativo en la prueba tenga la enfermedad.
- c. La proporción de sujetos sin enfermedad (clasificados como negativos por la prueba de referencia) identificado correctamente mediante la prueba de cribado. ✘
- d. La proporción de sujetos con enfermedad (clasificados como positivos) correctamente identificados mediante la prueba de cribado.

Pregunta **19**

Sin contestar

Puntúa como 1,00

**Las mujeres tratadas por HSIL/CIN2-3...**

Seleccione una:

- a. necesitan un seguimiento estricto los dos primeros años después del tratamiento. Se recomienda el seguimiento a largo plazo, pero no es obligatorio, ya que el riesgo de HSIL/CIN2+ disminuye en los años siguientes al tratamiento
- b. se les debe recomendar que se vacunen contra el VPH solo si dan negativo en las pruebas del VPH, ya que hay evidencia moderada de que, en estos casos, la vacuna reduce el riesgo de persistencia/recurrencia
- c. deberían realizar seguimiento durante los 20-25 años posteriores al tratamiento aunque este sobrepase los 65 años de edad habitual de finalización del programa
- d. no presentan un mayor riesgo de cáncer de cuello uterino si se tratan correctamente con márgenes negativos (en la muestra cónica) y tienen pruebas negativas del VPH después del tratamiento

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

**¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los requisitos que debe cumplir una de las pruebas de cribado del cáncer es FALSA?**

Seleccione una:

- a. Debe ser accesible para toda la población diana.
- b. Debe tener una alta especificidad incluso si implica baja sensibilidad. ✔
- c. Debe ser asequible desde el punto de vista económico, aceptable, causando las menos molestias posibles y no causar complicaciones.
- d. Debe ser una prueba fiable y precisa.

[◀ Material on-line // M4C Gestión de Cribado: Manejo Clínico / Seguimiento Después de Tto.](#)

[Material on-line // M5 Uso de la Autotoma de Células Cervicovaginales ►](#)