

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [Cáncer de Cuello Uterino: Prevención y Cribado 2023](#) / [CURSO](#)
/ [Evaluacion módulos 1 a 4 \(Grupo Mayo\)](#).

Comenzado el miércoles, 24 de mayo de 2023, 16:01

Estado Finalizado

Finalizado en miércoles, 24 de mayo de 2023, 16:32

Tiempo empleado 31 minutos 14 segundos

Puntos 16,00/20,00

Calificación 8,00 de 10,00 (80%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En comparación con la citología convencional, la citología de base líquida...

Seleccione una:

- a. es más sensible.
- b. no hay diferencias entre ellas.
- c. es más específica.
- d. muestra una tasa inferior de muestras insatisfactorias



Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En general, en una población determinada, ¿a qué edad se produce la mayor prevalencia de la infección por el VPH?

Seleccione una:

- a. En la adolescencia, justo después de las primeras relaciones sexuales
- b. Alrededor de principios de la veintena, algunos años después del inicio de relaciones sexuales, cuando el número de parejas sexuales en general es más elevado
- c. Cerca de la treintena, cuando las mujeres dejan de usar preservativos al estar en relaciones estables.
- d. Ninguna de las anteriores ya que la prevalencia no varía según la edad



Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes pruebas NO SE PUEDE realizar en muestras recolectadas en medio líquido?

Seleccione una:

- a. Citología de base líquida
- b. Pruebas de ARN para el VPH
- c. Citología convencional
- d. Pruebas de ADN del VPH



Pregunta **4**

Incorrecta

Se puntúa
0,00 sobre 1,00**El seguimiento sin tratamiento de HSIL/CIN2+...**

Seleccione una:

- a. se asocia a un índice elevado de complicaciones
- b. nunca se recomienda debido al alto riesgo de progresión a cáncer ✘
- c. solo se recomienda en mujeres embarazadas, en las que el tratamiento puede retrasarse en el parto
- d. solo es aceptable en algunas situaciones muy específicas bajo un seguimiento estricto

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00**Una prueba de cribado debe ser:**

Seleccione una:

- a. Precisa y fiable
- b. Aceptable y segura
- c. Sencilla, barata y accesible
- d. Todas las anteriores son correctas ✔

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA** sobre el proceso de carcinogénesis?

Seleccione una:

- a. Existen algunos factores, como el consumo de tabaco, asociados a la progresión de infección a lesiones o cáncer.
- b. La mayoría de las infecciones por el VPH remiten por sí mismas.
- c. La mayoría de las lesiones CIN3 progresan a cáncer. ✔
- d. Se sospecha que el proceso de carcinogénesis está desencadenado por las oncoproteínas E6 y E7.

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00**¿Que prueba de triaje está mas validada en cuanto a su precisión diagnóstica en un programa de cribado poblacional?**

Seleccione una:

- a. La citología ✔
- b. La detección de los 14 VPHs de alto riesgo
- c. La carga viral
- d. La inspección visual con ácido acético

Pregunta **8**

Incorrecta

Se puntúa
0,00 sobre 1,00**En general, la colposcopia ha demostrado tener...**

Seleccione una:

- a. Alta sensibilidad y baja especificidad para HSIL/CIN2+ en el punto de corte de la "colposcopia de impresión de alto grado" ✘
- b. Alta sensibilidad y alta especificidad en el punto de corte de la "colposcopia de impresión de alto grado"
- c. Media sensibilidad y alta especificidad para HSIL/CIN2+ en el punto de corte de "cualquier anomalía colposcópica"
- d. Alta sensibilidad y baja especificidad para HSIL/CIN2+ en el punto de corte de "cualquier anomalía colposcópica"

Pregunta **9**

Incorrecta

Se puntúa
0,00 sobre 1,00**El manejo recomendado de una mujer con una citología líquida insatisfactoria es**

Seleccione una:

- a. Repetir citología después de 2-4 semanas
- b. Repetir citología después de 2-4 meses
- c. Realizar una prueba réflex del VPH
- d. B y C son correctas

✘

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00**El VPH causa todos o algunos, de los siguientes tipos de cáncer:**

Seleccione una:

- a. Cáncer de cuello uterino
- b. Otros cánceres anogenitales como cáncer anal, vulvar, vaginal y de pene
- c. Cánceres de cabeza y cuello, como cavidad bucal, laringe y orofaringe
- d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas

✔

Pregunta **11**

Incorrecta

Se puntúa
0,00 sobre 1,00**¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los requisitos que debe cumplir una de las pruebas de cribado del cáncer es FALSA?**

Seleccione una:

- a. Debe tener una alta especificidad incluso si implica baja sensibilidad.
- b. Debe ser accesible para toda la población diana.
- c. Debe ser una prueba fiable y precisa.
- d. Debe ser asequible desde el punto de vista económico, aceptable, causando las menos molestias posibles y no causar complicaciones.

✘

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00**¿Cuántos cánceres se estima que son causados por el VPH?**

Seleccione una:

- a. Alrededor de 700.000
- b. Alrededor de 1 millón
- c. Alrededor de 400.000
- d. Alrededor de 200.000

✔

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00**El VPH hace referencia a...**

Seleccione una:

- a. Virus del papiloma humano, un único virus
- b. Virus del papiloma de alto riesgo, más de 200 tipos de virus
- c. Virus del papiloma de alto riesgo, un único virus
- d. Virus del papiloma humano, más de 200 tipos de virus

✔

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00**¿Cuál es el valor predictivo negativo de una prueba de cribado?**

Seleccione una:

- a. La probabilidad de que un sujeto con un resultado negativo en la prueba tenga la enfermedad.
- b. La proporción de sujetos con enfermedad (clasificados como positivos) correctamente identificada mediante la prueba de cribado.
- c. La proporción de sujetos sin enfermedad (clasificados como negativos por la prueba de referencia) identificado correctamente mediante la prueba de cribado.
- d. La proporción de negativos reales (es decir, sujetos sin enfermedad real) entre los identificados mediante la prueba como negativos. ✓

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00**¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación a la presencia de células escamosas atípicas en las que no puede descartarse una lesión de alto grado (ASC-H) es VERDADERA?**

Seleccione una:

- a. ASC-H es un resultado de cribado citológico muy poco frecuente
- b. El riesgo de HSIL/CIN2-3 y cáncer de cuello uterino es más bajo en mujeres con ASC-H y VPH negativas respecto a las VPH positivas
- c. Debe realizarse triaje mediante pruebas del VPH
- d. A y B son correctas ✓

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00**Que indicador es más importante para evaluar una prueba de triaje?**

Seleccione una:

- a. Su valor predictivo o riesgo de lesión ✓
- b. Su coste
- c. Su aplicación en auto-toma
- d. Su sensibilidad

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00**¿Qué prueba de triaje es la recomendada ante un resultado de citología ASCUS?**

Seleccione una:

- a. Prueba de VPH ✓
- b. Repetir la citología
- c. Metilación
- d. Ninguna de las anteriores

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00**Acerca de la prevención del cáncer, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CIERTA?**

Seleccione una:

- a. Los esfuerzos de prevención secundaria tienen como objetivo reducir la incidencia de la enfermedad.
- b. El uso de la prueba del VPH en un programa de cribado del cáncer de cuello uterino es un ejemplo de prevención primaria.
- c. El cribado se centra en la detección de la enfermedad en un estadio clínico
- d. El uso de la citología en un programa de cribado del cáncer de cuello uterino es un ejemplo de prevención secundaria. ✓

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00**Prevalencia del VPH en lesiones precancerosas**

Seleccione una:

- a. No hay ningún patrón
- b. Disminuye con el aumento de la gravedad de la lesiones
- c. Es siempre del 100 %
- d. Aumenta con el aumento de la gravedad de la lesiones

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00**El proyecto de estandarización LAST recomienda la aplicación de inmunotinción de p16 en el siguiente contexto:**

Seleccione una:

- a. Para ayudar a distinguir HSIL de imitaciones de lesiones precancerosas como metaplasia inmadura
- b. para complementar la evaluación morfológica de las muestras de biopsia interpretadas como \leq LSIL con alto riesgo de que se pasen por alto lesiones de alto grado en función de pruebas anteriores, como una prueba de Papanicolaou o una prueba de VPH
- c. Para ayudar en el diagnóstico de HSIL (CIN2) frente a LSIL (CIN1) en casos morfológicamente equívocos
- d. Todas las respuestas anteriores son correctas



[◀ Material on-line // M4C Gestión de Cribado: Manejo Clínico / Seguimiento Después de Tto.](#)

[Material on-line // M5 Uso de la Autotoma de Células Cervicovaginales ▶](#)