

El paciente pediátrico en urgencias y emergencias (2023)

Pregunta
1
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
🚩 Marcar pregunta

¿Para qué sirve la ventana trasera del collarín cervical?

Seleccione una:

- a. Para valorar presencia de pulso.
- b. Para visualizar ingurgitación yugular.
- c. Valorar presencia de hematoma en la base del cráneo.
- d. Para ajustar la talla en función del cuello del paciente.

Quitar mi elección

Pregunta
2
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
🚩 Marcar pregunta

Según la extensión de las quemaduras debemos valorar la superficie corporal quemada (SCQ) de un niño de 5 años que presenta quemaduras en ambos brazos:

Seleccione una:

- a. SCQ 12%
- b. SCQ 36%
- c. SCQ 18%
- d. SCQ 20a%

Quitar mi elección

os privados

Pregunta
3
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
🚩 Marcar pregunta

¿Qué es el ahogamiento húmedo?

Seleccione una:

- a. Es el ahogamiento atribuido a laringoespasmo que persiste hasta que acontece la muerte por anoxia.
- b. El paciente sobrevive a la inmersión, al menos de forma temporal.
- c. Ahogamiento atribuido a la aspiración de agua a los pulmones (también arena, lodo, vómito...).
- d. Muerte producida por asfixia dentro de un plazo de 72h.

Quitar mi elección

Pregunta

4

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Cuál de los siguientes fármacos no se utiliza como anestésico local?

Seleccione una:

- a. Fentanilo.
- b. Gel Lat.
- c. Lidocaína.
- d. Mepivacaína.

Quitar mi elección

Pregunta

5

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Cómo clasificamos una quemadura con flictena pero que conserva los folículos pilosos?

Seleccione una:

- a. De primer grado.
- b. De segundo grado B.
- c. De segundo grado A.
- d. De tercer grado.

Quitar mi elección

Pregunta

6

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Entre las lesiones focales más frecuentes del TCE se encuentran:

Seleccione una:

- a. Hematoma subdural.
- b. Hematoma epidural.
- c. Hemorragia subaracnoidea.
- d. Todas son correctas.

Quitar mi elección

Pregunta

7

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Qué antídoto administraremos ante una intoxicación por Benzodiazepinas?

Seleccione una:

- a. Flumacenilo.
- b. Naloxona.
- c. N-acetilcisteína.
- d. Carbón activado.

Quitar mi elección

Pregunta

8

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Cuál de los siguientes es el dispositivo indicado para el transporte aéreo?

Seleccione una:

- a. Colchón de vacío.
- b. Tablero espinal.
- c. Camilla de cuchara.
- d. Camilla de la ambulancia.

Quitar mi elección

Pregunta

9

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Cuál de las siguientes NO es una solución cristaloide?

Seleccione una:

- a. Suero Salino Fisiológico.
- b. Suero Glucosado 5%.
- c. Albúmina.
- d. Suero Glucosalino 1/3.

Quitar mi elección

Pregunta

10

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

"Inducir un estado que permita al paciente tolerar un procedimiento desagradable, sin interferir en sus funciones corporales". Esta definición pertenece a:

Seleccione una:

- a. Analgesia.
- b. Ansiolisis.
- c. Sedoanalgesia. ✘
- d. Sedación.

Pregunta

11

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Durante el tratamiento de las quemaduras realizaremos reposición hidroelectrolítica para conseguir: Señale la FALSA.

Seleccione una:

- a. Maximizar la formación de edema.
- b. Reponer las pérdidas secundarias a las quemaduras.
- c. Aportar una perfusión adecuada.
- d. Normalizar el equilibrio ácido-base.

Quitar mi elección

Pregunta

12

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Señale la definición de ANALGESIA:

Seleccione una:

- a. Aliviar el dolor sin inducir alteraciones del estado mental.
- b. Inducir al paciente un estado que le permita tolerar un procedimiento desagradable, sin interferir en sus funciones corporales.
- c. Disminución del temor en relación a una situación dada, sin alterar el estado mental.
- d. Ninguna es correcta. ✘

La opción B es la definición de SEDACIÓN y la C es la definición de ANSIOLISIS.

Pregunta

13

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Ante un niño que ha ingerido una dosis tóxica de Paracetamol hace más de 8 horas, ¿qué actuación debemos realizar inicialmente?

Seleccione una:

- a. Se iniciará tratamiento antibiótico inmediatamente.
- b. Se iniciará la administración de N-acetilcisteína y se realizarán niveles de Paracetamol en sangre y analítica.
- c. Se iniciará la administración de Naloxona y se realizarán niveles de Paracetamol en sangre y analítica.
- d. Todas son falsas.

Quitar mi elección

Pregunta

14

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Dónde colocaremos las cinchas con forma de "v" del arnés araña?

Seleccione una:

- a. Sobre la cabeza del paciente.
- b. Sobre el pecho, debajo del pecho si es mujer.
- c. En la cintura pélvica.
- d. Sobre los hombros.

Quitar mi elección

Pregunta

15

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Qué medidas debemos tener en cuenta ante un paciente quemado?

Seleccione una:

- a. Sondaje vesical para control de diuresis.
- b. Soporte psicológico del niño y de sus padres.
- c. Vigilar la privación del sueño y el prurito, ya que son secuelas frecuentes.
- d. Todas son correctas.

Quitar mi elección

Pregunta

16

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Señale la respuesta INCORRECTA: Durante el examen neurológico de un paciente que ha sufrido un TCE, debemos valorar:

Seleccione una:

- a. Tamaño, simetría y reactividad pupilar.
- b. Detectar déficits neurológicos, habitualmente motores (debilidad, asimetría), que podrían ser signos de lesión cerebral establecida o inminente (herniación).
- c. Detectar reactividad pupilar rápida, ya que esto podría indicar lesión cerebral traumática.
- d. Valoraremos pares craneales, reflejos osteotendinosos, marcha y sensibilidad.

Quitar mi elección

Pregunta

17

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Son signos sugestivos de fractura de la base del cráneo, la presencia de: Señale la FALSA.

Seleccione una:

- a. Equimosis periorbitaria.
- b. Equimosis retroauricular.
- c. Hematemesis.
- d. Hemotímpano o sangre en CAE.

Quitar mi elección

Pregunta

18

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Qué analgésico emplearemos ante un dolor moderado como primera opción?

Seleccione una:

- a. Metamizol.
- b. Paracetamol.
- c. Ibuprofeno. ✘
- d. Fentanilo.

Pregunta

19

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Llega a su servicio de urgencias un paciente de 6 años, que se ha precipitado desde una altura de 2 metros. El niño está llorando y las constantes vitales son normales. Señale las acciones que realizaremos inicialmente:

Seleccione una:

- a. Sospecharemos lesión cervical, debido al mecanismo violento, hasta demostrar su indemnidad, y mantendremos alineación cabeza-cuello-tronco.
- b. Dejaremos que el niño se coloque en una posición en la que se encuentre cómodo.
- c. Colocaremos sonda vesical para descartar hematuria por traumatismo genital.
- d. Realizaremos intubación endotraqueal.

Quitar mi elección

Pregunta

20

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Qué analgésico emplearemos ante un dolor leve como primera opción?

Seleccione una:

- a. Paracetamol.
- b. Metamizol.
- c. Fentanilo.
- d. Cloruro Mórfico.

Quitar mi elección

CASO PRÁCTICO

Información

○

🚩 Marcar pregunta

Entra en su servicio de urgencias un niño de 11 años, trasladado por sus padres, refieren que se ha caído por unas escaleras desde mucha altura (no saben precisar los metros). El paciente no recuerda lo sucedido. Se queja de mucho dolor y su cara está ensangrentada.

Exploración general: Peso: 30kg. TA 108/54 mmHg. Fc 110 ppm. Sat O2 98%. Glasgow 15. Impresiona de gravedad, consciente y orientado. Muy afectado por el dolor, con un relleno capilar normal. Eupneico. Pupilas isocóricas y normorreactivas con movilidad ocular extrínseca normal. Herida profunda de unos 6 cm de longitud en región inferior de ceja izquierda, hematoma periorbitario ojo izquierdo. Contusión nasal, restos de sangre en ambas fosas nasales. Otorragia oído derecho. Columna cervical y dorso lumbar: sin dolor, movilidad y sensibilidad conservadas. ACP: normal. Tórax estable. Abdomen: blando, sin dolor ni defensa. Pelvis estable. Intenso dolor.

Pregunta

1

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Teniendo en cuenta que, por el momento, no es necesario instaurar medidas terapéuticas inmediatas para normalizar las constantes vitales, ¿qué actuación realizaremos inicialmente?

Seleccione una:

- a. Intubación endotraqueal.
- b. Inmovilizar columna cervical, manteniendo alineación cabeza-cuello-tronco.
- c. Canalizar vía intraosea.
- d. Colocar collarín bando.

Quitar mi elección

Pregunta

2

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

El paciente presenta un hematoma periorbitario izquierdo y otorragia derecha, ¿qué debemos sospechar ante estos signos?

Seleccione una:

- a. Hematoma epidural.
- b. Otorrea de líquido cefalorraquídeo.
- c. Disminución del nivel de conciencia.
- d. Fractura de base del cráneo.

Quitar mi elección

Pregunta

3

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Ante una sospecha de fractura de la base del cráneo, ¿qué medidas debemos tomar?

Seleccione una:

- a. Canalizar dos vías venosas periféricas de gran calibre.
- b. Posponer colocación de sonda nasogástrica (si precisa) hasta descartar fractura de base del cráneo.
- c. Realizar vigilancia neurológica continua.
- d. Todas son correctas.

Quitar mi elección

Pregunta

4

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Según la Escala de Glasgow del paciente, como clasificaríamos el Traumatismo Craneoencefálico?

Seleccione una:

- a. Leve. ✖
- b. Moderado.
- c. Grave.
- d. Ninguna es correcta.

Pregunta

5

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Se ha descartado mediante pruebas de imagen la lesión cervical y se ha confirmado la fractura de la base del cráneo (fractura del ala del esfenoides derecha y del seno esfenoidal) también se objetiva fractura de pared medial de órbita izquierda y pequeño hematoma subdural. Horas más tarde, el paciente continúa en nuestro box de urgencias (esperando cama de UCIP). El niño presenta cefalea intensa, vómitos de repetición y disminución del nivel de consciencia. Realiza apertura ocular únicamente en respuesta a la voz, su respuesta verbal es confusa y ante estímulos dolorosos en los pies, los retira. ¿Qué puntuación le daríamos en la escala de coma de Glasgow?

Seleccione una:

- a. 11
- b. 15
- c. 16
- d. 6

Quitar mi elección

Pregunta

6

Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

🚩 Marcar
pregunta

Un hematoma subdural es:

Seleccione una:

- a. Colección de sangre localizada por encima de la duramadre.
- b. Colección de sangre en el espacio subaracnoideo.
- c. Colección de sangre localizada por debajo de la duramadre.
- d. Todas son incorrectas.

Quitar mi elección

Pregunta

7

Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

🚩 Marcar
pregunta

¿Qué medidas y/o cuidados debemos llevar a cabo ante este paciente?

Seleccione una:

- a. Evitar la hipoxia: Establecer un adecuado soporte ventilatorio y monitorización continua de la Sat O2.
- b. Vigilancia neurológica.
- c. Monitorización continua para vigilancia hemodinámica.
- d. Todas son correctas.

Quitar mi elección

Pregunta

8

Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

🚩 Marcar
pregunta

¿Qué complicaciones sistémicas pueden ocurrir tras un TCE?

Seleccione una:

- a. Descenso de la tensión arterial.
- b. Hipoxemia.
- c. Hipertermia.
- d. Todas son correctas.

Quitar mi elección