



[Página Principal](#) ▶ [Mis cursos](#) ▶ [CT.B040](#) ▶ [Examen final](#) ▶ [Caso clínico](#)

---

**Comenzado el** Lunes, 12 de junio de 2023, 01:50

---

**Estado** Finalizado

---

**Finalizado en** Lunes, 12 de junio de 2023, 02:11

---

**Tiempo empleado** 20 minutos 56 segundos

---

**Calificación** 0,00 de 10,00 (0%)

---

**Comentario -** No apto



## Información



Eva, gestante de 34 semanas, acude a urgencias por contracciones. A la exploración, se detecta un cuello borrado, blando y centrado con 8 centímetros de dilatación. Cuando ingresa en paritorio ya está en dilatación completa, presenta pujos y la cabeza fetal se sitúa en segundo plano de Hodge.

Nace un recién nacido sano, varón, con Apgar 8/10 y buen estado general en su evaluación. Se realiza pinzamiento tardío del cordón y se revisa periné, que no requiere sutura. Se efectúa alumbramiento dirigido, con oxitocina intravenosa.

En el alumbramiento, a los 20 minutos del expulsivo, se observa sangrado en un cotiledón, sugiriendo que la placenta no ha salido de manera íntegra. Además, hay sangrado profuso uterino. Se avisa a ginecología, que extrae manualmente el resto placentario. Se pautan misoprostol y profilaxis antibiótica con ampicilina.



Pregunta

1

Incorrecta

Se puntúa 0,00  
sobre 1,00

¿Cuál de los fármacos utilizados es probable que influya en la estimulación hormonal de la glándula mamaria tras el parto?

Seleccione una:

- a. Oxitocina. ✘
- b. Misoprostol.
- c. Ampicilina.
- d. Ninguno.

Módulo 2.1, epígrafe 5.1. Hemorragia posparto.

La respuesta correcta es: Ninguno.



Pregunta

2

Incorrecta

Se puntúa 0,00  
sobre 1,00

Eva desea amamantar a su bebé. En este caso se aconseja prioritariamente:

Seleccione una:

- a. Iniciar lo antes posible la lactancia materna y valorar extracción de leche si no se produce el agarre en las primeras 6 horas de vida. ✘
- b. Iniciar lo antes posible la lactancia materna y valorar extracción de leche si la pérdida de peso en las primeras 24 horas de vida supera al 6% del peso al nacimiento.
- c. Iniciar lo antes posible la lactancia materna y la extracción de leche materna en las primeras 6 horas postparto, aunque el lactante pueda hacer succión directa del pecho.
- d. Iniciar lo antes posible la lactancia materna y valorar extracción de leche si se detectara hipoglucemia neonatal a las 6 horas de vida.

Módulo 3, epígrafe 4.3.6. Medidas de promoción y soporte de la lactancia materna en lactantes prematuros.

La respuesta correcta es: Iniciar lo antes posible la lactancia materna y la extracción de leche materna en las primeras 6 horas postparto, aunque el lactante pueda hacer succión directa del pecho.



Pregunta

3

Incorrecta

Se puntúa 0,00  
sobre 1,00

A la semana de vida, el bebé de Eva, Martín, no obtiene un aporte suficiente de leche materna con succión directa del pecho de su madre. Tras una adecuada evaluación y seguimiento, se determina que precisa recibir parte de su alimentación en forma de suplemento. Eva no dispone de leche extraída, por lo que la siguiente opción será:

Seleccione una:

- a. Leche de donante de un banco de leche, ya que Martín fue prematuro. ✘
- b. Leche de donante de un banco de leche, en cualquier caso.
- c. Leche artificial.
- d. Leche artificial hidrolizada, por ser prematuro.

Módulo 2.2., epígrafe 3.2. Suplementación.

La respuesta correcta es: Leche artificial.



Pregunta

4

Incorrecta

Se puntúa 0,00  
sobre 1,00

Eva consulta si sería beneficioso ofrecerle al niño agua con glucosa, puesto que su madre le ha dicho que eso le recomendaron a ella cuando alimentó a Eva y a sus hermanos. Le diremos que:

Seleccione una:

- a. No supone riesgo alguno, de hecho, se utiliza como **×** analgesia en los hospitales, pero no favorecerá la ganancia ponderal necesaria en Martín.
- b. Sí puede darle porque supondrá un aporte calórico extra, pero procurando que no sustituya a las tomas de leche.
- c. Está desaconsejado porque suele causar hiperglucemia.
- d. Está desaconsejado porque puede causar hiponatremia.

Módulo 2.2, epígrafe 3.2. Suplementación.

La respuesta correcta es: Está desaconsejado porque puede causar hiponatremia.



Pregunta

5

Incorrecta

Se puntúa 0,00  
sobre 1,00

Han pasado 2 meses tras el nacimiento de Martín. Eva acude a consulta y explica que mantienen una exitosa lactancia materna exclusiva. Pronto ella deberá volver al trabajo y, aunque solicitará reducción de jornada, quiere ir preparando un banco de leche en casa para que Martín pueda comer en las horas en las que ella esté fuera. No tiene claro cómo debería descongelar la leche:

Seleccione una:

- a. Si la necesita rápidamente, en el microondas, removiéndola de vez en cuando para lograr una temperatura uniforme.
- b. En nevera.
- c. Al baño María calentando el envase hasta que comience a hervir, apartándolo en ese instante de la fuente de calor y dejando que atempere.
- d. b y c son correctas. ✘

Módulo 2.2, epígrafe 3.2.2. Manejo leche materna.

La respuesta correcta es: En nevera.



Pregunta

6

Incorrecta

Se puntúa 0,00  
sobre 1,00

¿Cuánto tiempo puede pasar como máximo hasta tener que desechar esa muestra descongelada?

Seleccione una:

- a. Hasta 7 días en nevera a 4 grados.
- b. 1 día en nevera a 4 grados.
- c. 4 horas a temperatura ambiente.
- d. b y c son correctas. ✘

Módulo 2.2, epígrafe 3.2.2. Manejo leche materna.

La respuesta correcta es: 1 día en nevera a 4 grados.





Pregunta

7

Incorrecta

Se puntúa 0,00  
sobre 1,00

Unos días después vuelve Eva a consulta a causa de unas molestias en el pecho que no había sentido antes. Refiere malestar general, tal vez causado por unas décimas (37,3°C) y dolor mamario que, afortunadamente, disminuye sustancialmente tras el vaciado del pecho. Este cuadro sugiere que Eva padece:

Seleccione una:

- a. Ingurgitación mamaria.
- b. Mastitis. ✘
- c. Grietas en ambos pezones.
- d. Una crisis de lactancia.

Módulo 2.2, epígrafe 2.1. Ingurgitación.

La respuesta correcta es: Ingurgitación mamaria.



Pregunta

8

Incorrecta

Se puntúa 0,00  
sobre 1,00

Eva explica que ha estado tomando amoxicilina hace 10 días por una faringitis. Se le sugieren a Eva medidas no farmacológicas para manejar su estado. Al día siguiente Martín tiene revisión con el pediatra y se le pide a Eva que pase de nuevo por la consulta para valorar evolución. La actuación:

Seleccione una:

- a. Es incorrecta, puesto que la mastitis debe tratarse con antibióticos sin esperar ni si quiera al resultado del cultivo de leche.
- b. Es incorrecta, puesto que debía haberse extraído ✘ leche para su cultivo desde un inicio e instaurar antibioterapia empírica.
- c. Es incorrecta, puesto que se debía haber pautado también una pomada de lanolina.
- d. Es correcta.

Módulo 2.2, epígrafe 2.2. Mastitis.

La respuesta correcta es: Es correcta.



Pregunta

9

Incorrecta

Se puntúa 0,00  
sobre 1,00

Al revisar el estado de Eva al día siguiente explica que el dolor se ha hecho profundo y severo y ya no cede tras las tomas. Refiere pinchazos como agujas. Ha notado que se extrae menos cantidad de leche con el extractor. La fiebre subió a 38,1°C anoche. El malestar general ha dado a paso a dolores musculares y articulares. Estamos ante:

Seleccione una:

- a. Una disdibiosis mamaria.
- b. Una mastitis subaguda. ✘
- c. Una ingurgitación.
- d. Una recidiva de su faringitis previa, con grietas en el pezón concomitantes.

Módulo 2.2, epígrafe 2.2. Mastitis.

La respuesta correcta es: Una disdibiosis mamaria.



Pregunta

10

Incorrecta

Se puntúa 0,00  
sobre 1,00

En este caso:

Seleccione una:

- a. Se deben pautar antibióticos y, si en 48 horas no causan mejoría, se solicitará un cultivo de leche.
- b. Se debe solicitar un cultivo de leche.
- c. Se debe recoger leche para cultivo desechando las primeras gotas (o bien haciéndolo justo tras una toma).
- d. Se deben recoger, al menos, 5ml de leche y, cuando se obtenga el resultado del antibiograma, pautar tratamiento antibiótico específico.

Módulo 2.2, epígrafe 2.2. Mastitis.

La respuesta correcta es: Se debe solicitar un cultivo de leche.

Actividad previa

◀ Examen

Ir a...

Siguiente actividad

Encuesta de satisfacción  
del alumnado al finalizar  
la acción formativa. ▶

# Colegio Oficial de Enfermería de Madrid



 <https://www.codem.es>

