

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes pruebas NO SE PUEDE realizar en muestras recolectadas en medio líquido?

Seleccione una:

a.

Citología convencional

b.

Citología de base líquida

c.

Pruebas de ADN del VPH

d.

Pruebas de ARN para el VPH

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué es la sensibilidad de una prueba de cribado?

Seleccione una:

a.

La proporción de sujetos con enfermedad (clasificados como positivos) correctamente identificados mediante la prueba de cribado.

b.

La proporción de negativos reales (es decir, sujetos sin enfermedad real) entre los identificados mediante la prueba como negativos.

c.

La probabilidad de que un sujeto con un resultado negativo en la prueba tenga la enfermedad.

d.

La proporción de sujetos sin enfermedad (clasificados como negativos por la prueba de referencia) identificado correctamente mediante la prueba de cribado.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El VPH causa todos o algunos, de los siguientes tipos de cáncer:

Seleccione una:

a.

Cáncer de cuello uterino

b.

Otros cánceres anogenitales como cáncer anal, vulvar, vaginal y de pene

c.

Cánceres de cabeza y cuello, como cavidad bucal, laringe y orofaringe

d.

Todas las afirmaciones anteriores son correctas

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA** sobre el proceso de carcinogénesis?

Seleccione una:

a.

Se sospecha que el proceso de carcinogénesis está desencadenado por las oncoproteínas E6 y E7.

b.

La mayoría de las lesiones CIN3 progresan a cáncer.

c.

Existen algunos factores, como el consumo de tabaco, asociados a la progresión de infección a lesiones o cáncer.

d.

La mayoría de las infecciones por el VPH remiten por sí mismas.

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes puntos son válidos con respecto a los requisitos de las pruebas de detección de VPH para ser usadas en regiones con bajos recursos?

Seleccione una:

a.

Bajo Coste

b.

Posibilidad de realización de pruebas rápidas

c.

Baja necesidad de infraestructura laboratorial

d.

Todas las afirmaciones anteriores son correctas

Pregunta **6**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La conducta clínica basada en el riesgo tiene como indicador principal:

Seleccione una:

a.

El riesgo absoluto de desarrollar precancer+

b.

La frecuencia de cribado en los últimos 5 años



c.

El resultado de la citología



d.

El porcentaje de mujeres positivas a VPH

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el valor predictivo negativo de una prueba de cribado?

Seleccione una:



a.

La probabilidad de que un sujeto con un resultado negativo en la prueba tenga la enfermedad.



b.

La proporción de sujetos sin enfermedad (clasificados como negativos por la prueba de referencia) identificado correctamente mediante la prueba de cribado.



c.

La proporción de negativos reales (es decir, sujetos sin enfermedad real) entre los identificados mediante la prueba como negativos.



d.

La proporción de sujetos con enfermedad (clasificados como positivos) correctamente identificada mediante la prueba de cribado.

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué prueba de triaje es la recomendada ante un resultado de citología ASCUS?

Seleccione una:



- a.
Prueba de VPH
- b.
Repetir la citología
- c.
Metilación
- d.
Ninguna de las anteriores

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

Seleccione una:

-
- a.
Aunque la mayoría de las lesiones remiten, al aumentar la gravedad de las lesiones se asocia a tasas de regresión son más bajas.
- b.
La mayor prevalencia de las lesiones de bajo grado tiene lugar a principios de la veintena, mientras que en el caso de las lesiones de alto grado se produce cerca de la treintena.
- c.
La prevalencia de lesiones cervicales según la edad es siempre la misma independientemente de la población de estudio.
- d.
CIN1 es un diagnóstico histopatológico de infección productiva por el VPH. La mayoría de estas lesiones remiten por si solas por si solas.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las mujeres con una biopsia LSIL/CIN1...

Seleccione una:

a. tienen una probabilidad baja de tener o desarrollar cáncer de cuello uterino

b. deben manejarse de acuerdo con sus antecedentes de cribado anteriores

c. pueden tener infección por VPH de bajo riesgo

d. Todas son correctas

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Uno de los cambios más relevantes en la última clasificación de la OMS de lesiones escamosas de cuello uterino es que:

Seleccione una:

a. Los biomarcadores como p16 son considerados en el diagnóstico de lesiones relacionadas con el VPH

b. HSIL y LSIL son los términos preferidos para designar el resultado tanto de muestras histológicas como de muestras citológicas del cuello uterino

c. Los tumores escamosos del tracto genital femenino inferior también se dividen en asociados al VPH e independientes del VPH

d. Todas las respuestas anteriores son correctas

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué ventajas podría proporcionar la inteligencia artificial (IA) a la hora de interpretar una imagen de cuello uterino digital, en comparación con la detección de referencia mediante citología o IVAA?

Seleccione una:

a.

La interpretación es más reproducible

b.

El uso de IA aumenta la precisión del diagnóstico

c.

El uso de IA implica menos capacitación para los proveedores

d.

La IA puede resultar ser un método de cribado más rentable

e.

Todas las afirmaciones anteriores son correctas

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El triaje de las mujeres positivas al VPH identificadas en los programas de cribado basados en el VPH es necesario para:

Seleccione una:

a.

Limitar la carga de las visitas de seguimiento para las mujeres y los servicios sanitarios.

b.

Evitar el sobretratamiento de las mujeres que dan positivo en el cribado pero que no tienen la enfermedad cervicouterina.

c.

Identificar a las mujeres con mayor riesgo de precáncer o cáncer de cuello uterino para su posterior manejo/vigilancia.



d.

Todo lo anterior

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Que prueba de triaje está mas validada en cuanto a su precisión diagnóstica en un programa de cribado poblacional?

Seleccione una:



a.

La detección de los 14 VPHs de alto riesgo



b.

La inspección visual con ácido acético



c.

La citología



d.

La carga viral

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA en relación con las diferencias entre programas de cribado organizado e oportunista?

Seleccione una:



a.

Un cribado oportunista es más eficaz que un cribado organizado porque permite un mejor uso de los recursos disponibles.



- b.
Un cribado oportunista puede dar lugar a situaciones de desigualdad, como una detección sistemática excesiva de sujetos con riesgo bajo de desarrollar la enfermedad y una detección insuficiente de pacientes en riesgo alto.
- c.
La falta de participación es la principal causa de falta de éxito de los programas de cribado tanto oportunista como organizado.
- d.
Ninguna de las anteriores es correcta

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuántos cánceres se estima que son causados por el VPH?

Seleccione una:

-
- a.
Alrededor de 200.000
- b.
Alrededor de 700.000
- c.
Alrededor de 400.000
- d.
Alrededor de 1 millón

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es uno de los 10 principios de cribado de Wilson y Jungner?

Seleccione una:



a.

Debe haber un estadio sintomático latente o precoz reconocible.



b.

La prueba debe ser muy fiable incluso si no es muy aceptable para la población.



c.

Debe disponerse de instalaciones para el diagnóstico y el tratamiento.



d.

La enfermedad debe suponer un problema de salud importante.

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En comparación con la citología convencional, la citología de base líquida...

Seleccione una:



a.

no hay diferencias entre ellas.



b.

es más específica.



c.

es más sensible.



d.

muestra una tasa inferior de muestras insatisfactorias

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes comportamientos sexuales se asocia a las infecciones anogenitales por VPH?

Seleccione una:

a.
Edad temprana de inicio de la actividad sexual

b.
Gran número de parejas sexuales a lo largo de la vida

c.
Comportamiento sexual de las parejas sexuales

d.
Todas las afirmaciones anteriores son correctas

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El VPH hace referencia a...

Seleccione una:

a.
Virus del papiloma humano, más de 200 tipos de virus

b.
Virus del papiloma de alto riesgo, un único virus

c.
Virus del papiloma de alto riesgo, más de 200 tipos de virus

d.
Virus del papiloma humano, un único virus