

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas afirmaciones sobre la ejecución de la autotoma en el cribado es **FALSA**?

Seleccione una:

a.

Se recomiendan controles de calidad en todos los procesos.

b.

Se recomiendan la monitorización y la evaluación de la introducción de la autotoma en la población.

c.

Se recomienda una buena formación de todo el personal implicado.

d.

Dada la evidencia de la literatura, todos los programas de cribado deberían incluir la autotoma sin ensayos previos.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes frases es **FALSA** respecto a que información incluir en el folleto y la carta de invitación al cribado?

Seleccione una:

a.

Debe informar sobre los beneficios y riesgos del cribado.

b.

Debe informar sobre los beneficios del cribado sin mención de posibles efectos adversos.

c.

Debe informar sobre la posibilidad de pruebas de seguimiento.

d.

Debe informar sobre la estrategia de cribado: grupos de edad, pruebas, periodicidad, etc.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se observa un efecto mayor y más rápido en el impacto directo y la inmunidad de grupo de la vacunación cuando....

Seleccione una:

a.

Se vacuna una única cohorte de edad y la cobertura de vacunación es baja.

b.

Nunca. Ni el número de cohortes ni la cobertura afectan al impacto de la vacuna

c.

Se vacunan múltiples cohortes de edad y la cobertura de vacunación es alta.

d.

Se vacuna una única cohorte de edad pero la cobertura de vacunación es alta.

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué estrategia de cribado tiene elevada validez diagnóstica para CIN2+ en MIVIH?

Seleccione una:

a.

IVAA

b.

Citología de cuello uterino



c.
Métodos de detección de VPH basados en el ADN



d.
Ninguna de las anteriores

Pregunta **5**

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué opción es VERDADERA acerca de la necesidad de identificar a las mujeres de la población diana de cribado?

Seleccione una:



a.
No es necesaria si está previsto realizar una campaña usando medios de comunicación.



b.
No es importante si todos los profesionales sanitarios conocen el programa de cribado.



c.
Es fundamental para conseguir una alta cobertura.



d.
A y B son correctas

Pregunta **6**

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué opción es FALSA sobre el seguimiento después de una prueba de cribado positiva?

Seleccione una:



a.
Es fundamental para la eficacia del programa.



- b.
Un sistema de invitación para realizar las pruebas de seguimiento aumenta el cumplimiento del seguimiento.
-
- c.
Requiere protocolos de actuación específicos para cada resultado del cribado.
-
- d.
El seguimiento no es motivo de preocupación para un programa de cribado.

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué afirmación es VERDADERA sobre los datos de la eficacia de la vacunación contra el VPH en el cáncer de cuello uterino?

Seleccione una:

-
- a.
Debido a la prolongada latencia entre la infección por el VPH y el cáncer, todavía no hay pruebas sobre la eficacia de la vacunación contra el VPH en el cáncer de cuello uterino.
-
- b.
Recientemente se ha confirmado la eficacia de la vacunación contra el VPH para reducir el riesgo de cáncer de cuello uterino en las cohortes vacunadas.
-
- c.
Existen pruebas convincentes de la eficacia de la vacunación contra el VPH en la prevención del cáncer de cuello uterino, no solo entre las cohortes vacunadas, sino también entre las niñas y mujeres no vacunadas (protección cruzada).
-
- d.
Las respuestas B y C son correctas.

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las cohortes de mujeres que ya han sido vacunadas contra el VPH...

Seleccione una:

a.
tendrán el mismo riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino durante toda la vida y, por lo tanto, no deberán hacerse cambios en los programas de cribado de cáncer de cuello uterino existentes.

b.
tendrán un riesgo muy bajo de desarrollar cáncer de cuello uterino a lo largo de toda la vida, pero seguirán necesitando un cribado regular del cáncer de cuello uterino, aunque en un programa menos intenso.


c.
tendrán el mismo riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino a lo largo de toda la vida, y por tanto seguirán necesitando un cribado sistemático periódico del cáncer de cuello uterino, aunque en un programa menos intenso.

d.
tendrán un riesgo muy bajo de desarrollar cáncer de cuello uterino a lo largo de toda la vida y, por tanto, no necesitarán ninguna prueba de cribado del cáncer de cuello uterino.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué afirmación es FALSA acerca del efecto de la vacunación contra el VPH en la infección por el VPH y las lesiones precancerosas del cuello uterino en países con alta cobertura de vacunación?

Seleccione una:

a.
La vacunación contra el VPH reduce la prevalencia de las infecciones por el VPH 16/18 en las cohortes vacunadas.

b.
La vacunación contra el VPH reduce la prevalencia de todos los tipos de infección por el VPH (infecciones causadas por cualquier tipo de VPH, independientemente de si está incluido en la vacuna contra el VPH o no) en las cohortes vacunadas.

c.
La vacunación contra el VPH reduce la prevalencia de las infecciones por el VPH 16/18 en las cohortes no vacunadas (mujeres mayores y parejas sexuales).

d.

La vacunación contra el VPH reduce la prevalencia de lesiones precancerosas de cuello uterino de alto grado en las cohortes vacunadas.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué medidas de validez diagnóstica de la citología se ven afectadas por una menor incidencia de lesiones de cuello uterino en mujeres vacunadas?

Seleccione una:

a.

El VPP disminuye, pero la sensibilidad y la especificidad no se ven alteradas debido al hecho de que son dos medidas de validez independientes de la prevalencia de la enfermedad.

b.

El valor predictivo positivo (VPP) aumenta, pero la sensibilidad y la especificidad se reducen.

c.

El VPP disminuye, así como la sensibilidad y la especificidad.

d.

El rendimiento de la citología no se ve alterado.

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas opciones es FALSA en relación con la implementación de un programa de cribado?

Seleccione una:

a.

No hay necesidad de un equipo de supervisión del programa porque todos los profesionales saben qué hacer.



b.

Los programas piloto son una pérdida de tiempo si el programa está bien planificado.



c.

Los diferentes profesionales, niveles de atención y proveedores implicados deben coordinarse explícita y formalmente.



d.

A y B son falsas.

Pregunta **12**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes opciones es VERDADERA sobre el control de calidad?

Seleccione una:



a.

La acreditación ISO 15189 proporciona una certificación objetiva e independiente del compromiso de un laboratorio con la calidad y de su competencia técnica.



b.

Un indicador de calidad en colposcopia es que al menos el 50% de los tratamientos/conizaciones por escisión tengan un diagnóstico histológico definitivo de HSIL/CIN2+.



c.

Los controles de calidad externos de un ensayo del VPH están concebidos para evaluar el rendimiento clínico de la tecnología de detección del VPH y ser realizados dentro del mismo laboratorio.



d.

En el control interno de la citología, solo se revisan los casos patológicos.

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA** en relación con el control de calidad de un programa de cribado?

Seleccione una:

a.

Tanto la citología como la prueba del VPH tienen controles de calidad internos y externos que deben realizarse con regularidad.

b.

Los laboratorios de citología y del VPH, así como las unidades de colposcopia o de patología cervical, deben procesar suficientes pruebas para mantener una experiencia adecuada entre su personal.

c.

Debe evaluarse mediante indicadores. La información debe estar informatizada y ser evaluada por un grupo de expertos capaz de proponer mejoras.


d.

Los resultados de la citología y las pruebas del VPH son las pruebas de referencia («gold standard») para el control de calidad de la colposcopia y los diagnósticos histológicos.

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La mayor incidencia de cáncer de cuello uterino en países de ingresos medios y bajos en relación al VIH es debido a:

Seleccione una:

a.

Mayor prevalencia de VIH y VPH en PIMB

b.

Inicio/acceso tardío a terapia antiretroviral

c.

Acceso al cribado y tratamiento del cáncer de cuello uterino

d.

Todas las respuestas anteriores son correctas

Pregunta **15**

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué afirmación es VERDADERA sobre el manejo del triaje y las lesiones en las mujeres vacunadas contra el VPH?

Seleccione una:

a.

La prevalencia de la enfermedad identificada en la colposcopia en las mujeres vacunadas aumentará, lo que significa que el número de mujeres que necesitarán ser derivadas para poder detectar un caso de CIN2+ se reducirá significativamente.

b.

Es poco probable que las anomalías citológicas de bajo grado entre las mujeres que empiezan el cribado y que han sido vacunadas contra el VPH antes de los 18 años requieran una colposcopia inmediata.

c.

Habrá que flexibilizar las recomendaciones de gestión de las lesiones para equilibrar de forma óptima los beneficios y riesgos. El enfoque de " Mismo nivel de riesgo, mismo manejo clínico" puede servir de base para las nuevas directrices.

d.

Las respuestas B y C son correctas

Pregunta **16**

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué región del mundo presenta una mayor incidencia combinada de cáncer de cuello uterino y prevalencia del VIH en mujeres de 15 años o más?

Seleccione una:

a.

Sudeste Asiático

b.

África subsahariana



c.
Europa y Norteamérica



d.
América Latina

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes NO ES un indicador para evaluar un programa de cribado?

Seleccione una:



a.
El número de mujeres sometidas a colposcopia y con CIN2+ confirmado histológicamente.



b.
El porcentaje de mujeres cribadas con CIN3+ confirmado histológicamente.



c.
El número de pruebas de cribado realizadas por mujer.



d.
El porcentaje de mujeres con una infección de transmisión sexual.

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la cobertura de las pruebas de cribado (en cuanto a las mujeres que hayan notificado al menos una prueba de detección en su vida) en los países de ingresos medios y bajos, en regiones con mayor carga de cáncer de cuello uterino y VIH?

Seleccione una:



- a.
20-50%
- b.
<20%
- c.
50-80%
- d.
>80%

Pregunta **19**

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA en relación al manejo clínico de un resultado positivo en la autotoma?

Seleccione una:

-
- a.
A las mujeres con un resultado positivo en la autotoma se les puede realizar una citología réflex en la misma muestra.
- b.
Es importante definir un algoritmo de tratamiento clínico para las mujeres con un resultado positivo en la autotoma y garantizar, en la medida de lo posible, que estas mujeres sean objeto de triaje.
- c.
A las mujeres con un resultado positivo en la autotoma se les puede realizar genotipado utilizando la misma muestra de la autotoma.
- d.
La citología para el triaje de las mujeres con un resultado positivo de la autotoma requiere una visita adicional para la recogida de una muestra de cuello uterino.

Pregunta **20**

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A la hora de implementar la autotoma, ¿cuáles son los aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta para obtener un resultado satisfactorio?

Seleccione una:

a.

Garantizar que tanto las mujeres como los profesionales sanitarios reciban una formación adecuada sobre su uso

b.

Disponer de un mecanismo claro para informar de cualquier resultado positivo de las pruebas.

c.

Ser consciente de que puede haber una mayor pérdida de contacto o seguimiento de las mujeres que utilizan autotoma, en caso de tener un resultado positivo, que cuando se utilizan muestras recogidas por el personal sanitario.

d.

Todos los anteriores