

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [Cáncer de Cuello Uterino: Prevención y Cribado 2023](#) / [CURSO](#)  
/ [Evaluacion módulos 1 a 4 \(Grupo Mayo\)](#).

**Comenzado el** miércoles, 21 de junio de 2023, 10:01

**Estado** Finalizado

**Finalizado en** miércoles, 21 de junio de 2023, 10:13

**Tiempo empleado** 12 minutos 20 segundos

**Puntos** 14,00/20,00

**Calificación** 7,00 de 10,00 (70%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

**¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es uno de los 10 principios de cribado de Wilson y Jungner?**

Seleccione una:

- a. Debe disponerse de instalaciones para el diagnóstico y el tratamiento.
- b. La enfermedad debe suponer un problema de salud importante.
- c. Debe haber un estadio sintomático latente o precoz reconocible.
- d. La prueba debe ser muy fiable incluso si no es muy aceptable para la población. ✓

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

**Acerca de la prevención del cáncer, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CIERTA?**

Seleccione una:

- a. El uso de la citología en un programa de cribado del cáncer de cuello uterino es un ejemplo de prevención secundaria. ✓
- b. Los esfuerzos de prevención secundaria tienen como objetivo reducir la incidencia de la enfermedad.
- c. El uso de la prueba del VPH en un programa de cribado del cáncer de cuello uterino es un ejemplo de prevención primaria.
- d. El cribado se centra en la detección de la enfermedad en un estadio clínico

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

**¿Qué ventajas podría proporcionar la inteligencia artificial (IA) a la hora de interpretar una imagen de cuello uterino digital, en comparación con la detección de referencia mediante citología o IVAA?**

Seleccione una:

- a. La interpretación es más reproducible
- b. El uso de IA aumenta la precisión del diagnóstico
- c. El uso de IA implica menos capacitación para los proveedores
- d. La IA puede resultar ser un método de cribado más rentable
- e. Todas las afirmaciones anteriores son correctas

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

**En comparación con la citología convencional, la citología de base líquida...**

Seleccione una:

- a. no hay diferencias entre ellas.
- b. muestra una tasa inferior de muestras insatisfactorias
- c. es más sensible.
- d. es más específica.

Pregunta **5**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

**El seguimiento sin tratamiento de HSIL/CIN2+...**

Seleccione una:

- a. nunca se recomienda debido al alto riesgo de progresión a cáncer
- b. se asocia a un índice elevado de complicaciones
- c. solo se recomienda en mujeres embarazadas, en las que el tratamiento puede retrasarse en el posparto
- d. solo es aceptable en algunas situaciones muy específicas bajo un seguimiento estricto



Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

**El proyecto de estandarización LAST recomienda la aplicación de inmunotinción de p16 en el siguiente contexto:**

Seleccione una:

- a. Para ayudar a distinguir HSIL de imitaciones de lesiones precancerosas como metaplasia inmadura
- b. para complementar la evaluación morfológica de las muestras de biopsia interpretadas como  $\leq$ LSIL con alto riesgo de que se pasen por alto lesiones de alto grado en función de pruebas anteriores, como una prueba de Papanicolaou o una prueba de VPH
- c. Para ayudar en el diagnóstico de HSIL (CIN2) frente a LSIL (CIN1) en casos morfológicamente equívocos
- d. Todas las respuestas anteriores son correctas ✔

Pregunta **7**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

**¿Cuál de los siguientes es el cofactor más relevante de persistencia y progresión?**

Seleccione una:

- a. Carga vírica
- b. Haber tenido uno o más hijos
- c. Tipo de VPH
- d. Inmunosupresión ✘

Pregunta **8**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

**En general, la colposcopia ha demostrado tener...**

Seleccione una:

- a. Alta sensibilidad y baja especificidad para HSIL/CIN2+ en el punto de corte de la "colposcopia de impresión de alto grado" ✘
- b. Media sensibilidad y alta especificidad para HSIL/CIN2+ en el punto de corte de "cualquier anomalía colposcópica"
- c. Alta sensibilidad y alta especificidad en el punto de corte de la "colposcopia de impresión de alto grado"
- d. Alta sensibilidad y baja especificidad para HSIL/CIN2+ en el punto de corte de "cualquier anomalía colposcópica"

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

**El VPH hace referencia a...**

Seleccione una:

- a. Virus del papiloma de alto riesgo, más de 200 tipos de virus
- b. Virus del papiloma humano, más de 200 tipos de virus
- c. Virus del papiloma humano, un único virus
- d. Virus del papiloma de alto riesgo, un único virus

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA** sobre el proceso de carcinogénesis?

Seleccione una:

- a. Se sospecha que el proceso de carcinogénesis está desencadenado por las oncoproteínas E6 y E7.
- b. La mayoría de las lesiones CIN3 progresan a cáncer.
- c. Existen algunos factores, como el consumo de tabaco, asociados a la progresión de infección a lesiones o cáncer.
- d. La mayoría de las infecciones por el VPH remiten por sí mismas.

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**?

Seleccione una:

- a. La citología ha logrado reducir la incidencia de cáncer de cuello uterino en bastantes países.
- b. La citología no ha logrado reducir la incidencia de cáncer de cuello uterino en la mayoría de los países de ingresos bajos y medios.
- c. Los requisitos de citología han impedido su implementación en muchos países de bajos ingresos.
- d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas



Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

**¿Cuántos cánceres se estima que son causados por el VPH?**

Seleccione una:

- a. Alrededor de 400.000
- b. Alrededor de 200.000
- c. Alrededor de 1 millón
- d. Alrededor de 700.000

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

**El triaje de las mujeres positivas al VPH identificadas en los programas de cribado basados en el VPH es necesario para:**

Seleccione una:

- a. Limitar la carga de las visitas de seguimiento para las mujeres y los servicios sanitarios.
- b. Evitar el sobretreatmento de las mujeres que dan positivo en el cribado pero que no tienen la enfermedad cervicouterina.
- c. Identificar a las mujeres con mayor riesgo de precáncer o cáncer de cuello uterino para su posterior manejo/vigilancia.
- d. Todo lo anterior

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

**¿Que prueba de triaje está mas validada en cuanto a su precisión diagnóstica en un programa de cribado poblacional?**

Seleccione una:

- a. La citología
- b. La carga viral
- c. La inspección visual con ácido acético
- d. La detección de los 14 VPHs de alto riesgo



Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

**Que indicador es mas importante para evaluar una prueba de triaje?**

Seleccione una:

- a. Su valor predictivo o riesgo de lesión
- b. Su coste
- c. Su aplicación en auto-toma
- d. Su sensibilidad

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

**En general, en una población determinada, ¿a qué edad se produce la mayor prevalencia de la infección por el VPH?**

Seleccione una:

- a. En la adolescencia, justo después de las primeras relaciones sexuales
- b. Alrededor de principios de la veintena, algunos años después del inicio de relaciones sexuales, cuando el número de parejas sexuales en general es más elevado
- c. Cerca de la treintena, cuando las mujeres dejan de usar preservativos al estar en relaciones estables.
- d. Ninguna de las anteriores ya que la prevalencia no varía según la edad

Pregunta **17**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

**¿Cuál de los siguientes resultados no se considera asociado a un alto riesgo de HSIL/CIN3+?**

Seleccione una:

- a. Una infección por VPH 16 y/o 18
- b. Una zona de transformación de tipo 3 en la colposcopia
- c. Un resultado de citología HSIL
- d. Hallazgos de grado 2 en la colposcopia



Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación a la presencia de células escamosas atípicas en las que no puede descartarse una lesión de alto grado (ASC-H) es VERDADERA?

Seleccione una:

- a. ASC-H es un resultado de cribado citológico muy poco frecuente
- b. El riesgo de HSIL/CIN2-3 y cáncer de cuello uterino es más bajo en mujeres con ASC-H y VPH negativas respecto a las VPH positivas
- c. Debe realizarse triaje mediante pruebas del VPH
- d. A y B son correctas

Pregunta **19**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la prueba del VPH en comparación con la citología es FALSA?

Seleccione una:

- a. La prueba del VPH es más coste-efectiva.
- b. La prueba del VPH permite alargar el intervalo de tiempo hasta la siguiente prueba.
- c. La prueba del VPH es más específica.
- d. La prueba del VPH es más sensible para detectar CIN3+.

Pregunta **20**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

Seleccione una:

- a. Los VPH 16, 18 y 45 son los tipos de VPH más frecuentes en el cáncer de cuello uterino.
- b. El VPH18 es el tipo de VPH más frecuente en adenocarcinomas.
- c. El VPH 16 es el tipo de VPH más frecuente en lesiones precancerosas.
- d. La distribución de los tipos de VPH varía con el aumento de la gravedad.



[◀ Material on-line // M4C Gestión de Cribado: Manejo Clínico / Seguimiento Después de Tto.](#)

[Material on-line // M5 Uso de la Autotoma de Células Cervicovaginales ▶](#)

