

## **MODULO 1**

1. ¿Cuál es la finalidad última del triaje?
2. Las razones para realizar un traslado intrahospitalario pueden ser todas excepto:
3. En la etapa de destino debemos comprobar:
4. Señale la opción incorrecta respecto a la etapa de preparación previa para el transporte:
5. Es un factor fundamental para evitar las complicaciones durante el traslado:
6. No es un modelo de triaje:
7. No es un objetivo del triaje:
8. ¿Qué acción debemos realizar en la etapa de regreso?
9. ¿Qué acciones debemos llevar a cabo en la urgencia pediátrica para asegurar la seguridad de paciente? Señale la opción incorrecta:
10. ¿Qué consideración hay que tener en cuenta con las balas de oxígeno antes de realizar el traslado?
11. ¿Qué consideraciones hay que tener con los monitores antes del traslado de un paciente?
12. ¿Qué debemos considerar a la hora de realizar un transporte interhospitalario, según el medio de transporte?
13. ¿Qué dotación de enfermería debe tener el servicio de urgencias pediátricas?
14. ¿Qué es más importante en la priorización del riesgo en el paciente pediátrico?
15. ¿Qué no se debe tener en cuenta en el diseño de las áreas del servicio de urgencias pediátricas?

1	D
2	C
3	A
4	C
5	B
6	C
7	A
8	A
9	B
10	C
11	D
12	D
13	B
14	B
15	B

**RESPUESTA N°11 C**

## **MODULO 2**

1. ¿A qué velocidad debemos realizar las compresiones torácicas en el niño?
2. Al encontrarnos un niño en un restaurante que comienza a toser repentinamente, ¿qué debemos realizar?
3. ¿Cómo se debe dar la información a los padres ante el fallecimiento de su hijo? Señale la opción falsa:
4. ¿Cuál es el acceso vascular de elección en una RCP avanzada?
5. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la RCP pediátrica y la RCP de adultos?
6. ¿Cuál es la energía utilizada para un choque eléctrico en la edad pediátrica?
7. ¿Cuál es la primera acción a realizar?
8. ¿Cuál es la técnica más segura para aislar la vía aérea en la RCP avanzada?
9. ¿Cuáles son los principios básicos de la Ética? Señale la opción falsa:
10. ¿Cuándo finalizaremos maniobras de RCP? Señale la opción falsa:
11. ¿Cuándo mejoran los resultados de la RCP?
12. ¿En qué lugar debemos realizar las compresiones torácicas en el paciente pediátrico?
13. ¿Qué características debe tener el carro de parada de una urgencia pediátrica? Señale la opción falsa:
14. ¿Qué es la reanimación cardiopulmonar?
15. ¿Qué hacemos si después de estimular al niño este responde llorando durante la valoración?

<b><u>1</u></b>	<b><u>C</u></b>
<b><u>2</u></b>	<b><u>C</u></b>
<b><u>3</u></b>	<b><u>B</u></b>
<b><u>4</u></b>	<b><u>D</u></b>
<b><u>5</u></b>	<b><u>C</u></b>
<b><u>6</u></b>	<b><u>D</u></b>
<b><u>7</u></b>	<b><u>C</u></b>
<b><u>8</u></b>	<b><u>A</u></b>
<b><u>9</u></b>	<b><u>B</u></b>
<b><u>10</u></b>	<b><u>B</u></b>
<b><u>11</u></b>	<b><u>D</u></b>
<b><u>12</u></b>	<b><u>D</u></b>
<b><u>13</u></b>	<b><u>A</u></b>
<b><u>14</u></b>	<b><u>D</u></b>
<b><u>15</u></b>	<b><u>D</u></b>

### **MODULO 3**

1. La disminución de la frecuencia respiratoria por debajo de lo normal se denomina:
2. Ante un paciente pediátrico con un traumatismo genitourinario, indique qué actuación de enfermería es correcta:
3. Ante una otalgia, ¿cuál es la principal patología a descartar?
4. ¿Cómo realizaríamos la tolerancia oral en un niño de 2 años que llega a urgencias y es diagnosticado de gastroenteritis aguda?
5. Con un niño con sospecha de neumonía, dentro de la sala de observación, ¿cuál de estos cuidados no debemos realizar?
6. ¿Cuál es la patología endocrina más frecuente en la edad pediátrica?
7. ¿Cuáles de las causas no es una de las más frecuentes de la tos en niños entre 18 meses y 6 años?
8. ¿Cuáles son las causas de origen infeccioso más frecuentes que producen vómitos en la etapa pediátrica?
9. ¿Cuáles son las tres fases de la fiebre?
10. ¿Cuáles son los principales síntomas de la diabetes mellitus tipo I?
11. Cuando viene al triaje un niño con sospecha de bronquiolitis, ¿qué es lo primero que vamos a valorar?
12. Señale la opción correcta respecto a la valoración inicial en el triaje del paciente pediátrico politraumatizado:
13. Dentro de los cuidados de enfermería de la tos ferina, indique lo que se debe realizar:
14. En el caso de un niño que acude a urgencias con disuria y hematuria, ¿qué actuaciones podríamos hacer en el triaje?
15. ¿En qué etapa de la edad pediátrica es más frecuente la OMA?

1	C
2	D
3	D
4	D
5	A
6	D
7	C
8	C
9	A
10	A
11	D
12	D
13	D
14	C
15	C

## **MODULO 4**

1. ¿A qué concentración administraremos el oxígeno si sospechamos de una intoxicación por monóxido de carbono?
2. Cómo definimos el casi-ahogamiento:
3. ¿Cuáles son las intoxicaciones medicamentosas más frecuentes en la edad pediátrica?
4. De estos síntomas, ¿cuáles no aparecen en una intoxicación etílica?
5. De las siguientes opciones, ¿cuáles no forman parte de las principales causas de muerte en la edad pediátrica?
6. De las siguientes opciones, ¿cuáles son escalas de valoración de la extensión de la superficie corporal quemada?
7. ¿De qué grado sería una quemadura con flictena y base blanquecina?
8. En la etapa de 1 a 3 años, características de su comportamiento:
9. ¿En qué etapa de la edad infantil es más frecuente el síndrome de muerte súbita?
10. ¿Para qué colocaremos una sonda nasogástrica si un niño ha sufrido un casi-ahogamiento?
11. Señale la escala que utilizaríamos para medir el dolor a un niño de 6 a 12 años.
12. ¿Qué antídoto usamos si un niño acude a la urgencia por una intoxicación con paracetamol?
13. ¿Qué características de las siguientes son propias de los adolescentes?
14. ¿Qué debemos evaluar en las vías respiratorias cuando un niño llega a urgencias víctima de un incendio en su domicilio? Señale la opción falsa:
15. ¿Qué debemos hacer antes de realizar un lavado gástrico si el niño tiene bajo nivel de conciencia?

1	D
2	D
3	D
4	C
5	B
6	C
7	B
8	D
9	C
10	B
11	C
12	C
13	D
14	D
15	B

## **MODULO 5**

1. ¿Con qué tipo de mascarilla podemos llegar a una FiO2 del 100% usando un flujo de entre 6-15 l/min?
2. Con respecto a la administración de enemas, indique la opción correcta:
3. Con respecto a la toma de la frecuencia respiratoria, indique la opción correcta:
4. Con respecto a la toma de la saturación de oxígeno, indique la opción correcta:
5. Con respecto a las consideraciones a tener en cuenta con el niño a la hora de la realización de una técnica, indique la opción correcta:
6. Con respecto a las consideraciones que tenemos que tener en cuenta con la familia del paciente a la hora de realizar una técnica, indique la opción correcta:
7. Con respecto a las recomendaciones comunes para la preparación del niño antes de la realización de cualquier procedimiento, durante y después del mismo, indique la opción correcta:
8. ¿Cuál es la técnica de elección para recoger una muestra de orina cuando los niños no controlan la micción?
9. En la colocación de una férula, indique la opción incorrecta:
10. En la técnica de aspiración de secreciones, indique la opción correcta:
11. En la ventilación con bolsa autohinchable, indique la opción incorrecta:
12. ¿En qué etapa del desarrollo del niño la comunicación con su entorno se produce principalmente por el tacto y el contacto?
13. Indique cuál de las siguientes opciones no es un objetivo para colocar una sonda nasogástrica:
14. Indique la afirmación correcta de la administración de carbón activado:
15. Indique qué tenemos que tener en cuenta cuando retiramos un catéter periférico:

1	B
2	C
3	B
4	A
5	D
6	A
7	D
8	B
9	A
10	B
11	D
12	D
13	B
14	B
15	C