

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Con el término de "contagiosidad" nos estamos refiriendo a:

Seleccione una:

- a. La capacidad del agente etiológico o causal para propagarse. ✓
- b. La capacidad del agente etiológico de instalarse y reproducirse en los tejidos produciendo o no la enfermedad.
- c. La capacidad del agente causal para producir la enfermedad en los infectados.
- d. Es el grado de patogenicidad.

La respuesta correcta es: La capacidad del agente etiológico o causal para propagarse.

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Para que se produzca una infección y se transmita es necesario:

Seleccione una:

- a. Que haya un reservorio y una fuente de infección.
- b. Un mecanismo de transmisión.
- c. Una población susceptible de infectarse.
- d. Todas las anteriores son necesarias. ✓

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son necesarias.

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

El saneamiento y la desinsectación, son medidas de prevención de las enfermedades transmisibles que actúan sobre:

Seleccione una:

- a. El huésped susceptible.
- b. Los agentes infecciosos.
- c. La fuente de infección.
- d. Los mecanismos de transmisión. ✓

La respuesta correcta es: Los mecanismos de transmisión.

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Cómo se le denomina al ser animado o inanimado en el que el agente etiológico se reproduce y perpetúa durante un período relativamente largo en un ambiente natural?

Seleccione una:

- a. Fuente.
- b. Reservorio. ✓
- c. Portador.
- d. Huésped.

La respuesta correcta es: Reservorio.

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

El virus de la hepatitis B se puede aislar en los siguientes líquidos biológicos, excepto en uno:

Seleccione una:

- a. Sangre.
- b. Saliva.
- c. Esperma.
- d. Orina. ✓

La respuesta correcta es: Orina.

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

Señale cuál NO es un efecto adverso de las infecciones hospitalarias:

Seleccione una:

- a. Aumento de la estancia media hospitalaria.
- b. Incremento de los costes sanitarios.
- c. Disminución de medidas preventivas. ✓
- d. Incremento morbilidad y mortalidad.

La respuesta correcta es: Disminución de medidas preventivas.

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

Con respecto a las infecciones nosocomiales, señale la respuesta CORRECTA:

Seleccione una:

- a. La OMS la define como cualquier enfermedad microbiana que afecta al menos a un porcentaje mínimo de pacientes ingresados en un Hospital.
- b. En cuanto a los recién nacidos, se define como infección nosocomial cuando nace un niño infectado de una madre ya infectada al ingreso.
- c. Es aquella que se adquiere durante la hospitalización del paciente que no se hallaba presente, o en periodo de incubación en el momento de la admisión del paciente en el centro. ✓
- d. Ninguna es correcta.

La respuesta correcta es: Es aquella que se adquiere durante la hospitalización del paciente que no se hallaba presente, o en periodo de incubación en el momento de la admisión del paciente en el centro.

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

¿Cuál de las siguientes infecciones hospitalarias presenta menor frecuencia?

Seleccione una:

- a. Quirúrgica.
- b. Bacteriemia. ✓
- c. Respiratoria.
- d. Urinaria.

La respuesta correcta es: Bacteriemia.

Pregunta

9

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

¿Qué profilaxis antitetánica se aplicará a un paciente sin inmunización, que presente una herida profunda con tejidos desvitalizados?

Seleccione una:

- a. Una dosis de Td y completar vacunación.
- b. Una dosis de Td si la última se aplicó hace 6 años.
- c. Una dosis de Td más 250-500 UI IGT. ✗
- d. Una dosis de Td más 200-500 UI IGT y completar vacunación.

La respuesta correcta es: Una dosis de Td más 200-500 UI IGT y completar vacunación.

Pregunta

10

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

¿Quiénes son los más sensibles a infectarse tras la exposición al bacilo tuberculoso y también tienen más riesgo de desarrollar la infección?

Seleccione una:

- a. Los niños de corta edad.
- b. Los jóvenes.
- c. Los adultos. ✗
- d. Todos por igual.

La respuesta correcta es: Los niños de corta edad.

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

La prueba de la tuberculina mediante la técnica de Mantoux se debe leer:

Seleccione una:

- a. Entre las 48- 72 horas. ✓
- b. Entre el 4º y 6º días.
- c. Al 7º día.
- d. A las 24 horas.

La respuesta correcta es: Entre las 48- 72 horas.

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

La técnica Sokal se utiliza para:

Seleccione una:

- a. Medir niveles de ansiedad y estrés en población adulta.
- b. Medir el resultado de la prueba de tuberculina. ✓
- c. Medir la concentración de partículas en el aire en suspensión.
- d. Ninguna es correcta.

La respuesta correcta es: Medir el resultado de la prueba de tuberculina.

Pregunta

13

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

Señalar la afirmación incorrecta en relación a la tuberculosis:

Seleccione una:

- a. Es una enfermedad infecciosa producida por *Mycobacterium tuberculosis*, bacteria anaerobia.
- b. El microorganismo se disemina por la inhalación del núcleo de las gotitas que contienen micobacterias y están en suspensión en el aire.
- c. Las condiciones de vida que favorecen el hacinamiento aumentan el riesgo de propagación de la tuberculosis.
- d. La prueba de la tuberculina positiva significa que el individuo ha sido infectado por *M. tuberculosis* y desarrolló esa respuesta, pero no significa que tenga la tuberculosis activa. ✗

La respuesta correcta es: Es una enfermedad infecciosa producida por *Mycobacterium tuberculosis*, bacteria anaerobia.

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

Respecto a la infección por VIH señale la afirmación FALSA:

Seleccione una:

- a. Las mujeres embarazadas que presentan un recuento de linfocitos CD4+ elevado tienen un menor riesgo de transmisión del VIH.
- b. Además de las vías de transmisión conocidas existen casos de transmisión por picadura de insectos que actúan como vectores. ✓
- c. El mecanismo de transmisión de mayor riesgo es el contacto sexual.
- d. Las mujeres embarazadas asintomáticas presentan un menor riesgo de transmisión del VIH.

La respuesta correcta es: Además de las vías de transmisión conocidas existen casos de transmisión por picadura de insectos que actúan como vectores.

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

¿A qué se denomina transmisión vertical del VIH/sida?

Seleccione una:

- a. A la producida por los factores de coagulación utilizados para el tratamiento de distintas formas de hemofilia.
- b. A la transmisión del VIH mediante el uso compartido de material de inyección entre los usuarios de drogas por vía parenteral.
- c. A la transmisión del VIH por mantener relaciones sexuales sin protección con una persona infectada.
- d. A la transmisión del VIH de una madre a su hijo a través de la leche materna. ✓

La respuesta correcta es: A la transmisión del VIH de una madre a su hijo a través de la leche materna.

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

¿Cuál de los siguientes medios de transmisión de la infección por hiv es el más frecuente en todo el mundo?

Seleccione una:

- a. Transmisión perinatal.
- b. Contacto sexual. ✓
- c. Uso compartido de agujas intravenosas.
- d. Traslusiones de productos sanguíneos.

La respuesta correcta es: Contacto sexual.

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

¿Cómo se interpreta un resultado negativo en la prueba del VIH?

Seleccione una:

- a. Están presentes los anticuerpos contra el VIH en sangre (el paciente ha sido infectado por el virus y el cuerpo ha producido anticuerpos).
- b. A pesar de la infección por el VIH, el paciente no necesariamente tiene SIDA.
- c. El VIH está activo en el cuerpo y el paciente es capaz de transmitir el virus a otras personas.
- d. En este momento, no están presentes anticuerpos contra el VIH en sangre, lo cual o significa que el paciente no se ha infectado con VIH o, si está infectado, el organismo aún no ha generado anticuerpos (periodo intervalo, que suele ser de 3 semanas a 6 meses). ✓

La respuesta correcta es: En este momento, no están presentes anticuerpos contra el VIH en sangre, lo cual o significa que el paciente no se ha infectado con VIH o, si está infectado, el organismo aún no ha generado anticuerpos (periodo intervalo, que suele ser de 3 semanas a 6 meses).

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Llamamos fómites a:

Seleccione una:

- a. Los objetos animados capaces de conservar gérmenes y transmitirlos.
- b. En el medio hospitalario no existen.
- c. Los objetos inanimados capaces de conservar gérmenes y transmitirlos. ✓
- d. No existe este concepto.

La respuesta correcta es: Los objetos inanimados capaces de conservar gérmenes y transmitirlos.

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Señale la respuesta INCORRECTA, en relación con las características de las enfermedades transmisibles:

Seleccione una:

- a. La cadena epidemiológica de las enfermedades transmisibles es: agente causal, mecanismo de transmisión, huésped susceptible y medioambiente.
- b. Para el control de una enfermedad transmisible se requiere un amplio conocimiento de la cadena epidemiológica y unas estimaciones fiables de su transmisibilidad.
- c. Generalmente se atribuye a las enfermedades transmisibles una cuarta parte de la mortalidad humana.
- d. Generalmente estas enfermedades no causan muchas muertes en la infancia y la juventud. ✓

La respuesta correcta es: Generalmente estas enfermedades no causan muchas muertes en la infancia y la juventud.

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

El periodo prodrómico en un proceso infeccioso es aquel que:

Seleccione una:

- a. Va desde que se manifiestan los síntomas no específicos hasta que aparecen los síntomas específicos de la infección. ✓
- b. Se hacen más evidentes los síntomas específicos.
- c. Los síntomas se manifiestan en un área concreta.
- d. Va desde el momento en el que los síntomas empiezan a disminuir hasta el estado normal de salud.

La respuesta correcta es: Va desde que se manifiestan los síntomas no específicos hasta que aparecen los síntomas específicos de la infección.

Pregunta

21

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

Dentro de las medidas de prevención y control de la Hepatitis A, cuál es incorrecta:

Seleccione una:

- a. Aislamiento entérico durante las dos primeras semanas.
- b. Tratamiento sintomático.
- c. No se dispone de inmunoprofilaxis pasiva. ✓
- d. Medidas dietéticas y de régimen de vida.

La respuesta correcta es: No se dispone de inmunoprofilaxis pasiva.

Pregunta

22

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

¿Qué respuesta es correcta con relación a una infección por virus de Hepatitis A?

Seleccione una:

- a. La principal vía de transmisión es la Maternidad-fetal.
- b. El hombre y los animales de granja son sus reservorios.
- c. Tiene una probabilidad muy alta de derivar en cirrosis.
- d. Todas las respuestas son falsas. ✓

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son falsas.

Pregunta

23

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

¿Cuál de estos factores NO contribuirá al aumento de la morbilidad y la mortalidad de las enfermedades nosocomiales?

Seleccione una:

- a. Una menor frecuencia de personas con deficiencia inmunitaria. ✓
- b. Un mayor número de personas en condiciones de hacinamiento.
- c. Nuevos organismos patógenos.
- d. Aumento de la resistencia bacteriana a los antibióticos.

La respuesta correcta es: Una menor frecuencia de personas con deficiencia inmunitaria.

Pregunta

24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

El estudio de referencia sobre la infección nosocomial en España es:

Seleccione una:

- a. ENEAS.
- b. CDC.
- c. EPINE. ✓
- d. EPPS.

La respuesta correcta es: EPINE.

Pregunta

25

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Cuál es el mecanismo de transmisión más común de las infecciones en los hospitales españoles?

Seleccione una:

- a. El instrumental médico. ✗
- b. La insuficiente higiene de manos de los profesionales sanitarios.
- c. Los envases de medicamentos que se usan para múltiples pacientes.
- d. Los pacientes portadores de microorganismos multirresistentes.

La respuesta correcta es: La insuficiente higiene de manos de los profesionales sanitarios.

Pregunta

26

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Señale la respuesta incorrecta de las siguientes afirmaciones relacionadas con la meningitis bacteriana:

Seleccione una:

- a. Es muy frecuente la cefalea durante el proceso febril.
- b. La aparición de crisis convulsivas o déficits neurológicos pueden ser el primer dato de infección.
- c. En los pacientes con ataxia, nistagmos y afectación de pares craneales, hay que sospechar infección. ✗
- d. Los pacientes con meningitis bacteriana presentan siempre un líquido cefalorraquídeo normal.

La respuesta correcta es: Los pacientes con meningitis bacteriana presentan siempre un líquido cefalorraquídeo normal.

Pregunta

27

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

Indique cuál de las siguientes enfermedades están causada por una Rickettsia:

Seleccione una:

- a. Meningitis meningocócica. ✘
- b. Tos ferina.
- c. Tifus exantemático epidémico.
- d. Fiebre reumática.

La respuesta correcta es: Tifus exantemático epidémico.

Pregunta

28

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

¿Cuál de los siguientes fármacos antituberculosos NO es considerado como tratamiento de primera línea en la tuberculosis?:

Seleccione una:

- a. Pirazinamida.
- b. Cicloserina. ✔
- c. Isoniazida.
- d. Rifampicina.

La respuesta correcta es: Cicloserina.

Pregunta

29

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

Respecto a la prueba de la tuberculina (PT), señale la repuesta correcta:

Seleccione una:

- a. En la lectura de la PT se debe de medir la induración y el eritema.
- b. La PT se realiza mediante la técnica de Mantoux, que consiste en introducir 0.1 ml de tuberculina subcutánea en la cara anterior del brazo.
- c. La prueba puede presentar falsos negativos debido a la sensibilización del sistema inmune causada por la administración previa de la vacuna BCG.
- d. La vacuna de sarampión, paperas y rubeola, administrada el mismo día o en las 6 semanas anteriores a la PT, pueden ocasionar falsos negativos de esta. ✔

La respuesta correcta es: La vacuna de sarampión, paperas y rubeola, administrada el mismo día o en las 6 semanas anteriores a la PT, pueden ocasionar falsos negativos de esta.

Pregunta

30

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

¿Cuál de las siguientes enfermedades NO se transmite por picadura de garrapatas?

Seleccione una:

- a. Enfermedad de Lyme.
- b. Fiebre recurrente por Borrelia hispánica.
- c. Dengue. ✓
- d. Fiebre maculosa de las montañas rocosas por R. Rickettsii.

La respuesta correcta es: Dengue.