

Pregunta 1

153.- De entre los siguientes síntomas, ¿cuál no se puede dar en la bradicardia sintomática?

Seleccione una:

- a. A) Síncope.
- b. B) Convulsiones.
- c. C) Shock.
- d. D) Edema. Correcta ¡Bien, correcto!

Pregunta 2

703.- El límite inferior normal de frecuencia cardiaca en niños de hasta un año es de:

Seleccione una:

- a. a. 120 latidos/minuto. Incorrecta Mal, debes repasar un poco
- b. b. 110 latidos/minuto.
- c. c. 100 latidos/minuto.
- d. d. 80 latidos/minuto.

Pregunta 3

705.- Son tratamientos que pueden utilizarse en el aleteo auricular:

Seleccione una:

- a. a. Cardioversión.
- b. b. Digitalización.
- c. c. Marcapasos.
- d. d. Todas son ciertas. Correcta ¡Bien, correcto !!

Pregunta 4

706.- En la torsade de Pointes, el QRS:

Seleccione una:

- a. a. Tiene forma de avellana.
- b. b. Parece doblarse o torcerse. Correcta ¡Bien, correcto !!
- c. c. No se ve afectado.
- d. d. No sufre variación de altura.

Pregunta 5

157.- ¿Cuál de los siguientes fármacos no es un antiarrítmico?

Seleccione una:

- a. A) Procainamida.
- b. B) Fenilhidantoína.
- c. C) Furosemida. Correcta ¡Bien, correcto!
- d. D) Propanolol.

Pregunta 6

154.- El tratamiento de elección de una bradicardia sinusal sintomática es:

Seleccione una:

- a. A) Cardioversión.
- b. B) Atropina.
- c. C) Marcapasos. Correcta ¡Bien, correcto!
- d. D) Isoproterenol.

Generalidades ante las principales urgencias y emergencias pediátricas para enfermería - Test 7

Pregunta 7

155.- La disritmia anormal más frecuente en niños es:

Seleccione una:

- a. A) Bradicardia sinusal.
- b. B) Taquicardia paroxística supraventricular. Correcta¡Bien, correcto!**
- c. C) Aleteo auricular.
- d. D) Extrasístole ventricular.

Pregunta 8

156.- ¿Qué fármaco no está indicado en una taquicardia ventricular?

Seleccione una:

- a. A) Tosilato de bretilio.
- b. B) Lidocaína.
- c. C) Atropina. Correcta¡Bien, correcto!**
- d. D) Fenilhidantoína.