

Supuesto clínico

Pregunta 1

Enunciado de la pregunta

Como equipo de pediatría nos avisan de paritorio porque se va a realizar un parto mediante extracción con fórceps. Ante la inminencia del mismo nos personamos en la sala. Cuando llegamos nos informan que se trata de un parto instrumental por ayuda en el expulsivo en el que el líquido amniótico está teñido de meconio y que el parto ha transcurrido con normalidad (gestación de 40 semanas) y que se ha puesto pauta profiláctica de antibiótico ya que la madre tuvo un cultivo de orina en el primer trimestre positivo para *Streptococo agalactiae*. La rotura de membranas fue espontánea, hace más de 24 horas (rotura prolongada de membranas) y en todo el proceso del parto la madre ha experimentado picos de febrícula.

101.- Ante esta situación. ¿Qué datos nos faltan para completar la primera anamnesis correctamente?

Seleccione una:

- a. Datos periparto.
- b. Antecedentes maternos.
- c. Serologías maternas.
- d. B y c son correctas. Correcta Bien, correcto !!

Pregunta 2

102.- Ante los datos que nos aporta el enunciado, ¿cuáles serían factores de riesgo neonatal asociados al parto?

Seleccione una:

- a. Rotura prolongada de membranas.
- b. Parto instrumental (fórceps).
- c. Líquido amniótico teñido de meconio.
- d. Todas son correctas. Correcta Bien, correcto !!

Pregunta 3

103.- Al nacimiento el niño presenta frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, esfuerzo respiratorio ausente, hipotonía, ausencia de reflejos y acrocianosis. Ante esta situación ¿qué puntuación de Apgar le correspondería?

Seleccione una:

- a. 0.
- b. 2. Correcta Bien, correcto !!
- c. 4.
- d. 6.

Pregunta 4

104.- Ante la situación que se nos plantea siguiendo la valoración de Apgar obtenida, ¿qué es lo primero que debemos hacer?

Seleccione una:

- a. Colocar al niño bajo una fuente de calor radiante. Incorrecta Mal, debes repasar un poco
- b. Iniciar masaje cardíaco.
- c. Intentar palpar pulsos periféricos.
- d. B y c son correctas.

GENERALIDADES ANTE LAS PRINCIPALES URGENCIAS Y EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS PARA ENFERMERÍA (UPV1)

Pregunta 5

105.- Para el abordaje de la ventilación del recién nacido, la actitud más correcta sería:

Seleccione una:

- a. Uso de gafas nasales.
- b. Administración de oxígeno a alto flujo mediante mascarilla con reservorio.
- c. Administración de oxígeno con mascarilla con bolsa autohinchable.
- d. Observaremos si el niño inicia respiración espontánea. IncorrectaMal, debes repasar un poco

Pregunta 6

106.- ¿En qué momento se debe realizar de nuevo el test de Apgar?

Seleccione una:

- a. A los 5 minutos. CorrectaBien, correcto !!
- b. A los 8 minutos.
- c. A los 9 minutos.
- d. No se debe volver a realizar el test de Apgar.

Pregunta 7

107.- Tras una nueva valoración del Apgar, el niño sigue sin respirar. Es el momento de:

Seleccione una:

- a. Seguir ventilando con bolsa autohinchable.
- b. Intubar al niño. CorrectaBien, correcto !!
- c. Poner unas gafas de oxígeno.
- d. Ya no se puede hacer nada.

Pregunta 8

108.- Es indicación de intubación:

Seleccione una:

- a. Ventilación con bolsa eficaz. IncorrectaMal, debes repasar un poco
- b. Ventilación con bolsa ineficaz.
- c. Aspiración de líquido amniótico.
- d. B y c son correctas.

Pregunta 9

109.- A pesar de mantener una adecuada ventilación con presión positiva y tras haber realizado masaje cardíaco más de 30 segundos, la frecuencia cardíaca del recién nacido es de 40 latidos minuto. ¿Qué fármaco se recomienda?

Seleccione una:

- a. Adrenalina. CorrectaBien, correcto !!
- b. Adenosina.
- c. Bicarbonato.
- d. Naloxona.

Pregunta 10

110.- Una vez estabilizado el recién nacido pasa a la UCIN. Allí avisamos porque el paciente entra en shock. ¿Cuál puede ser la causa?

Seleccione una:

- a. Ruptura prolongada de membranas.
- b. Hemorragia intrauterina.
- c. Sufrimiento fetal.
- d. Todas son correctas. CorrectaBien, correcto !!

GENERALIDADES ANTE LAS PRINCIPALES URGENCIAS Y EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS PARA ENFERMERÍA (UPV1)

Pregunta 11

111.- ¿Qué tipo de signos cabe esperar que encontremos en el recién nacido?

Seleccione una:

- a. Pérdida de pulsos periféricos. IncorrectaMal, debes repasar un poco
- b. Signos de sepsis.
- c. Llanto descontrolado.
- d. Todas son incorrectas.

Pregunta 12

112.- Ante un paciente como el nuestro qué tipo de complicaciones cabría esperar:

Seleccione una:

- a. Acidosis metabólica. IncorrectaMal, debes repasar un poco
- b. Insuficiencia renal aguda.
- c. Disfunción miocárdica.
- d. Todas son correctas.

Pregunta 13

113.- Al paciente se le realiza una gasometría arterial. ¿Qué esperaríamos encontrar?

Seleccione una:

- a. Acidosis metabólica. CorrectaBien, correcto !!
- b. Alcalosis metabólica.
- c. Alcalosis respiratoria.
- d. Todas son incorrectas.

Pregunta 14

114.- Como principios generales, ante un shock debemos:

Seleccione una:

- a. Incrementar el gasto cardíaco.
- b. Garantizar el aporte de oxígeno.
- c. A y b son correctas. CorrectaBien, correcto !!
- d. A y b son incorrectas.

Pregunta 15

115.- El tratamiento hemodinámico del shock debe comprender:

Seleccione una:

- a. Incremento de la precarga (siempre).
- b. Aumento de la contractilidad. CorrectaBien, correcto !!
- c. Reducción de la poscarga (siempre).
- d. Todas son incorrectas.