



<b>Comenzado el</b>	martes, 19 de septiembre de 2023, 13:04
<b>Estado</b>	Finalizado
<b>Finalizado en</b>	martes, 19 de septiembre de 2023, 13:05
<b>Tiempo empleado</b>	27 segundos
<b>Puntos</b>	6,0/6,0
<b>Calificación</b>	<b>10,0</b> de 10,0 (100%)

**Pregunta 1**

Correcta

Se puntúa 1,0 sobre 1,0

La administración de la vacuna Fluenz Tetra está contraindicada en:

- a. Alérgicos a la gentamicina.
- b. Niños y adolescentes que hayan presentado una reacción anafiláctica previa a una dosis previa o a algún componente de la vacuna.
- c. Niños y adolescentes en tratamiento con ácido acetilsalicílico.
- d. Todas son correctas. ✓

**Pregunta 2**

Correcta

Se puntúa 1,0 sobre 1,0

La eficacia de la vacuna Fluenz Tetra en estudios pediátricos controlados por placebo:

- a. Está entre un 85 y un 88 % en Europa para las temporadas 2000-2002 para las cepas coincidentes.
- b. En torno al 63 % en Europa para la temporada 2002-2003 para las todas las cepas independientemente de la coincidencia.
- c. Está entre un 72 y un 84 % en Asia y Oceanía para las temporadas 2000-2002 para las cepas coincidentes.
- d. Todas son verdaderas. ✓

**Pregunta 3**

Correcta

Se puntúa 1,0 sobre 1,0

Las reacciones adversas más frecuentes tras la administración de la vacuna Fluenz Tetra son:

- a. Disminución del apetito. ✓
- b. Hemorragia nasal.
- c. Erupción cutánea.
- d. Todas son correctas.

**Pregunta 4**

Correcta

Se puntúa 1,0 sobre 1,0

Señale la opción correcta. La administración de la vacuna Fluenz Tetra es:

- a. Intramuscular.
- b. Subcutánea.
- c. Intranasal. ✓
- d. Intradérmica.

**Pregunta 5**

Correcta

Se puntúa 1,0 sobre 1,0

Señale la opción correcta. La vacuna Fluenz Tetra es una vacuna:

- a. Tetravalente inactivada.
- b. Trivalente atenuada.
- c. Trivalente atenuada.
- d. Tetravalente atenuada. ✓

**Pregunta 6**

Correcta

Se puntúa 1,0 sobre 1,0

Señale la respuesta correcta. La administración de la vacuna Fluenz Tetra:

- a. Se puede realizar también de forma intramuscular, aunque es preferible intranasal.
- b. Se debe administrar en una sola fosa nasal.
- c. Se debe administrar 0,1 ml en cada fosa nasal. ✓
- d. Todas las anteriores son correctas.

Actividad previa

UNIDAD FORMATIVA 5: VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL INTRANASAL

Ir a...

Siguiente actividad

Material formativo adicional del módulo 5