

27. En una otitis media, ¿cuál es la complicación más frecuente?

Seleccione una:

- a. Dolor.
- b. Laberintitis.
- c. Mastoiditis.
- d. Supuración.

La respuesta correcta es: Mastoiditis.

28. La presión intraocular se define como aquella presión que el ojo puede soportar sin lesionar sus estructuras y sin alterar su función. ¿Cuáles son los valores normales?

Seleccione una:

- a. Mayor de 50 mm Hg.
- b. Entre 0 y 5 mm Hg.
- c. Entre 10 y 21 mm Hg.
- d. Entre 30 y 50 mm Hg.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entre 10 y 21 mm Hg.

28. Mariana refiere pérdida de visión con dolor, ve una mancha de color rojizo con el ojo izquierdo, además en la valoración se observa una midriasis de esa pupila ¿Qué tipo de medidas adoptaremos en el tratamiento?

Seleccione una:

- a. Masaje ocular.
- b. Hacer respirar al paciente en una bolsa de plástico o papel.
- c. Administrar vasodilatadores.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

30. Señale los signos y síntomas del síndrome de Ménière:

Seleccione una:

a.

Diarrea vespertina y heces acólicas.

b.

Dolor y fiebre mayor de 38º C.

c.

Sensación de plenitud en el oído afectado y tinnitus.

d.

Otorrea.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sensación de plenitud en el oído afectado y tinnitus.