

Comenzado el	lunes, 19 de febrero de 2024, 09:51
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 19 de febrero de 2024, 10:07
Tiempo empleado	16 minutos 11 segundos
Puntos	29,00/30,00
Calificación	9,67 de 10,00 (96,67%)
Comentario -	Apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paciente que acude a la consulta de Atención Primaria con una actitud distante, desconectada y huidiza, evita las relaciones sociales, con carencias afectivas hacia su familia. ¿A qué tipo de trastorno de la personalidad responde este perfil?

Seleccione una:

- a. Esquizoide. ✓
- b. Neurótica.
- c. Antisocial.
- d. Narcisista.

La respuesta correcta es: Esquizoide.

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los trastornos de la sexualidad se pueden dividir en:

Seleccione una:

- a. Disfunciones sexuales.
- b. Parafilias.
- c. Trastornos de la identidad sexual.
- d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué trastorno se caracteriza por uno o más episodios maníacos, generalmente alternando con episodios de depresión mayor?

Seleccione una:

- a. Trastorno bipolar tipo I. ✓
- b. Depresión endógena.
- c. Trastorno esquizofrénico.
- d. Ciclotimia

La respuesta correcta es: Trastorno bipolar tipo I.

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La definición: "Conjunto de signos y síntomas que aparecen cuando de forma brusca se interrumpe el consumo de una sustancia a la cual tiene dependencia o la que ingiere es insuficiente" se refiere a:

Seleccione una:

- a. Abuso de sustancias.
- b. Adicción.
- c. Síndrome de abstinencia. ✓
- d. Desintoxicación física.

La respuesta correcta es: Síndrome de abstinencia.

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En relación a la posibilidad de que un paciente presente un intento de suicidio, ¿Cuál de estas afirmaciones es VERDADERA?

Seleccione una:

- a. El riesgo de suicidio no se asocia a la depresión.
- b. Las personas casadas tienen más riesgo de suicidio que las divorciadas.
- c. El porcentaje de suicidio aumenta en personas con antecedentes de intento de suicidio previo. ✓
- d. Las personas menores de 19 años o mayores de 45 presentan menos tasa de suicidio.

La respuesta correcta es: El porcentaje de suicidio aumenta en personas con antecedentes de intento de suicidio previo.

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la actualidad la terapia electroconvulsiva (TEC)

Seleccione una:

- a. No se utiliza.
- b. Se utiliza para cualquier patología psiquiátrica.
- c. Está indicada en la esquizofrenia.
- d. Está indicada en estados de depresión grave o manía resistentes a otros tratamientos. ✓

La respuesta correcta es: Está indicada en estados de depresión grave o manía resistentes a otros tratamientos.

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según la OMS el suicidio:

Seleccione una:

- a. No es una prioridad de salud pública.
- b. Es la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años en todo el mundo. ✓
- c. Se produce solo en países de altos ingresos.
- d. No es prevenible.

La respuesta correcta es: Es la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años en todo el mundo.

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los síntomas graves de ansiedad después de experimentar un evento traumático se denomina:

Seleccione una:

- a. Trastorno de estrés postraumático. ✓
- b. Trastorno mental.
- c. Trastorno depresivo.
- d. Trastorno obsesivo-compulsivo.

La respuesta correcta es: Trastorno de estrés postraumático.

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la anorexia nerviosa restrictiva el paciente:

Seleccione una:

- a. Provoca habitualmente el vómito.
- b. Realiza purgas con frecuencia.
- c. No recurre regularmente a atracones. ✓
- d. Hace un uso excesivo de laxantes.

La respuesta correcta es: No recurre regularmente a atracones.

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El manual de Diagnósticos y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) incluye:

Seleccione una:

- a. Dependencia al móvil.
- b. Dependencia a internet.
- c. Juego patológico. ✓
- d. Dependencia a las relaciones tóxicas.

La respuesta correcta es: Juego patológico.

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Con respecto a la Salud Mental, los trastornos que aparecen con mayor frecuencia a lo largo de la vida son:

Seleccione una:

- a. Trastornos depresivos. ✓
- b. Trastornos de ansiedad.
- c. Trastornos derivados del consumo del alcohol.
- d. Trastornos derivados del consumo de tóxicos.

La respuesta correcta es: Trastornos depresivos.

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué situación se sospecharán sobredosis por opiáceos?

Seleccione una:

- a. Cuando aparecen trastornos de conducta y crisis convulsiva.
- b. Cuando aparece miosis, depresión respiratoria y coma. ✓
- c. Cuando aparecen euforia, HTA y taquicardia.
- d. Cuando aparecen paranoia y violencia.

La respuesta correcta es: Cuando aparece miosis, depresión respiratoria y coma.

Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La forma de comienzo de la esquizofrenia puede ser:

Seleccione una:

- a. De forma aguda o de forma insidiosa. ✓
- b. De forma residual.
- c. De forma suspicaz.
- d. Las respuestas b y c son correctas.

La respuesta correcta es: De forma aguda o de forma insidiosa.

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En los pacientes con esquizofrenia es un síntoma positivo de enfermedad:

Seleccione una:

- a. El escaso autocuidado.
- b. Las ideas delirantes. ✓
- c. El embotamiento afectivo.
- d. La pobreza de lenguaje y pensamiento.

La respuesta correcta es: Las ideas delirantes.

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de estas manifestaciones no se corresponde con la anorexia nerviosa?

Seleccione una:

- a. Comienzo siempre después de la pubertad. ✓
- b. Pérdida significativa de peso.
- c. Distorsión de la imagen corporal.
- d. Trastornos endocrino generalizado que afecta al sistema hipotalámico-hipofisario-gonadal.

La respuesta correcta es: Comienzo siempre después de la pubertad.

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Son drogas activadoras del SNC?

Seleccione una:

- a. Alcohol, anfetaminas y nicotina.
- b. Nicotina, cocaína y los hipnóticos.
- c. Cocaína y anfetaminas. ✓
- d. Heroína y cocaína (cuando se administran juntas).

La respuesta correcta es: Cocaína y anfetaminas.

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué identifica la escala de Plutchick?

Seleccione una:

- a. La imagen corporal.
- b. Pacientes con tentativa de suicidio. ✓
- c. Actitudes ante la alimentación.
- d. Mide la modificación de las conductas.

La respuesta correcta es: Pacientes con tentativa de suicidio.

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la anorexia nerviosa, ¿cuál de los siguientes es un factor de buen pronóstico?

Seleccione una:

- a. Rasgos de personalidad histriónica. ✓
- b. Atracones o abusos de laxantes.
- c. Presencia de vómitos autoinducidos.
- d. Rasgos de personalidad obsesivo-compulsiva.

La respuesta correcta es: Rasgos de personalidad histriónica.

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La enfermera, en el momento de hacer la valoración de enfermería a una persona, debe tener en cuenta que los síntomas negativos de la esquizofrenia son:

Seleccione una:

- a. Lenguaje y pensamiento desorganizado, alucinaciones y comportamiento desorganizado.
- b. Retraimiento social, ideas delirantes, alucinaciones, falta de energía y motivación.
- c. Trastornos emocionales, alogia, falta de energía y motivación, abulia y retraimiento social. ✓
- d. Abulia, alogia, ideas delirantes, lenguaje y pensamiento desorganizado.

La respuesta correcta es: Trastornos emocionales, alogia, falta de energía y motivación, abulia y retraimiento social.

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Respecto a la evaluación y entrevista de enfermería a un paciente con amenaza de suicidio, señala la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- a. Siempre debe tomarse en serio toda amenaza de suicidio aunque parezca manipuladora.
- b. Preguntar por la intencionalidad suicida es potenciar la misma. ✓
- c. La intervención en crisis no tiene como finalidad convencer al paciente.
- d. Durante la entrevista debemos escuchar, para adoptar la actitud más conveniente.

La respuesta correcta es: Preguntar por la intencionalidad suicida es potenciar la misma.

Pregunta

21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Respecto a la esquizofrenia tipo paranoide, señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- a. Es el tipo más frecuente de esquizofrenia.
- b. No hay lenguaje desorganizado.
- c. Es frecuente afectividad aplanada o inapropiada. ✓
- d. No hay comportamiento catatónico o desorganizado.

La respuesta correcta es: Es frecuente afectividad aplanada o inapropiada.

Pregunta

22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale la afirmación incorrecta respecto a las características de la personalidad histriónica:

Seleccione una:

- a. Pertenecer al grupo B de los trastornos de la personalidad.
- b. Carece de empatía por los demás. ✓
- c. Se siente incómodo cuando no es el centro de atención.
- d. Actúa con un comportamiento sexualmente seductor.

La respuesta correcta es: Carece de empatía por los demás.

Pregunta

23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Criterio para el diagnóstico de la bulimia nerviosa:

Seleccione una:

- a. Episodios frecuentes de ingesta compulsiva 2 o más por semana y durante más de tres meses. ✓
- b. Rechazo a mantener el peso dentro de parámetros por encima del 85% del peso teórico.
- c. Alteración de la percepción del tamaño del cuerpo.
- d. Miedo a la ganancia de peso.

La respuesta correcta es: Episodios frecuentes de ingesta compulsiva 2 o más por semana y durante más de tres meses.

Pregunta

24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Es criterio de la anorexia nerviosa:

Seleccione una:

- a. Peso corporal significativamente bajo. ✓
- b. Dismenorrea.
- c. Amenorrea.
- d. Miedo intenso a perder peso.

La respuesta correcta es: Peso corporal significativamente bajo.

Pregunta

25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En relación a la conducta suicida, señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

Seleccione una:

- a. Los factores de riesgo pueden clasificarse en modificables e inmodificables.
- b. Los ancianos presentan tasas de suicidio inferiores a los adolescentes. ✓
- c. Un bajo nivel educativo se asocia también con un aumento del riesgo de suicidio.
- d. La conducta suicida es más frecuente entre individuos solteros y divorciados.

La respuesta correcta es: Los ancianos presentan tasas de suicidio inferiores a los adolescentes.

Pregunta

26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes manifestaciones no es propia del trastorno disocial?

Seleccione una:

- a. Destrucción de la sociedad.
- b. Violación de las normas.
- c. Delirios.
- d. Agresión a personas. ✓

La respuesta correcta es: Agresión a personas.

Pregunta

27

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

De los siguientes trastornos, ¿cuál no es considerado un trastorno de ansiedad?

Seleccione una:

- a. Trastorno obsesivo-compulsivo.
- b. Trastorno de personalidad límite.
- c. Fobia social.
- d. Trastorno de estrés postraumático ✗

La respuesta correcta es: Trastorno de personalidad límite.

Pregunta

28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre los efectos más frecuentes del cannabis señala la opción incorrecta:

Seleccione una:

- a. Locuacidad.
- b. Euforia. ✓
- c. Desinhibición.
- d. Somnolencia.

La respuesta correcta es: Euforia.

Pregunta

29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5) incluye:

Seleccione una:

- a. Dependencia al móvil.
- b. Juego patológico. ✓
- c. Dependencia a internet.
- d. Ciberadicción.

La respuesta correcta es: Juego patológico.

Pregunta

30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El test de Manchester Self-Harm para la conducta suicida, consta de las siguientes preguntas, señala la opción incorrecta:

Seleccione una:

- a. ¿Tiene antecedentes de conducta suicida?
- b. ¿Vive solo? ✓
- c. ¿Está actualmente en tratamiento psiquiátrico?
- d. ¿El episodio actual es por sobredosis de benzodiazepinas?

La respuesta correcta es: ¿Vive solo?

Actividad previa

◀ Valoración y cuidados enfermeros a personas con problemas de salud mental y conductas adictivas Material complementario

Ir a...

Siguiente actividad

Encuesta de satisfacción del alumnado ▶

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <https://www.fuden.es>

