

[Página Principal](#) » [Mis cursos](#) » [DEP-2](#) »

[Módulo 3: Ejercicio físico y afecciones oftalmológicas, ORL y dermatológicas](#) »

[Cuestionario de autoevaluación asignatura 8](#)

Comenzado el	lunes, 11 de marzo de 2024, 20:43
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 11 de marzo de 2024, 20:50
Tiempo empleado	7 minutos 10 segundos
Puntos	20,00/20,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Referente a las quemaduras y congelaciones del PA (señale la incorrecta):

Seleccione una:

- a. Con bajas temperaturas se realizará prevención mediante abrigo.
- b. Con altas temperaturas la prevención se realizará con protector solar.
- c. En caso de flictenas se romperán para drenarlas adecuadamente. ✓
- d. Las flictenas se protegerán mediante apósitos.

La respuesta correcta es: En caso de flictenas se romperán para drenarlas adecuadamente.

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En caso de luxación completa de un diente:

Seleccione una:

- a. Se debe limpiar el orificio que ha dejado el diente.
- b. Se debe guardar el diente sin permitir que seque la membrana periodontal.
- c. El lesionado debe acudir inmediatamente al odontólogo.
- d. Todas las anteriores son ciertas. ✓

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son ciertas.

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La fractura de Le Fort tipo II también puede llamarse:

Seleccione una:

- a. Fractura piramidal. ✓
- b. Disyunción craneofacial.
- c. Fractura del paladar flotante.
- d. Fractura zigomático-temporal.

La respuesta correcta es: Fractura piramidal.

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Ante una posible fractura del malar debemos (señale la incorrecta):

Seleccione una:

- a. Realizar una exploración ocular por parte del oftalmólogo.
- b. Palpar el reborde orbitario, el cuerpo malar y el arco zigomático.
- c. Realizar radiografía y examen tomográfico.
- d. Palpar el paladar duro. ✓

La respuesta correcta es: Palpar el paladar duro.

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre la sintomatología de la fractura malar encontramos:

Seleccione una:

- a. Enoftalmia.
- b. Trismo.
- c. Ambas son correctas. ✓
- d. Ninguna es correcta.

La respuesta correcta es: Ambas son correctas.

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En cuanto a la reducción de la fractura nasal (señale la incorrecta):

Seleccione una:

- a. Si no existe desplazamiento no es necesaria.
- b. Puede ser abierta o cerrada.
- c. Debe de lo más pronto posible aunque esté edematizada la zona. ✓
- d. La reducción abierta se realizará con anestesia general.

La respuesta correcta es: Debe de lo más pronto posible aunque esté edematizada la zona.

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las heridas de la lengua (señale la correcta):

Seleccione una:

- a. Se deben considerar limpias.
- b. Suelen precisar sutura.
- c. Suelen complicarse.
- d. Sangran abundantemente. ✓

La respuesta correcta es: Sangran abundantemente.

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En una epistaxis el taponamiento anterior se retirara:

Seleccione una:

- a. Pasada una hora.
- b. Pasadas 2-3 horas.
- c. Pasadas 48 horas. ✓
- d. A los 7-10 días.

La respuesta correcta es: Pasadas 48 horas.

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Ante un golpe en el mentón sospecharemos de:

Seleccione una:

- a. Fractura mandibular. ✓
- b. Fractura malar.
- c. Fractura de maxilar superior.
- d. Fractura craneal.

La respuesta correcta es: Fractura mandibular.

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Respecto a las lesiones de tejidos blandos en el área maxilofacial (señale la incorrecta):

Seleccione una:

- a. La herida por mordedura humana se considera infectada.
- b. En el tratamiento de las heridas se extirparán generosamente sus bordes.
- c. La herida por mordedura humana se debe suturar inmediatamente. ✓
- d. En los hematomas importantes puede ser necesario el drenaje mediante incisión quirúrgica.

La respuesta correcta es: La herida por mordedura humana se debe suturar inmediatamente.

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El hueso facial más frecuentemente fracturado en la traumatología deportiva es:

Seleccione una:

- a. El conjunto de los huesos nasales. ✓
- b. La mandíbula.
- c. El maxilar superior.
- d. El malar.

La respuesta correcta es: El conjunto de los huesos nasales.

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los dientes que más frecuentemente se lesionan en los traumatismos deportivos son:

Seleccione una:

- a. Los molares.
- b. Incisivos superiores. ✓
- c. Incisivos inferiores.
- d. Ninguno de los anteriores.

La respuesta correcta es: Incisivos superiores.

Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las fracturas nasales (señale la incorrecta):

Seleccione una:

- a. Son más frecuentes por impactos frontales. ✓
- b. Son más frecuentes por impactos laterales.
- c. Tienen buen pronóstico cuando el tratamiento es precoz y de manera adecuada.
- d. Son bastante frecuentes en los deportes de contacto.

La respuesta correcta es: Son más frecuentes por impactos frontales.

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La oreja en coliflor (señale la incorrecta):

Seleccione una:

- a. Es una deformidad auricular producida por necrosis cartilaginosa.
- b. Se denomina también oreja del luchador.
- c. Es una complicación de un otohematoma.
- d. Es una complicación de una perforación timpánica mal tratada. ✓

La respuesta correcta es: Es una complicación de una perforación timpánica mal tratada.

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En una fractura del maxilar si se mueve únicamente el paladar duro y los dientes superiores estamos ante una fractura:

Seleccione una:

- a. Le Fort tipo I. ✓
- b. Le Fort tipo II.
- c. Le Fort tipo III.
- d. Luxación leve del maxilar.

La respuesta correcta es: Le Fort tipo I.

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de la sintomatología de la fractura mandibular encontramos:

Seleccione una:

- a. Pérdida del engranaje dental. ✓
- b. Equimosis en la bóveda palatina.
- c. Diplopia.
- d. Epistaxis.

La respuesta correcta es: Pérdida del engranaje dental.

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El signo de Battle consiste en:

Seleccione una:

- a. Equimosis en la región retroauricular. ✓
- b. Hundimiento del paladar duro.
- c. Dolor al presionar el pabellón auricular.
- d. Epistaxis tras traumatismo.

La respuesta correcta es: Equimosis en la región retroauricular.

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La probabilidad de que un diente sea reimplantado con éxito depende:

Seleccione una:

- a. Del tiempo transcurrido desde la avulsión del diente a la reimplantación.
- b. Del secado de la membrana periodontal.
- c. Ninguna es correcta.
- d. Ambas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Ambas son correctas.

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para prevenir la epistaxis podemos (señale la correcta):

Seleccione una:

- a. Utilizar un humidificador en ambientes secos.
- b. Poner un taponamiento anterior preventivo.
- c. Introducir un poco de lubricante por cada ventana nasal.
- d. A y c son correctas. ✓

La respuesta correcta es: A y c son correctas.

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cual de las siguientes lesiones se puede prevenir mediante el uso de protectores bucales:

Seleccione una:

- a. Hemorragia cerebral.
- b. Luxación de un diente.
- c. Fractura de mandíbula.
- d. Todas las anteriores son ciertas. ✓

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son ciertas.

Actividad previa
◀ Objetivos específicos

Ir a...

Siguiente actividad

Objetivos específicos ►

Colegio Oficial de Enfermería de Madrid

 <https://www.codem.es>