

[Página Principal](#) » [Mis cursos](#) » [DEP-2](#) »

[Módulo 3: Ejercicio físico y afecciones oftalmológicas, ORL y dermatológicas](#) »

[Cuestionario de autoevaluación asignatura 9](#)

Comenzado el	lunes, 11 de marzo de 2024, 20:52
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 11 de marzo de 2024, 20:58
Tiempo empleado	6 minutos 14 segundos
Puntos	20,00/20,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la hemorragia subconjuntival:

Seleccione una:

- a. El tratamiento es conservador. ✓
- b. Siempre hay que realizar un examen completo del ojo.
- c. Sólo se produce por traumatismos cerrados.
- d. El síntoma principal y característico es el dolor.

La respuesta correcta es: El tratamiento es conservador.

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una de estas afirmaciones no es correcta sobre las abrasiones corneales:

Seleccione una:

- a. Se puede producir por un traumatismo directo, sustancias químicas y la radiación UV.
- b. De la clínica, sorprende que el paciente no refiere dolor. ✓
- c. Conviene realizar un test de fluoresceína al paciente para descartar ulceraciones corneales.
- d. Suelen resolverse en un plazo de 24-48 horas.

La respuesta correcta es: De la clínica, sorprende que el paciente no refiere dolor.

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un paciente acude a urgencias tras sufrir un traumatismo ocular. A la exploración presenta un hematoma subconjuntival y un nivel sanguíneo en la cámara anterior. Debe sospecharse:

Seleccione una:

- a. Luxación del cristalino.
- b. Hemorragia subconjuntival.
- c. Hipema. ✓
- d. Hemorragia retiniana.

La respuesta correcta es: Hipema.

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Ante una erosión corneal, cual de las siguientes respuestas no es correcta:

Seleccione una:

- a. Durante el proceso de curación, están indicados los anestésicos locales. ✓
- b. Si existe una lesión corneal menor, se recomienda el uso de una pomada epitelizante.
- c. Se debe tapan el ojo con parche de gasa durante las primeras 24-48 horas.
- d. Para objetivar la dimensión de la lesión se utiliza una tira de fluoresceína.

La respuesta correcta es: Durante el proceso de curación, están indicados los anestésicos locales.

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Tras un traumatismo cerrado en el ojo, el paciente nos refiere que nota como una cortina que le desciende sobre su campo de visión. ¿Qué patología habría que descartar en primer lugar?:

Seleccione una:

- a. Luxación del cristalino.
- b. Desprendimiento de retina. ✓
- c. Lesión macular.
- d. Fractura de la pared interna de la orbita.

La respuesta correcta es: Desprendimiento de retina.

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Ante un cuerpo extraño en el ojo, una de las siguientes respuestas es falsa:

Seleccione una:

- a. Hay que realizar una inspección completa del ojo, incluyendo la eversión del párpado superior.
- b. El paciente presentará enrojecimiento del ojo y lagrimeo.
- c. Se debe irrigar el ojo con una solución salina.
- d. El paciente puede frotarse el ojo y, de esa manera, nos ayudará a que el cuerpo extraño salga. ✓

La respuesta correcta es: El paciente puede frotarse el ojo y, de esa manera, nos ayudará a que el cuerpo extraño salga.

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La iridodonesis es un signo característico de:

Seleccione una:

- a. Luxación del cristalino. ✓
- b. Hemorragias retinianas.
- c. Hipema.
- d. Hemorragia orbitaria.

La respuesta correcta es: Luxación del cristalino.

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Ante un paciente que ha sufrido una lesión palpebral, nunca se debe realizar:

Seleccione una:

- a. Presión directa sobre la herida para controlar la hemorragia.
- b. Exploración del conducto lacrimal, si el desgarro se ha producido medial.
- c. Inspección de la herida, estirando del borde inferior de ésta para valorar sus dimensiones. ✓
- d. Exploración del globo ocular, para descartar la presencia de un cuerpo extraño.

La respuesta correcta es: Inspección de la herida, estirando del borde inferior de ésta para valorar sus dimensiones.

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cual de estas afirmaciones es falsa sobre el desprendimiento de retina.

Seleccione una:

- a. Se produce por un traumatismo cerrado.
- b. Es más frecuente en el cuadrante parietal. ✓
- c. Es una urgencia oftalmológica.
- d. El paciente dice que ve moscas volantes y luces centelleantes.

La respuesta correcta es: Es más frecuente en el cuadrante parietal.

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Ante un traumatismo físico en el ojo:

Seleccione una:

- a. Hay que explorar el ojo siempre, aunque el paciente muestre resistencia.
- b. Se deben aplicar compresas frías haciendo presión para que disminuya la hinchazón.
- c. Como analgésico de primera elección daremos Ibuprofeno.
- d. Para dormir es mejor elevar la cabeza con una o dos almohadas. ✓

La respuesta correcta es: Para dormir es mejor elevar la cabeza con una o dos almohadas.

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una vez diagnosticado un desprendimiento de retina tras un traumatismo ocular, no es cierto:

Seleccione una:

- a. El tratamiento quirúrgico es inmediato. ✓
- b. El paciente tiene que hacer reposo absoluto antes y después de la cirugía.
- c. Debe mantener los ojos cerrados para disminuir la actividad ocular.
- d. En los días posteriores a la cirugía cualquier movimiento brusco de la cabeza puede ser fatal.

La respuesta correcta es: El tratamiento quirúrgico es inmediato.

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para extraer un cuerpo extraño incrustado en la córnea, el oftalmólogo seguirá los siguientes pasos, indique la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- a. Instilar una gota de un anestésico local.
- b. Para la extracción el cuerpo extraño utilizará una torunda de algodón. ✓
- c. El tratamiento, después de la extracción del cuerpo extraño, incluye un antibiótico tópico y, si es necesario, un analgésico.
- d. Deberá llevar un vendaje oclusivo en el ojo, un mínimo de 24-48 horas.

La respuesta correcta es: Para la extracción el cuerpo extraño utilizará una torunda de algodón.

Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una persona acude a nosotros porque dice que se le ha metido algo en ojo. Seguiremos los siguientes pasos excepto:

Seleccione una:

- a. Decirle a la persona que no se frote el ojo.
- b. Examinar el ojo afectado para encontrar el cuerpo extraño.
- c. Si el objeto está en el párpado, se debe intentar lavarlo con suavidad usando agua o suero fisiológico.
- d. Si el objeto está incrustado en el párpado inferior, intentaremos extraerlo con una aguja estéril 25G. ✓

La respuesta correcta es: Si el objeto está incrustado en el párpado inferior, intentaremos extraerlo con una aguja estéril 25G.

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Tras un combate de boxeo, uno de los competidores acude a que le examinemos el ojo porque ha recibido un fuerte impacto. Entre otros muchos signos encontramos que al palparle la región infraorbitaria, crepita. Pensaremos que estamos ante:

Seleccione una:

- a. Hematoma orbitario, sin mayor trascendencia.
- b. Una posible fractura de la base de la orbita, por lo que derivaré a un hospital para estudio Rx exhaustivo. ✓
- c. Hemorragia subconjuntival.
- d. Hipema.

La respuesta correcta es: Una posible fractura de la base de la orbita, por lo que derivaré a un hospital para estudio Rx exhaustivo.

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un desprendimiento de retina producido por un traumatismo:

Seleccione una:

- a. Siempre da la cara durante las primeras 6 horas después del traumatismo.
- b. El paciente tendrá una pérdida de visión, acompañado de la sensación de tener un telón delante del ojo. ✓
- c. Para facilitar la exploración se instalan gotas que tengan efectos mióticos.
- d. El paciente puede realizar reposo relativo.

La respuesta correcta es: El paciente tendrá una pérdida de visión, acompañado de la sensación de tener un telón delante del ojo.

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Qué no haríamos ante una lesión penetrante en el ojo:

Seleccione una:

- a. Lo primero, y más importante, es retirar el objeto que se ha clavado en el ojo y realizarle un vendaje compresivo. ✓
- b. Es una urgencia oftalmológica, por lo que derivaremos a un centro hospitalario al paciente.
- c. El paciente será trasladado en decúbito supino.
- d. Es fundamental vendar el ojo no dañado, para prevenir daños por el movimiento conjugado de los ojos.

La respuesta correcta es: Lo primero, y más importante, es retirar el objeto que se ha clavado en el ojo y realizarle un vendaje compresivo.

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las fracturas por estallido de la órbita:

Seleccione una:

- a. Son más frecuentes en el techo de la órbita.
- b. Le elevación del ojo se ve afectada por el atrapamiento del músculo recto superior.
- c. Se produce enoftalmia, por la herniación del contenido orbitario. ✓
- d. El tratamiento es siempre quirúrgico.

La respuesta correcta es: Se produce enoftalmia, por la herniación del contenido orbitario.

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre la anatomía del globo ocular, no es cierto:

Seleccione una:

- a. La coroides es una membrana situada entre la esclerótica y la retina.
- b. El cristalino es transparente y avascular.
- c. En el disco óptico de la retina, es donde encontramos el mayor número de células fotorreceptoras. ✓
- d. La córnea es la principal responsable de la refracción de la luz que entra en el ojo.

La respuesta correcta es: En el disco óptico de la retina, es donde encontramos el mayor número de células fotorreceptoras.

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La quemadura fotoactínica de los ojos:

Seleccione una:

- a. Se produce fundamentalmente en deportes de invierno y en algunos deportes acuáticos. ✓
- b. En el tratamiento, es necesario el uso de anestésicos locales.
- c. Lo normal es que no evolucione favorablemente hasta después de una semana de evolución.
- d. Un signo característico de esta patología es la diplopía.

La respuesta correcta es: Se produce fundamentalmente en deportes de invierno y en algunos deportes acuáticos.

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la hemorragia orbitaria, que no es cierto:

Seleccione una:

- a. Se produce proptosis del ojo afecto.
- b. Hay que aplicar compresas frías durante 15-20 minutos durante las primeras 24-48 horas.
- c. El tratamiento es conservador.
- d. Se debe trasladar al paciente a un centro médico con la cabeza entre las piernas. ✓

La respuesta correcta es: Se debe trasladar al paciente a un centro médico con la cabeza entre las piernas.

Actividad previa


◀ Objetivos específicos

Ir a...

Siguiente actividad

Objetivos específicos ▶

Colegio Oficial de Enfermería de Madrid

 <https://www.codem.es>