

[Caso práctico: Atención enfermera al final de la vida](#)

<b>Comenzado el</b>	lunes, 25 de marzo de 2024, 15:10
<b>Estado</b>	Finalizado
<b>Finalizado en</b>	lunes, 25 de marzo de 2024, 15:12
<b>Tiempo empleado</b>	1 minutos 48 segundos
<b>Puntos</b>	5,00/5,00
<b>Calificación</b>	10,00 de 10,00 (100%)
<b>Comentario -</b>	Apto

Información

Luisa, mujer de 69 años, diagnosticada de Cáncer de mama, en fase terminal en la actualidad (con presencia de metástasis hepáticas, pulmonares y cerebrales, siendo descartado más tratamiento quirúrgico y médico de tipo curativo). Finalizada radioterapia holocraneal para tratamiento de las metástasis cerebrales de manera paliativa.

Desde el punto de vista funcional precisa ayuda personal y de dispositivos para la movilización, para actividades básicas como el aseo y vestido. Con empeoramiento de su situación limitada cama -sillón.

Ingresa en planta de hospitalización por mal control del dolor por úlcera tumoral en mama derecha con mal olor, dolor y sangrado.

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Ante la presencia de dolor, que escala de valoración utilizarías. Señala la correcta.

Seleccione una:

- a. Escala de Andersen.
- b. Escala Analógica Visual.
- c. A y b son correctas.
- d. Todas son correctas. ✓

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según la clasificación cronológica el dolor puede ser. Señala la respuesta incorrecta.

Seleccione una:

- a. Dolor agudo.
- b. Dolor Irruptivo.
- c. Dolor neuropático. ✓
- d. Dolor fin de dosis.

---

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el tercer escalón de la escalera analgésica de la OMS se encuentran: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Los opioides potentes. ✓
- b. Los opioides débiles.
- c. Los AINES.
- d. Todas son correctas.

---

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señala la respuesta correcta respecto a las úlceras tumorales.

Seleccione una:

- a. No se debe desbridar por alta vascularización del tejido y riesgo de sangrado.
  - b. Ante sangrado en sábana o puntos sangrantes aplicar varilla de nitrato de plata o alginato.
  - c. Ante hemorragias cuantiosas usar gasas impregnadas en adrenalina 1:1000, ácido traxenámico o ácido aminocaproico y ejercer presión sobre la zona sangrante.
  - d. Todas son correctas. ✓
-

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Antidepresivos, anticonvulsiantes, relajantes musculares, benzodiazepinas y corticoides forman parte de:  
Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Técnicas invasivas para el control del dolor.
- b. Primer escalón de la escala analgésica.
- c. Fármacos analgésicos coadyuvantes. ✓
- d. Segundo escalón de la escala analgésicas.

---

Actividad previa

◀ Prueba de conocimientos Módulo 2

Ir a...

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <https://www.fuden.es>