

Información

Marcar pregunta

Texto informativo

Luisa, mujer de 69 años, diagnosticada de Cáncer de mama, en fase terminal en la actualidad (con presencia de metástasis hepáticas, pulmonares y cerebrales, siendo descartado más tratamiento quirúrgico y médico de tipo curativo). Finalizada radioterapia holocraneal para tratamiento de las metástasis cerebrales de manera paliativa.

Desde el punto de vista funcional precisa ayuda personal y de dispositivos para la movilización, para actividades básicas como el aseo y vestido. Con empeoramiento de su situación limitada cama -sillón.

Ingresa en planta de hospitalización por mal control del dolor por úlcera tumoral en mama derecha con mal olor, dolor y sangrado.

Pregunta 1

Sin responder aún

Puntuación como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante la presencia de dolor, que escala de valoración utilizarías. Señala la correcta.

Seleccione una:

a.

Escala de Andersen.

b.

Escala Analógica Visual.

c.

A y b son correctas.

d.

Todas son correctas.

Pregunta 2

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la clasificación cronológica el dolor puede ser. Señala la respuesta incorrecta.

Seleccione una:

a.

Dolor agudo.

b.

Dolor Irruptivo.

c.

Dolor neuropático.

d.

Dolor fin de dosis.

Pregunta 3

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el tercer escalón de la escalera analgésica de la OMS se encuentran: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

a.

Los opioides potentes.

b.

Los opioides débiles.

c.

Los AINES.

d.

Todas son correctas.

Pregunta 4

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la respuesta correcta respecto a las úlceras tumorales.

Seleccione una:

a.

No se debe desbridar por alta vascularización del tejido y riesgo de sangrado.

b.

Ante sangrado en sábana o puntos sangrantes aplicar varilla de nitrato de plata o alginato.

c.

Ante hemorragias cuantiosas usar gasas impregnadas en adrenalina 1:1000, ácido traxenámico o ácido aminocaproico y ejercer presión sobre la zona sangrante.

d.

Todas son correctas.

Pregunta 5

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Antidepresivos, anticonvulsiantes, relajantes musculares, benzodiazepinas y corticoides forman parte de: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

a.

Técnicas invasivas para el control del dolor.

b.

Primer escalón de la escala analgésica.

c.

Fármacos analgésicos coadyuvantes.

d.

Segundo escalón de la escala analgésicas.