

Comenzado el viernes, 26 de abril de 2024, 06:34

Estado Finalizado

Finalizado el viernes, 26 de abril de 2024, 06:53

Tiempo empleado 19 minutos 32 segundos

Calificación 15 de 20 (77%)

Pregunta 1

Parcialmente correcta

Se puntúa 0 sobre 1

▼ Marcar pregunta

¿Cómo podría ayudar [la Escala VIBe](#) a los médicos? Marque todo lo que corresponda

Seleccione una o más de una:

- a. [La Escala VIBe](#) permite identificar, comunicar y tratar de manera eficiente el sangrado intraoperatorio
- b. [La Escala VIBe](#) permite identificar y etiquetar eficientemente la pérdida total de sangre intraoperatoria
- c. [La Escala VIBe](#) puede ayudar a la evaluación, selección y uso adecuado de agentes hemostáticos
- d. [La Escala VIBe](#) crea un lenguaje común dentro del equipo del quirófano

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

▼ Marcar pregunta

¿Cuánto tiempo después de un procedimiento quirúrgico se desarrollan adherencias

postoperatorias?

Seleccione una:

- a. Las adherencias comienzan durante las primeras 24 horas. No se desarrollarán nuevas adherencias después del día 3
- b. Las adherencias comienzan durante las primeras 48 horas. No se desarrollarán nuevas adherencias después del día 5
- c. Las adherencias comienzan durante las primeras 24 horas. No se desarrollarán nuevas adherencias después del día 7
- d. Las adherencias comienzan durante las primeras 72 horas. No se desarrollarán nuevas adherencias después del día 10

Respuesta correcta

Pregunta 3

Incorrecta

Se puntúa 0 sobre 1

▼ Marcar pregunta

Complete esta declaración con la opción correcta. Agentes **ACTIVOS** _____

Seleccione una:

a

n

b

a

- a. Funcionan independientemente del estado de coagulación de los pacientes
- b. Su funcionamiento depende del estado de coagulación de los pacientes

Respuesta incorrecta.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

Marcar pregunta

Verdadero o falso? La vía común es independiente de las vías intrínsecas o extrínsecas por encima de ella

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

Marcar pregunta

Verdadero o falso? La vía extrínseca se desencadena por daño tisular externo al vaso sanguíneo

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

Marcar pregunta

De acuerdo con la lista de verificación de seguridad de la cirugía de la OMS, ¿cuál es el volumen que falta en esta declaración?

El sangrado perioperatorio se considera importante cuando supera _____ en adultos o _____ mL/kg en pediatría.

Seleccione una:

a. 250 mL

d. 500 mL

c. 750 mL

b. 1.000 mL

Respuesta correcta

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

Marcar pregunta

Seleccione la opción correcta para completar esta declaración:

a
n
ó
a

Los hemostáticos adyuvantes pueden indicarse cuando los métodos convencionales son

Seleccione una:

- a. No disponible o ineficaz
- b. Poco práctico o ineficaz
- c. Imposible o no disponible

Respuesta correcta

Pregunta 8

Incorrecta

Se puntúa 0 sobre 1

Marcar pregunta

Qué funciones de la sangre faltan en esta lista?

- Transporte de células para combatir infecciones
- Regulación de la temperatura corporal
- Llevar productos de desecho al hígado y los riñones

Seleccione la opción correcta de las siguientes opciones para completar la lista:

Seleccione una:

- a. Formación de nuevos tejidos; Transporte de gases
- b. Formación de coágulos de sangre; Transporte de gases
- c. Formación de coágulos de sangre; Transporte de ácidos estomacales
- d. Formación de nuevos tejidos; Transporte de ácidos estomacales

Respuesta incorrecta.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

Marcar pregunta

Qué palabra falta en esta descripción?

La hemostasia primaria es un proceso en gran parte _____

Seleccione una:

- Químico
- Artificial
- Mecánico

Respuesta correcta

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

Marcar pregunta

Verdadero o falso? Se han reportado adherencias abdominales en la cirugía de segunda mirada en

Hasta 93% de los pacientes

a
ñ
ó
a

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

▼ Marcar pregunta

¿Qué palabra falta en esta declaración? _____ puede causar molestias al paciente, movimiento restringido de las estructuras internas o consecuencias más graves, como problemas de fertilidad en pacientes de ginecología

Seleccione una:

- c. Dehiscencia
- b. Adherencias postquirúrgicas
- a. Evisceración
- d. Fuga de líquido cefalorraquídeo

Respuesta correcta

Pregunta 12

Incorrecta

Se puntúa 0 sobre 1

○ Marcar pregunta

Aproximadamente cuántos pacientes quirúrgicos experimentan una complicación relacionada con el sangrado?

Seleccione una:

- a. 1 de cada 15 pacientes
- b. 1 de cada 10 pacientes
- c. 1 de cada 7 pacientes
- d. 1 de cada 3 pacientes

Respuesta incorrecta.

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

▼ Marcar pregunta

Cuál de las siguientes podría ser una consecuencia de un sangrado quirúrgico inesperado?

Seleccione una:

- a. Aumento de la duración de la estancia
- b. Necesidad de transfusión de sangre
- c. Mayores costes de tratamiento
- d. Todas

Respuesta correcta

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

▼ Marcar pregunta

¿Verdadero o falso? Después de la cirugía ginecológica, las adherencias intraperitoneales se forman en 55% a 100% de los pacientes

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 15

Parcialmente correcta

Se puntúa 0 sobre 1

▼ Marcar pregunta

¿Cuáles de las siguientes complicaciones están asociadas con las adherencias? Marque todas las que correspondan

Seleccione una o más de una:

- a. Obstrucción del intestino delgado
- b. Simplificación de futuras cirugías
- c. Esterilidad
- d. Dolor crónico

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

▼ Marcar pregunta

Según Stokes, et al. la mortalidad de los pacientes puede ser tan alta como el 20% para los pacientes que experimentan qué?

Seleccione una:

- a. Sin sangrado intraoperatorio
- b. Sangrado intraoperatorio leve
- c. Sangrado intraoperatorio grave

Respuesta correcta

Pregunta 17

Parcialmente correcta

Se puntúa 1 sobre 1

▼ Marcar pregunta

¿Cuáles de estos productos se clasifican como hemostáticos PASIVOS? Marque todo lo que corresponda

Seleccione una o más de una:

a

b

c

d

- a. Celulosa oxidada
- b. Colágenos
- c. Sellante de fibrina
- d. Matriz hemostática fluida de gelatina y trombina
- e. Esferas de polisacáridos

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

Marcar pregunta

La efectividad de los hemostáticos pasivos se limita a sangrados _____

Seleccione una:

- a. Severos
- b. Arteriales
- c. Menores

Respuesta correcta

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

Marcar pregunta

Cuál de estos factores de riesgo podrían predisponer a un paciente al sangrado intraoperatorio?

Marque todos los que correspondan

Seleccione una o más de una:

- a. Uso de medicamentos antiplaquetarios
- b. Elección del abordaje quirúrgico
- c. El gusto del cirujano por la música
- d. Comorbilidades de los pacientes, incluyendo diabetes y tabaquismo
- e. Mala calidad del tejido

Respuesta correcta

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

Marcar pregunta

¿Qué es [la Escala VIBe](#)?

Seleccione una:

- a. [La Escala VIBe](#) permite identificar, comunicar y tratar de manera eficiente el sangrado intraoperatorio
- b. [La Escala VIBe](#) es la primera escala validada por el cirujano diseñada para una evaluación consistente y confiable de la gravedad del sangrado intraoperatorio.

- c. [La Escala VIBe](#) es una escala no validada diseñada para una evaluación consistente y confiable de la gravedad del sangrado intraoperatorio.

Respuesta correcta

R
e
t
r
o
a
l
i
m
e
n
t
a
c
i
ó
n