

[Página Principal](#)[Mis cursos](#)[Complicaciones quirúrgicas](#)[Evaluación](#)[TEST DE EVALUACIÓN](#)

Comenzado el miércoles, 1 de mayo de 2024, 18:08

Estado Finalizado

Finalizado en miércoles, 1 de mayo de 2024, 18:21

Tiempo empleado 13 minutos 15 segundos

Calificación 16 de 20 (82%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

¿Cuáles de estos productos se clasifican como hemostáticos PASIVOS? Marque todo lo que corresponda

Seleccione una o más de una:

- a. Celulosa oxidada ✓
- b. Colágenos ✓
- c. Sellante de fibrina
- d. Matriz hemostática fluida de gelatina y trombina
- e. Esferas de polisacáridos ✓

Respuesta correcta

Pregunta 2

Incorrecta

Se puntúa 0 sobre 1

Complete esta declaración con la opción correcta. Agentes ACTIVOS\_\_\_\_\_

Seleccione una:

- a. Funcionan independientemente del estado de coagulación de los pacientes
- b. Su funcionamiento depende del estado de coagulación de los pacientes ✗

Respuesta incorrecta.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

¿Verdadero o falso? La vía extrínseca se desencadena por daño tisular externo al vaso sanguíneo

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso ✓





## Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1  
sobre 1

¿Qué palabra falta en esta descripción?

La hemostasia primaria es un proceso en gran parte

-----

Seleccione una:

- a. Químico
- b. Artificial
- c. Mecánico ✓

Respuesta correcta

## Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1  
sobre 1

¿Cuál de estos factores de riesgo podrían predisponer a un paciente al sangrado intraoperatorio? Marque todos los que correspondan

Seleccione una o más de una:

- a. Uso de medicamentos antiplaquetarios ✓
- b. Elección del abordaje quirúrgico ✓
- c. El gusto del cirujano por la música
- d. Comorbilidades de los pacientes, incluyendo diabetes y tabaquismo ✓
- e. Mala calidad del tejido ✓

Respuesta correcta

## Pregunta 6

Incorrecta

Se puntúa 0  
sobre 1

¿Aproximadamente cuántos pacientes quirúrgicos experimentan una complicación relacionada con el sangrado?

Seleccione una:

- a. 1 de cada 15 pacientes
- b. 1 de cada 10 pacientes ✗
- c. 1 de cada 7 pacientes
- d. 1 de cada 3 pacientes

Respuesta incorrecta.

## Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1  
sobre 1

¿Verdadero o falso? Después de la cirugía ginecológica, las adherencias intraperitoneales se forman en 55% a 100% de los pacientes

Seleccione una:

- Verdadero ✓
- Falso





Pregunta 8

Incorrecta

Se puntúa 0  
sobre 1

Después de la colectomía, la obstrucción adherencial del intestino delgado se desarrollará en cuántos pacientes?

Seleccione una:

- a. 1 de cada 10 pacientes
- b. 1 de cada 30 pacientes ✘
- c. 1 de cada 50 pacientes

Respuesta incorrecta.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1  
sobre 1

¿Verdadero o falso? La vía común es independiente de las vías intrínsecas o extrínsecas por encima de ella

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso ✔

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1  
sobre 1

La efectividad de los hemostáticos pasivos se limita a sangrados -----

Seleccione una:

- a. Severos
- b. Arteriales
- c. Menores ✔

Respuesta correcta

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1  
sobre 1

¿Qué funciones de la sangre faltan en esta lista?

- Transporte de células para combatir infecciones
- Regulación de la temperatura corporal
- Llevar productos de desecho al hígado y los riñones

Seleccione la opción correcta de las siguientes opciones para completar la lista:

Seleccione una:

- a. Formación de nuevos tejidos; Transporte de gases
- b. Formación de coágulos de sangre; Transporte de gases ✔
- c. Formación de coágulos de sangre; Transporte de ácidos estomacales
- d. Formación de nuevos tejidos; Transporte de ácidos estomacales

Respuesta correcta





## Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

De acuerdo con la lista de verificación de seguridad de la cirugía de la OMS, ¿cuál es el volumen que falta en esta declaración?

El sangrado perioperatorio se considera importante cuando supera \_\_\_\_\_ en adultos o 7 mL/kg en pediatría.

Seleccione una:

- a. 250 mL
- b. 500 mL ✓
- c. 750 mL
- d. 1.000 mL

Respuesta correcta

## Pregunta 13

Parcialmente correcta

Se puntúa 1 sobre 1

¿Cuáles de las siguientes complicaciones están asociadas con las adherencias? Marque todas las que correspondan

Seleccione una o más de una:

- a. Obstrucción del intestino delgado ✓
- b. Simplificación de futuras cirugías
- c. Esterilidad ✓
- d. Dolor crónico

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

## Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

¿Verdadero o falso? Se han reportado adherencias abdominales en la cirugía de segunda mirada en hasta 93% de los pacientes

Seleccione una:

- Verdadero ✓
- Falso

## Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

¿Cuál de las siguientes podría ser una consecuencia de un sangrado quirúrgico inesperado?

Seleccione una:

- a. Aumento de la duración de la estancia
- b. Necesidad de transfusión de sangre
- c. Mayores costes de tratamiento
- d. Todas ✓

Respuesta correcta





## Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

¿Cuánto tiempo después de un procedimiento quirúrgico se desarrollan adherencias postoperatorias?

Seleccione una:

- a. Las adherencias comienzan durante las primeras 24 horas. No se desarrollarán nuevas adherencias después del día 3
- b. Las adherencias comienzan durante las primeras 48 horas. No se desarrollarán nuevas adherencias después del día 5
- c. Las adherencias comienzan durante las primeras 24 horas. No se desarrollarán nuevas adherencias después del día 7 ✓
- d. Las adherencias comienzan durante las primeras 72 horas. No se desarrollarán nuevas adherencias después del día 10

Respuesta correcta

## Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

Seleccione la opción correcta para completar esta declaración:

Los hemostáticos adyuvantes pueden indicarse cuando los métodos convencionales son

-----

Seleccione una:

- a. No disponible o ineficaz
- b. Poco práctico o ineficaz ✓
- c. Imposible o no disponible

Respuesta correcta

## Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

¿Según Stokes, et al. la mortalidad de los pacientes puede ser tan alta como el 20% para los pacientes que experimentan qué?

Seleccione una:

- a. Sin sangrado intraoperatorio
- b. Sangrado intraoperatorio leve
- c. Sangrado intraoperatorio grave ✓

Respuesta correcta





## Pregunta 19

Parcialmente  
correctaSe puntúa 1  
sobre 1

¿Cómo podría ayudar [la Escala VIBe](#) a los médicos? Marque todo lo que corresponda

Seleccione una o más de una:

- a. [La Escala VIBe](#) permite identificar, comunicar y tratar de manera eficiente el sangrado intraoperatorio ✓
- b. [La Escala VIBe](#) permite identificar y etiquetar eficientemente la pérdida total de sangre intraoperatoria
- c. [La Escala VIBe](#) puede ayudar a la evaluación, selección y uso adecuado de agentes hemostáticos ✓
- d. [La Escala VIBe](#) crea un lenguaje común dentro del equipo del quirófano

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

## Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1  
sobre 1

¿Qué es [la Escala VIBe](#)?

Seleccione una:

- a. [La Escala VIBe](#) permite identificar, comunicar y tratar de manera eficiente el sangrado intraoperatorio
- b. [La Escala VIBe](#) es la primera escala validada por el cirujano diseñada para una evaluación consistente y confiable de la gravedad del sangrado intraoperatorio. ✓
- c. [La Escala VIBe](#) es una escala no validada diseñada para una evaluación consistente y confiable de la gravedad del sangrado intraoperatorio.

Respuesta correcta

## ACTIVIDAD ANTERIOR

◀ El papel de la enfermería en la prevención de complicaciones quirúrgicas

Ir a...

## ACTIVIDAD SIGUIENTE

Encuesta de satisfacción ▶

## Mantente en contacto

Conecti.me

📁 Resumen de retención de datos

📱 Descargar la app para dispositivos móviles

