

[Prueba de conocimientos Módulo 4](#)

Comenzado el	martes, 21 de mayo de 2024, 11:14
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 21 de mayo de 2024, 12:17
Tiempo empleado	1 hora 3 minutos
Puntos	18,00/20,00
Calificación	9,00 de 10,00 (90%)
Comentario -	Apto

Pregunta

1

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué características ecográficas diferencian las arterias de las venas?:

Seleccione una:

- a. El grosor de las paredes es menor en las arterias
- b. Las arterias también se colapsan, pero hace falta más presión
- c. Las arterias son pulsátiles y con el Doppler color se ven siempre rojas ✘
- d. En plano longitudinal se observan pegadas a nervios

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué rango de frecuencias utilizaremos preferentemente para la exploración abdominal?

Seleccione una:

- a. 6 – 12 MHz
- b. 5 – 9 MHz
- c. 2 – 6 MHz ✔
- d. mayor que 7 MHz

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las indicaciones de la ecografía digestiva para enfermería son principalmente. Señale la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Valoración del residuo gástrico. ✓
- b. Comprobación de la adecuada colocación de la sonda vesical.
- c. Valoración del residuo vesical.
- d. Estimación del volumen de eyección pilórica.

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la valoración de la vía aérea usaremos una sonda tipo:

Seleccione una:

- a. Convex de alta frecuencia (mayor que 7,5 MHz).
- b. Lineal de alta frecuencia (5 – 12 MHz). ✓
- c. Lineal de baja frecuencia (2 – 5 MHz).
- d. Sectorial de alta frecuencia (2 – 5 MHz).

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de transductor usaremos para la ecografía ocular principalmente?

Seleccione una:

- a. Lineal. ✓
 - b. Convex.
 - c. Sectorial.
 - d. Ginecológico
-

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Respecto a la preparación de pacientes que se van a someter a una ecografía abdominal, señale la incorrecta.

Seleccione una:

- a. Lo adecuado sería que el paciente estuviera en ayunas de al menos seis horas para reducir la presencia de contenido alimentario y gas.
- b. El gas también puede verse reducido evitando el consumo de tabaco durante las seis-ocho horas previas a la realización del estudio.
- c. El paciente deberá estar colocado en posición de decúbito prono con las piernas semiflexionadas. ✓
- d. El paciente deberá encontrarse en posición semisentada o en decúbito lateral derecho.

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señala de las siguientes, la afirmación correcta respecto de la ecografía abdominal.

Seleccione una:

- a. Los pacientes tienen que exponer sus áreas genitales cuando se realiza una exploración abdominal, lo que implica un manejo óptimo del pudor y la dignidad del paciente.
- b. Es fácil de usar en niños. ✓
- c. Produce dolor y malestar, lo que aumenta de forma significativa la ansiedad del paciente.
- d. Aumenta el riesgo de infección nosocomial.

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señala el incorrecto respecto a los signos ecográficos que determinan la ausencia de derrame pleural:

Seleccione una:

- a. Líquido anecoico de localización supradiafragmática.
 - b. Ausencia del signo de cortina. ✓
 - c. Presencia de artefactos especulares.
 - d. Ausencia del signo de la columna de vertebral.
-

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes no es una indicación de la ecografía vesical?

Seleccione una:

- a. Identificación de una retención urinaria.
- b. Como apoyo al sondaje vesical, permitiendo identificar la posición definitiva del globo de la sonda.
- c. Mejoría de la asepsia durante el sondaje vesical. ✓
- d. Como apoyo a pruebas diagnósticas como el PAD test.

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes venas no es posible su observación en la exploración de los miembros inferiores?

Seleccione una:

- a. Vena basílica. ✓
- b. Vena safena mayor.
- c. Vena femoral profunda.
- d. Vena poplítea.

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes no es una vista adicional en el examen tipo FAST?

Seleccione una:

- a. Vista paraesternal.
 - b. Vista apical.
 - c. Vista de la fosa parieto-cólica.
 - d. Vista inguinal. ✓
-

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Respecto a la visualización de la sonda naso/orogástrica. Señale la respuesta incorrecta.

Seleccione una:

- a. Es necesario utilizar la sonda con fiador metálico, aunque es posible su visualización sin fiador y en combinación con otros métodos.
- b. Se realizará un estudio previo a su inserción para valorar el estado basal del paciente.
- c. La posición más fácil para localizar el antro digestivo, es longitudinal al epigastrio en la zona subxifoidea y haciendo un barrido de izquierda a derecha.
- d. La sonda naso/orogástrica no se puede visualizar mediante ecografía. ✓

Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La excursión diafragmática se refiere a:

Seleccione una:

- a. El movimiento que realiza el diafragma durante la respiración. ✓
- b. El movimiento que realiza el diafragma únicamente en la inspiración.
- c. El movimiento que realiza el diafragma únicamente en la espiración.
- d. El movimiento pulmonar que realiza el paciente.

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de transductor usaremos para la ecografía abdominal principalmente?

Seleccione una:

- a. Lineal.
 - b. Convex. ✓
 - c. Sectorial.
 - d. Ginecológico
-

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las características ecográficas del neumotórax son, señala la incorrecta:

Seleccione una:

- a. Presencia de líneas A. ✓
- b. Ausencia del signo de deslizamiento pleural.
- c. "Código de barras" en modo M
- d. Presencia de punto pulmón.

Pregunta

16

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En la exploración FAST, en la ventana esplenorenal buscaremos:

Seleccione una:

- a. Líquido libre en el espacio de Morrison.
- b. Líquido libre en la bolsa de Koller.
- c. Líquido libre en el espacio pericárdico.
- d. Líquido libre en el saco de Douglas. ✗

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la exploración FAST, en la ventana subxifoidea buscaremos:

Seleccione una:

- a. Líquido libre en el espacio de Morrison.
 - b. Líquido libre en la bolsa de Koller.
 - c. Líquido libre en el espacio pericárdico. ✓
 - d. Líquido libre en el saco de Douglas.
-

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes es la fórmula correcta para el cálculo aproximado del volumen contenido dentro de la vejiga para hombres y mujeres?

Seleccione una:

- a. $(AP \times T \times CC) \times 0,75 = \text{Vol. cm}^3$ ✓
- b. $(AP \times T \times CC) / 0,5 = \text{Vol. cm}^3$
- c. $(AP \times T \times CC) \times 0,57 = \text{Vol. cm}^3$
- d. $(AP \times T \times CC) / 0,75 = \text{Vol. cm}^3$

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los siguientes factores pueden dar como resultado lecturas falsas al realizar una exploración ecográfica de vejiga. Señale la opción que no aumenta el riesgo de interpretación errática:

Seleccione una:

- a. Si hay un quiste en el área de la vejiga o si se ha realizado una exploración con el paciente de costado.
- b. La obesidad, la gestación avanzada o cicatriz abdominal inferior en el área de exploración.
- c. Posible alteración en la posición o forma de la vejiga, como podría ocurrir por ejemplo después de una cirugía, presencia de coágulos de sangre o litiasis en la vejiga.
- d. Los volúmenes vesicales comprendidos entre 500 y 700ml. ✓

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para la visualización de los jets ureterales en la exploración vesical usaremos el modo. Señale la correcta.

Seleccione una:

- a. Bidimensional
- b. Modo M
- c. Doppler color ✓
- d. Doppler pulsado

Actividad previa

◀ Solución del reto: ¿Sabrías reconocer si esta vejiga es de un hombre o una mujer?

Siguiente actividad

Caso práctico: Ecografía en procedimientos enfermeros ►

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <https://www.fuden.es>