

Comenzado el	jueves, 6 de junio de 2024, 11:18
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 6 de junio de 2024, 11:37
Tiempo empleado	18 minutos 39 segundos
Puntos	4,00/5,00
Calificación	8,00 de 10,00 (80%)
Comentario -	Apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Cuál de las siguientes no es una zona a explorar en el protocolo EFAST?

Seleccione una:

- a. Pericárdico
- b. Perihepático
- c. Periesplénico
- d. Perigástrico

Pregunta

2

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Qué diferencia existe entre el protocolo FAST y el protocolo SFAST?

Seleccione una:

- a. El protocolo EFAST es el protocolo extendido del FAST y examina los espacios pleurales anterior y lateral.
- b. El protocolo EFAST es el protocolo extendido del FAST y examina los espacios pericárdicos anterior y lateral.
- c. El protocolo EFAST es una nomenclatura igual que el FAST.
- d. Ninguna de las anteriores.

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

El primer punto por explorar en un traumatismo abdominal franco es:

Seleccione una:

- a. El espacio perihepático
- b. El espacio perocárdico
- c. El espacio periesplénico
- d. El espacio pélvico

Información

o

Marcar pregunta

Explicación: Cuando no es claro el traumatismo abdominal, se evalúa en primer lugar el espacio pericárdico (por la gravedad de la lesión en este espacio). Posteriormente se evaluaría la fosa hepatorenal, puesto que el receso parieto-cólico derecho es más profundo y se encuentra más liberado que el izquierdo. El líquido libre fluye preferiblemente a la derecha.

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

Seleccione una:

- a. El FAST valora lesiones de vísceras huecas.
- b. Un examen E-FAST normal no descarta una lesión intraabdominal ni descarta la presencia de líquido libre.
- c. No todo lo anecoico es líquido libre.
- d. El FAST y el E-FAST deben orientarse a un objetivo.

Pregunta

5

Correcta

¿Cuál de las siguientes no es una dificultad para la exploración FAST o E-FAST?

Seleccione una:

- a. Enfisema subcutáneo extenso, que limita una adecuada ventana acústica.
- b. Quemaduras en área abdominal.

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

- c. Fracturas de huesos largos que impiden ejercer presión con el transductor.
 - d. Obesidad que limita una adecuada ventana acústica.
-