

[Página Principal](#) » [Mis cursos](#) » [AV.P018_24](#) » [Evaluación Junio](#) »

[Curso: Cuidados enfermeros en pacientes pediátricos con alteración del nivel de consciencia y convulsiones](#)

Comenzado el	sábado, 8 de junio de 2024, 16:16
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 8 de junio de 2024, 16:33
Tiempo empleado	16 minutos 31 segundos
Puntos	30,00/30,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿en qué apartado de la secuencia ABCDE se piensa en hacer una glucemia?

Seleccione una:

- a. En la atención inmediata.
- b. En la A.
- c. En la C. ✓
- d. Se realiza en la valoración inicial.

Siempre en la C.

La respuesta correcta es: En la C.

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué intervención llevaremos a cabo en un niño en coma con respiración ruidosa?

Seleccione una:

- a. Apertura de la vía aérea
- b. Apertura de la vía aérea y aspiración de secreciones si precisa ✓
- c. Aumentar la cantidad de fármacos de sedoanalgesia
- d. Ninguna es correcta

Un paciente con alteración del nivel de consciencia y respiración ruidosa precisa: Apertura de la vía aérea y aspiración de secreciones si precisa

La respuesta correcta es: Apertura de la vía aérea y aspiración de secreciones si precisa

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La valoración primaria del estado neurológico del paciente se realizará mediante:

Seleccione una:

- a. Exploración de los pares craneales
- b. Escala AVPU
- c. Escala de coma de Glasgow
- d. b y c son correctas ✓

En la valoración primaria, en la E no se evalúan los pares craneales.

La respuesta correcta es: b y c son correctas

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un paciente con alteración del nivel de consciencia por hipoglucemia, en la valoración primaria mediante el ABCDE, en la A realizaremos

Seleccione una:

- a. Apertura de la vía aérea si precisa ✓
- b. Apertura de la vía aérea y control cervical si precisa
- c. Oxigenoterapia
- d. No hay que realizar ningún cuidado específico en la A

Apertura de la vía aérea únicamente, puesto que la causa de la alteración del nivel de consciencia es una hipoglucemia

La respuesta correcta es: Apertura de la vía aérea si precisa

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes es una patología sistémica que puede producir una alteración del nivel de consciencia?

Seleccione una:

- a. TCE
- b. Intoxicación etílica ✓
- c. Epilepsia
- d. Ninguna

La única patología sistémica: intoxicación etílica

La respuesta correcta es: Intoxicación etílica

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes es una patología sistémica que puede producir una alteración del nivel de consciencia?

Seleccione una:

- a. TCE
- b. Hipoglucemia ✓
- c. Epilepsia
- d. Ninguna

La única que es una enfermedad sistémica: hipoglucemia

La respuesta correcta es: Hipoglucemia

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al utilizar la escala AVPU para la valoración del nivel de consciencia, Obtener una respuesta "P" puede significar:

Seleccione una:

- a. Paciente no responde a estímulos dolorosos
- b. El paciente está alerta
- c. El paciente tiene un nivel de consciencia bajo ✓
- d. El paciente en seguida estará alerta

La P sugiere que el paciente tiene un nivel de consciencia bajo, el resto de ítems son falsos.

La respuesta correcta es: El paciente tiene un nivel de consciencia bajo

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un episodio de convulsión febril, cuál de los siguientes es un ítem indispensable para que sea clasificada como tal

Seleccione una:

- a. Temperatura axilar 37,5°C
- b. Temperatura axilar 38°C ✓
- c. Antecedentes de convulsiones febriles en la familia
- d. Disminución de los niveles de glucosa en sangre

Una condición indispensable es Temperatura axilar 38°C

La respuesta correcta es: Temperatura axilar 38°C

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un paciente con alteración del nivel de consciencia por intoxicación por CO, en la valoración primaria mediante el ABCDE, en la B es esencial

Seleccione una:

- a. Tomar la FR
- b. Administrar oxígeno
- c. Monitorización con pulsioximetría
- d. Todas son correctas ✓

Todas son actividades de la "B" en la valoración primaria

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la duración que ha de tener la valoración inicial de un paciente?

Seleccione una:

- a. No más de 60 segundos ✓
- b. 30 segundos
- c. Menos de 30 segundos
- d. Lo que el paciente requiera

Su realización no debe llevar más de 30-60 segundos.

La respuesta correcta es: No más de 60 segundos

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Respecto a la elección del fármaco anticomitial cuando la convulsión activa se prolonga más de diez minutos, cuál de los siguientes es de elección

Seleccione una:

- a. Fenitoína intravenosa
- b. Levetiracetam intravenoso
- c. Ácido valproico intravenoso
- d. No hay recomendación con un grado de evidencia alta ✓

No hay recomendación con grado de evidencia alta de cuál es el fármaco anticomitial de elección.

La respuesta correcta es: No hay recomendación con un grado de evidencia alta

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En una convulsión activa tónico clónica ¿qué puntuación en la escala de coma de Glasgow tendrá el paciente?

Seleccione una:

- a. 0
- b. 3 ✓
- c. 5
- d. No se puede aplicar

Un 3

La respuesta correcta es: 3

Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la dosis máxima de diazepam rectal para el tratamiento de las convulsiones?

Seleccione una:

- a. 10 mg ✓
- b. 20 mg
- c. 5 mg
- d. Hasta que finalice la convulsión

Dosis máxima de diazepam rectal: 10 mg.

La respuesta correcta es: 10 mg

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuándo se inician los tratamientos específicos del paciente con alteración del nivel de consciencia?

Seleccione una:

- a. En la valoración terciaria
- b. Una vez conocida la etiología
- c. En la valoración primaria si precisa ✓
- d. Cuando el médico lo prescriba

Los tratamientos específicos para estabilizar al paciente deber ser iniciados en la valoración primaria si son requeridos.

La respuesta correcta es: En la valoración primaria si precisa

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el tiempo de inicio de acción del diazepam intravenoso para el tratamiento de las convulsiones?

Seleccione una:

- a. Inmediato
- b. 1-3 minutos ✓
- c. 5 minutos
- d. 10 minutos

de 1 a 3 minutos.

La respuesta correcta es: 1-3 minutos

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de los agentes etiológicos de alteración de alteración del nivel de consciencia, cuál de los siguientes es una enfermedad del SNC:

Seleccione una:

- a. Hipoglucemia
- b. Trastorno hidroelectrolítico
- c. Intoxicación etílica
- d. TCE ✓

El TCE es la única enfermedad del SNC

La respuesta correcta es: TCE

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un paciente de dos años de edad con atresia de vías biliares que está sufriendo una convulsión ¿qué fármaco anticonvulsivo podremos utilizar?

Seleccione una:

- a. Levetiracetam intravenoso ✓
- b. Ácido valproico intravenoso
- c. Fenobarbital intravenoso
- d. Cualquiera de ellos

El ácido valproico está contraindicado en hepatopatía, y el fenobarbital es utilizado en las convulsiones neonatales. El fármaco anticonvulsivo a utilizar es el levetiracetam.

La respuesta correcta es: Levetiracetam intravenoso

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la valoración pupilar que se realiza durante la valoración primaria, se tiene en cuenta:

Seleccione una:

- a. Respuesta a la luz
- b. Tamaño
- c. Simetría
- d. Todas son correctas ✓

Todos los ítems son correctos

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la valoración secundaria de un paciente con convulsión activa ¿qué información específica debemos obtener al respecto?

Seleccione una:

- a. Hora de la última ingesta
- b. Existencia de síntomas asociados: fiebre, TCE, etc. ✓
- c. Alergias
- d. Estado de vacunación

Es muy importante conocer la existencia de síntomas asociados respecto a la convulsión, con lo que es una información específica que debemos obtener en la valoración secundaria.

La respuesta correcta es: Existencia de síntomas asociados: fiebre, TCE, etc.

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la valoración inicial a un paciente con convulsión tónico clónica activa, ¿qué prioridad se le asignará al paciente?

Seleccione una:

- a. Prioridad inmediata
- b. Prioridad 1
- c. a y b son correctas ✓
- d. Prioridad 2, puesto que respira

Una prioridad 1 o inmediata: puesto que el paciente tiene alterados los tres lados del TEP

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta

21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el tratamiento específico del paciente con alteración del nivel de consciencia por hipoglucemia?

Seleccione una:

- a. Bolo 2,5 ml/kg suero glucosado al 50% intravenoso
- b. Bolo 2,5-5 ml/kg suero glucosado al 10% intravenoso ✓
- c. Bolo 2,5 ml/kg suero glucosado al 50% intravenoso
- d. Depende de la apariencia del niño

Tratamiento hipoglucemia: Bolo 2,5-5 ml/kg suero glucosado al 10% intravenoso

La respuesta correcta es: Bolo 2,5-5 ml/kg suero glucosado al 10% intravenoso

Pregunta

22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Tras la administración de la primera benzodiacepina en una convulsión activa, ¿cuál es el fármaco indicado si no cede en cinco minutos?

Seleccione una:

- a. Anticonvulsivantes
- b. Barbitúricos
- c. Repetir la dosis de benzodiacepina ✓
- d. Ninguna de las anteriores

Repetir por segunda vez la dosis de benzodiacepina

La respuesta correcta es: Repetir la dosis de benzodiacepina

Pregunta

23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Qué tratamiento se realiza en la crisis febril:

Seleccione una:

- a. Administrar diazepam vía rectal
- b. Administrar midazolam transmucoso
- c. Administrar midazolam intravenoso
- d. Manejo de la fiebre con antitérmicos y del foco febril ✓

El tratamiento de la convulsión febril sólo precisa el manejo de la fiebre con antitérmicos y tratamiento del foco febril

La respuesta correcta es: Manejo de la fiebre con antitérmicos y del foco febril

Pregunta

24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El estado de alerta de un individuo se considera adecuado cuando:

Seleccione una:

- a. Tiene conocimiento de sí mismo
- b. Tiene conocimiento de su entorno
- c. Sabe su nombre
- d. A y b son correctas ✓

El estado de alerta se mantiene cuando el paciente tiene conocimiento de sí mismo y de su entorno.

La respuesta correcta es: A y b son correctas

Pregunta

25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes fármacos es de elección para el tratamiento de las crisis neonatales?

Seleccione una:

- a. Diazepam rectal
- b. Fenobarbital intravenoso ✓
- c. Midazolam nasal
- d. Cualquiera de ellos

Fenobarbital IV, es el fármaco de elección

La respuesta correcta es: Fenobarbital intravenoso

Pregunta

26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale el agente etiológico relacionado con convulsión lactantes y niños:

Seleccione una:

- a. Niveles bajos de anticomiciales
- b. Síndrome epiléptico
- c. Infección del SNC
- d. Todas pueden ser ✓

Todas pueden ser causas

La respuesta correcta es: Todas pueden ser

Pregunta

27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el caso de estar únicamente la apariencia alterada, ¿qué grado de prioridad se le otorgará al paciente:

Seleccione una:

- a. 2
- b. 3 ✓
- c. 4
- d. Inmediata

Cuando hay un lado del TEP alterado la prioridad es 3.

La respuesta correcta es: 3

Pregunta

28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de convulsión presenta un paciente con subida de fiebre hasta 38,7°C, que convulsiona con movimientos de flexión y extensión de miembros inferiores y superiores por tercera vez en 24 horas?

Seleccione una:

- a. Convulsión tónica
- b. Convulsión febril simple
- c. Convulsión clónica
- d. Convulsión febril atípica ✓

La respuesta correcta es: Convulsión febril atípica

Pregunta

29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro del triángulo de evaluación pediátrica (TEP) en la valoración del aspecto, ¿qué parte es fundamental en la aproximación al paciente con alteración del nivel de consciencia?

Seleccione una:

- a. Conexión con el medio
- b. Estado respiratorio
- c. Apariencia ✓
- d. Estado circulatorio

La apariencia puesto que es la relacionada con estado del SNC.

La respuesta correcta es: Apariencia

Pregunta

30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un paciente que está convulsionando y obtenemos una glucemia de 40 mg/dl ¿qué intervención llevaremos a cabo?

Seleccione una:

- a. Dar un sobre de azúcar
- b. Iniciar sueroterapia
- c. Administrar 2,5 ml/kg de suero glucosado al 10%, según prescripción médica ✓
- d. Esperar a que finalice la convulsión

En presencia de hipoglucemia realizaremos la intervención específica para corregirla: administración de suero glucosado al 10%.

La respuesta correcta es: Administrar 2,5 ml/kg de suero glucosado al 10%, según prescripción médica

Actividad previa

◀ Intravenous Versus Nonintravenous Benzodiazepines for the Cessation of Seizures: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials.

Ir a...

Siguiente actividad

Encuesta de satisfacción del alumnado ▶

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <https://www.fuden.es>