

[Página Principal](#) » [Mis cursos](#) » [AV.P015_24](#) » [Evaluación Junio](#) »

[Curso: Cuidados al recién nacido de alto riesgo](#)

Comenzado el	viernes, 28 de junio de 2024, 12:06
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 28 de junio de 2024, 12:55
Tiempo empleado	49 minutos 27 segundos
Puntos	5,00/5,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Apto

Información



Recién nacido de 27 semanas de edad gestacional, parto producido por rotura prematura de membranas, madurado con dos dosis de corticoides intraútero. Al minuto de nacimiento presenta: cianosis generalizada, frecuencia cardíaca aproximada de 80 latidos por minuto, respiración lenta e irregular, hipotonía generalizada y hace alguna mueca.

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál será la puntuación en el test de Apgar al minuto de vida en el caso anterior?

Seleccione una:

- a. 2
- b. 3 ✓
- c. 4
- d. 5

Ver tabla del test de Apgar. (Figura 7)

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señala la respuesta incorrecta con respecto a la reanimación del neonato en paritorio:

Seleccione una:

- a. En "el minuto de oro", evaluaremos el estado del bebé por medio de tres preguntas clave.
- b. Colocar pulsioxímetro en miembro superior izquierdo: preductal. ✓
- c. En neonatos que requieran reanimación no hay suficiente evidencia para recomendar retrasar el pinzamiento del cordón.
- d. El ordeño o "milking" está contraindicado en menos de 28 semanas de gestación.

El pulsioxímetro preductal debe colocarse en el miembro superior derecho.

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señala la respuesta incorrecta con respecto a la reanimación del neonato en paritorio:

Seleccione una:

- a. Se debe reevaluar al neonato cada 30 segundos.
- b. Se reevaluará mediante la valoración de la respiración y la frecuencia cardíaca.
- c. La aspiración de secreciones se realizará solamente si es estrictamente necesario.
- d. Se debe mantener una temperatura corporal comprendida entre 36 y 37°C. ✓

Se debe mantener una temperatura corporal comprendida entre 36.5 y 37.5°C.

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señala la respuesta correcta con respecto a los cuidados de la piel del gran prematuro:

Seleccione una:

- a. Realizar cambios posturales frecuentes.
- b. Usar colchones de gel.
- c. Usar clorhexidina acuosa para la desinfección de la piel en vez de soluciones alcohólicas.
- d. Todas son correctas. ✓

Ver tema 8 paciente prematuro, apartado "manejo inicial del gran prematuro".

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta con respecto al manejo inicial del gran prematuro?

Seleccione una:

- a. Se debe limitar la exposición a un exceso de oxígeno siguiendo los rangos recomendados de saturación de oxígeno (92-98%).
- b. Se aconseja el inicio de nutrición parenteral en las primeras 2 horas de vida, y de la nutrición enteral (leche materna siempre que se disponga de ella) en las primeras 48 horas. ✓
- c. Se recomienda administrar surfactante en aquellos prematuros que presenten sintomatología en sala de partos.
- d. Siempre que se pueda se realizará el transporte postnatal, ya que esto ha demostrado reducir la morbilidad.

Ver tema 8 paciente prematuro.

Actividad previa

◀ Prueba de conocimientos

Ir a...

Siguiente actividad

Encuesta de satisfacción del alumnado ▶

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <https://www.fuden.es>