

[Página Principal](#) » [Mis cursos](#) » [AV.B031_24](#) » [Evaluación Julio](#) »

[Curso: Atención integral y cuidados enfermeros en las urgencias extrahospitalarias neonatales](#)

Comenzado el	jueves, 11 de julio de 2024, 18:16
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 11 de julio de 2024, 18:33
Tiempo empleado	17 minutos 48 segundos
Puntos	30,00/30,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La afluencia de los neonatos a urgencias se ha visto incrementada en los últimos tiempos. Según los estudios, dicho aumento se debe a:

Seleccione una:

- a. Aumento de incidencia de infecciones por bacterias.
- b. Altas precoces en los hospitales de maternidad. ✓
- c. Conocimiento alto de los progenitores sobre el cuidado de los RN.
- d. Aumento de la alimentación con lactancia materna.

La respuesta correcta es: Altas precoces en los hospitales de maternidad.

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En cuanto a la monitorización del neonato en urgencias, es importante el control y valoración del patrón respiratorio. SEÑALE LA FALSA:

Seleccione una:

- a. La frecuencia respiratoria normal es entre 40 y 60
- b. Prestar atención a posibles signos que indiquen dificultad respiratoria.
- c. Monitorización respiratoria se realiza mediante auscultación, contaje y con ECG.
- d. La frecuencia respiratoria normal es entre 15 y 30 ✓

La respuesta correcta es: La frecuencia respiratoria normal es entre 15 y 30

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La E. Coli es la bacteria más comúnmente aislada en una infección de un neonato. Por lo tanto, ¿qué es importante descartar primariamente cuando acuden por fiebre?

Seleccione una:

- a. Infección urinaria. ✓
- b. Meningitis.
- c. Sepsis.
- d. Enfermedad metabólica.

La respuesta correcta es: Infección urinaria.

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Se define como infección respiratoria aguda de las vías aéreas inferiores, caracterizada por obstrucción al flujo aéreo, enfermedad autolimitada que se resuelve en 3 o 4 días y que el VRS es el agente causal del 60-90%, a:

Seleccione una:

- a. Neumonía.
- b. Bronquiolitis. ✓
- c. ITU.
- d. Neumotórax.

La respuesta correcta es: Bronquiolitis.

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Respecto a la prevención de la bronquiolitis, SEÑALE LA FALSA.

Seleccione una:

- a. Medidas de prevención de los factores de riesgo, aislamiento y control.
- b. Inmunoprofilaxis: administración de palivizumab.
- c. Medidas higiénicas para los niños nacidos prematuramente: educación familiar al respecto.
- d. No es importante la educación respecto al lavado de manos. ✓

La respuesta correcta es: No es importante la educación respecto al lavado de manos.

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si hablamos de: "El mecanismo de infección es por vía ascendente de la flora intestinal y, en ocasiones, secundaria a bacteriemia. El más frecuente de los gérmenes es el E. Coli" ¿De qué estaremos hablando?

Seleccione una:

- a. Meningitis.
- b. TCE.
- c. Infección urinaria. ✓
- d. Cólico del lactante.

La respuesta correcta es: Infección urinaria.

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Respecto al manejo de un ombligo infectado, debemos llevar a cabo el siguiente cuidado de enfermería:

Seleccione una:

- a. Si el ombligo sólo está húmedo, con escasa secreción serosa aunque maloliente, se debe mantener limpio y seco y nunca aplicar clorhexidina al 0.5%
- b. En caso de onfalitis, se debe mantener limpio y seco y no es necesario aplicar clorhexidina al 0.5%
- c. Si el cordón se cortó de forma poco aséptica (parto extrahospitalario) se deberá sospechar de tétanos ✓
- d. Ninguna es cierta.

La respuesta correcta es: Si el cordón se cortó de forma poco aséptica (parto extrahospitalario) se deberá sospechar de tétanos neonatal.

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La infección puede presentarse en el RN con signos clínicos inespecíficos, a menudo sutiles. ¿Cuál de ellos es susceptible de aparecer?

Seleccione una:

- a. El distrés respiratorio es el signo más común, pues aparece hasta en el 90% de los neonatos.
- b. Los síntomas gastrointestinales son vómitos, diarrea, distensión abdominal y dificultad para la alimentación.
- c. También debe considerarse la posibilidad de infección en los neonatos con inestabilidad térmica.
- d. Todas son ciertas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el manejo de la gastroenteritis aguda en urgencias, es importante: SEÑALE LA FALSA.

Seleccione una:

- a. Determinar las características de las deposiciones: inicio, duración, número, consistencia, presencia de moco, pus o sangre.
- b. Valorar síntomas asociados: fiebre, vómitos, convulsiones, alteración del estado mental, dolor abdominal, etc.
- c. Determinación del peso corporal, temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y tensión arterial.
- d. Valoración del estado general, suelen estar alterados e hiperactivos. ✓

La respuesta correcta es: Valoración del estado general, suelen estar alterados e hiperactivos.

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El tratamiento de elección en la gastroenteritis es la rehidratación oral (SRO), con qué solución es más adecuado realizarlo:

Seleccione una:

- a. Con soluciones específicas disponibles en farmacia. ✓
- b. Aquarius.
- c. Caldos.
- d. Suero oral casero.

La respuesta correcta es: Con soluciones específicas disponibles en farmacia.

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el manejo de la atresia intestinal, es importante: SEÑALE LA FALSA

Seleccione una:

- a. Mantener dieta enteral. ✓
- b. Sonda para descomprimir y evacuar contenido gastrointestinal.
- c. Proporcionar confort.
- d. Sueroterapia.

La respuesta correcta es: Mantener dieta enteral.

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Se define como: "Se caracteriza por la oclusión de la luz del íleon distal por un meconio espeso, viscoso, filante y poco pigmentado en ocasiones" a:

Seleccione una:

- a. Íleo intestinal. ✓
- b. Vólvulo intestinal.
- c. Enfermedad de Hirschsprung.
- d. Atresia intestinal.

La respuesta correcta es: Íleo intestinal.

Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las urgencias relacionadas con la lactancia materna pueden ser:

Seleccione una:

- a. Ganancia de peso excesiva.
- b. Deshidratación. ✓
- c. Hiperglucemia.
- d. Ninguna es correcta.

La respuesta correcta es: Deshidratación.

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el manejo de la pérdida de peso relacionada con la lactancia materna, SEÑALE LA FALSA:

Seleccione una:

- a. Investigar la causa. Se debe observar una toma al pecho, la técnica, la posición, la succión, el agarre...
- b. Corregir posibles problemas de posición y enganche.
- c. Preguntar sobre las deposiciones y micciones. Menos de 4 micciones al día y concentradas sugieren escaso aporte.
- d. En caso de niños excesivamente adormilados, se les dejará descansar. ✓

La respuesta correcta es: En caso de niños excesivamente adormilados, se les dejará descansar.

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué característica NO es típica del temblor?

Seleccione una:

- a. Oscilación rítmica.
- b. Inducción por estímulo. ✓
- c. Cese con la flexión pasiva del miembro.
- d. Manifestaciones autonómicas.

La respuesta correcta es: Inducción por estímulo.

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué característica es típica de la convulsión?

Seleccione una:

- a. Sacudida clónica. ✓
- b. Inducción por estímulo.
- c. Cese con la flexión pasiva del miembro.
- d. Manifestaciones autonómicas.

La respuesta correcta es: Sacudida clónica.

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En cuanto al manejo de las convulsiones. ¿Qué llevaremos a cabo?

Seleccione una:

- a. Hay que intentar entrevistar a la persona que no presenciara la crisis.
- b. No son importantes los antecedentes porque cada episodio es aislado del anterior.
- c. No es necesario la monitorización de constantes.
- d. Es importante las circunstancias en las que ocurrió: somnolencia, dolor, llanto...✓

La respuesta correcta es: Es importante las circunstancias en las que ocurrió: somnolencia, dolor, llanto...

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué puntuación en el test de Apgar tiene un recién nacido con frecuencia cardiaca de 140 latidos por minuto, buen llanto, movimientos activos, estornuda y cuerpo rosado con extremidades azules?

Seleccione una:

- a. 6
- b. 7
- c. 9✓
- d. 11

La respuesta correcta es: 9

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El Test de Silverman valora los siguientes parámetros en el paciente neonatal. Señale la opción correcta:

Seleccione una:

- a. Tono muscular, color de la piel, respiración y frecuencia cardíaca.
- b. Aleteo nasal, retracción intercostal, disociación toraco-abdominal, quejido respiratorio y retracción xifoidea. ✓
- c. Aleteo nasal, retracción intercostal, tono muscular y latido cardíaco.
- d. Frecuencia respiratoria, latido cardíaco, aleteo nasal y retracción intercostal.

La respuesta correcta es: Aleteo nasal, retracción intercostal, disociación toraco-abdominal, quejido respiratorio y retracción xifoidea.

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La convulsión neonatal puede ser causada por:

Seleccione una:

- a. Hemorragia intracraneal.
- b. Encefalopatía hipóxico-isquémica.
- c. Alteraciones metabólicas.
- d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta

21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre los síntomas que pueden aparecer en una situación de hipoglucemia en el paciente neonatal: SEÑALE LA FALSA.

Seleccione una:

- a. Pobre succión y alimentación y vómito.
- b. Bradipnea. ✓
- c. Temblores.
- d. Llanto anormal o letargia.

La respuesta correcta es: Bradipnea.

Pregunta

22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La dificultad respiratoria se manifiesta como un cuadro clínico compuesto por diversos signos que debemos valorar. ¿Cuál de estos signos NO es correcto en esta valoración?

Seleccione una:

- a. Quejido.
- b. Color.
- c. Aleteo.
- d. Frecuencia Cardíaca. ✓

La respuesta correcta es: Frecuencia Cardíaca.

Pregunta

23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué test utilizaremos para valorar el grado de dificultad respiratoria del recién nacido?

Seleccione una:

- a. Test de Apgar.
- b. Test de Silverman. ✓
- c. Test de Ballard.
- d. Test de Capurro.

La respuesta correcta es: Test de Silverman.

Pregunta

24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale cuál de las respuestas siguientes es incorrecta en relación a los cuidados de enfermería en el caso de una gastroenteritis aguda en un niño:

Seleccione una:

- a. Si el niño recibe lactancia materna, no debe interrumpirse.
- b. No hay evidencias sobre las dietas restrictivas.
- c. Se recomiendan bebidas o zumos con alto contenido en azúcar. ✓
- d. No existen evidencias de mejora con la utilización de leche sin lactosa o soja.

La respuesta correcta es: Se recomiendan bebidas o zumos con alto contenido en azúcar.

Pregunta

25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Respecto a la vía intravenosa en un neonato. SEÑALE LA FALSA:

Seleccione una:

- a. Estudiar los volúmenes y los contenidos de la solución empleada para bombear una dosis determinada.
- b. Consultar los ritmos y tiempos de infusión, sobre todo si el fármaco presenta un estrecho margen terapéutico (consultar neofax, pediamecum).
- c. Cuanto mayor es el calibre de la cánula, menor resistencia al flujo.
- d. Las perfusiones se administrarán siempre en bolo sin controlar el flujo. ✓

La respuesta correcta es: Las perfusiones se administrarán siempre en bolo sin controlar el flujo.

Pregunta

26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la correcta administración de un nebulizador a un neonato, se debe realizar:

Seleccione una:

- a. Que el bebé esté sentado en su silla.
- b. Que la mascarilla cubra la nariz, la boca y los ojos.
- c. Mantener la nebulización hasta que se termina la dosis o durante 10 o 15 minutos. ✓
- d. No limpiar la boca para evitar eliminar restos del medicamento.

La respuesta correcta es: Mantener la nebulización hasta que se termina la dosis o durante 10 o 15 minutos.

Pregunta

27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué técnica es la más adecuada y gold standar según los estudios para la recogida de muestra de orina para cultivo?

Seleccione una:

- a. Punción suprapúbica. ✓
- b. Con bolsa adhesiva.
- c. Cateterismo vesical.
- d. Con algodón.

La respuesta correcta es: Punción suprapúbica.

Pregunta

28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la estimulación rectal realizada en neonatos, el manejo de enfermería es: SEÑALE LA FALSA.

Seleccione una:

- a. Se necesita una sonda rectal de 8 o 10 Fr.
- b. Se realiza con lubricante hidrosoluble, guantes, gasas, material para higiene y recolector de la orina.
- c. Limpiar la zona.
- d. Sujetar las piernas levantándolas muy alto, dirigir las preferiblemente hacia la cabeza. ✓

La respuesta correcta es: Sujetar las piernas levantándolas muy alto, dirigir las preferiblemente hacia la cabeza.

Pregunta

29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Avisan al servicio de emergencias unos padres muy nerviosos con un neonato de 3 días (es su primer hijo), que empezó por la tarde con irritabilidad, llanto quejumbroso y fiebre. ¿Qué deberíamos sospechar?:

Seleccione una:

- a. Los neonatos tienen el sistema termorregulador inmaduro y le ha afectado el traslado del hospital a casa.
- b. Enterocolitis necrotizante.
- c. Meningitis. ✓
- d. La mamá está muy nerviosa y se lo trasmite al niño.

La respuesta correcta es: Meningitis.

Pregunta

30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué puntuación tiene en el test de Apgar un recién nacido con 90 latidos por minuto, respiración irregular, flácido, con quejido y cuerpo rosado con extremidades azules?

Seleccione una:

- a. 2
- b. 4 ✓
- c. 6
- d. 8

La respuesta correcta es: 4

Actividad previa

◀ Documento de estudio PDF

Ir a...

Siguiente actividad

Encuesta de satisfacción del alumnado ▶

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <https://www.fuden.es>