

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es correcto con respecto a la atención al paciente anciano traumático:

Seleccione una:

a.

Los traumatismos pueden acontecer en cualquier etapa de vida.

b.

La sistemática del ABCD es la estrategia a seguir en la valoración inicial.

c.

El manejo debe ir acorde a los cambios fisiológicos y anatómicos manifestados.

d.

Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es correcto con respecto al paciente pediátrico traumático.

Seleccione una:

a.

Los accidentes son la causa más frecuente de morbilidad a partir del primer año de vida

b.

Los traumatismos de los niños son diferentes a los de los adultos, incluso difiere en los niños de diferentes grupos de edad

c.

La epidemiología, la anatomía, la fisiopatología y la expresividad clínica son diferentes entre niños y adultos.

d.  
Los accidentes representan el problema menos importante de salud pública en la infancia en los países desarrollados

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los accidentes representan el problema menos importante de salud pública en la infancia en los países desarrollados

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Existen algunas diferencias en la evaluación primaria y en la resucitación inicial entre los niños y los adultos, pero no es una de ellas:

Seleccione una:

a.

Occipucio prominente en lactantes que predispone a la flexión de la cabeza en decúbito supino.

b.

La lengua es proporcionalmente mayor que la del adulto, aumentando el riesgo de bloquear la vía aérea

c.

La tráquea es más corta, lo que facilita la movilización del tubo endotraqueal con los movimientos de flexión y extensión de la cabeza

d.

Los niños son respiradores orales.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los niños son respiradores orales.

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

La obstrucción de la vía aérea es la causa que más frecuentemente provoca la muerte evitable en el niño politraumatizado. Las maniobras a llevar a cabo son:

Seleccione una:

a.

Se mantendrá alineación cabeza – cuello – tronco, manualmente o con collarín.

b.

Para la apertura de la vía aérea se sustituye la maniobra de frente–mentón por la maniobra de elevación mandibular

c.

Si es necesario aspirar secreciones, vómito o sangre, la presión del sistema de aspiración no debe superar los 80-120 mmHg.

d.

Todas son correctas.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

En el manejo de la ventilación del paciente pediátrico traumático no se recomienda:

Seleccione una:

a.

Se deben valorar signos que indiquen insuficiencia respiratoria como el aleteo nasal y el uso de los músculos abdominales.

b.

Las fracturas costales son raras en los niños, pero la contusión pulmonar es frecuente.

c.

La identificación de fracturas costales sugiere que hubo una transferencia masiva de energía, y se debe sospechar la presencia de lesiones graves a nivel pulmonar.

d.

Ventilación y frecuencia respiratoria de acuerdo con la edad: ritmo de 12-20 rpm en lactantes o 20-25 rpm en niños.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ventilación y frecuencia respiratoria de acuerdo con la edad: ritmo de 12-20 rpm en lactantes o 20-25 rpm en niños.

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

No es cierto con respecto a los cambios anatomofisiológicos de los niños.

Seleccione una:

a.

La volemia de los niños representa el 8% del peso corporal.

b.

El niño puede mantenerse normotenso hasta que la pérdida sanguínea suponga el 25% de la volemia.

c.

La reserva fisiológica aumentada de los niños permite que se mantengan la mayor parte de los signos vitales en el rango normal aun en presencia de shock grave.

d.

La ausencia de taquicardia y mala perfusión cutánea frecuentemente son las claves para reconocer tempranamente la hipovolemia.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: La ausencia de taquicardia y mala perfusión cutánea frecuentemente son las claves para reconocer tempranamente la hipovolemia.

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

El uso de la escala de Glasgow modificada está indicada para menores de:

Seleccione una:

a.

2 años.

b.

6 años.

c.

5 años.

d.

3 años.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: 3 años.

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

No es verdad con respecto al Índice de Trauma Pediátrico.

Seleccione una:

a.

Se trata de una escala de categorización aplicada a seis componentes.

b.

Debe calcularse en la atención inicial, en el lugar del accidente durante la evaluación secundaria.

c.

Es un índice de gravedad en el trauma específicamente pediátrico.

d.

Se aplica con la cinta de Broselow.

**Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Se aplica con la cinta de Broselow.

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

La cinta métrica de reanimación de Broselow (indique la correcta)

Seleccione una:

a.

se trata de una cinta con un código de colores que sirve como guía para la identificación rápida de la altura del paciente con una estimación correlacionada de peso, tamaño del equipo a utilizar y dosis convenientes de fármacos.

b.

Un lado de la cinta muestra los medicamentos y las dosis correspondientes de pacientes pediátricos según peso.

c.

Un lado de la cinta identifica el tamaño del equipo necesario para los pacientes pediátricos.



- d.  
Todas son correctas.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

SCIWORA hace referencia a:

Seleccione una:



- a.  
Lesión de la médula espinal con anomalías radiológicas



- b.  
Se trata de una lesión característica de los niños menores de 3 años



- c.  
Lesión producida porque las cápsulas articulares y los ligamentos de la columna cervical son menos elásticos en los niños que en los adultos.



- d.  
Lesión producida porque las cápsulas articulares y los ligamentos de la columna cervical son más elásticos en los niños que en los adultos.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Lesión producida porque las cápsulas articulares y los ligamentos de la columna cervical son más elásticos en los niños que en los adultos.

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

La escala que se emplea para medir el dolor en neonatos se llama:

Seleccione una:



- a.  
FRIES



- b.

PAINS

c.

BABIES

d.

CRIES

Retroalimentación

La respuesta correcta es: CRIES

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La principal causa de mortalidad materna no obstétrica es:

Seleccione una:

a.

Tumores.

b.

Intoxicaciones.

c.

Envenenamiento.

d.

Trauma.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Trauma.

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre los cambios anatomofisiológicos de la embarazada (indicar la incorrecta):

Seleccione una:

a.

El aumento del consumo de oxígeno y la reducción de la capacidad residual funcional hace que la gestante disminuya la SatO<sub>2</sub> rápidamente.

b.

Frecuencia cardíaca: hay un aumento gradual hasta 15-20 lpm, siendo más evidente a partir de la 36 semana de gestación. Debe ser considerado al interpretar una taquicardia como posible respuesta a la hipovolemia.

c.

El útero en crecimiento desplaza a las vísceras abdominales comprimiendo el diafragma, impidiendo la expansión pulmonar total y cambiando el patrón respiratorio de abdominal a torácico.

d.

Aumento del diámetro glótico por edema.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aumento del diámetro glótico por edema.

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Si en una gestante está indicada la descompresión torácica de emergencia:

Seleccione una:

a.

Se llevará a cabo con aguja a través del quinto espacio intercostal en la línea clavicular media del hemitórax afectado y/o con tubo de drenaje pleural (trocar o pleurecath) en el tercer o cuarto espacio intercostal en la línea axilar anterior, ya que en la gestante el diafragma asciende unos 4 cm.

b.

Se llevará a cabo con aguja a través del segundo espacio intercostal en la línea clavicular media del hemitórax afectado y/o con tubo de drenaje pleural (trocar o pleurecath) en el sexto espacio intercostal en la línea axilar anterior, ya que en la gestante el diafragma asciende unos 4 cm.

c.

Se llevará a cabo con aguja a través del quinto espacio intercostal en la línea clavicular media del hemitórax afectado y/o con tubo de drenaje pleural (trocar o pleurecath) en el sexto espacio intercostal en la línea axilar anterior, ya que en la gestante el diafragma asciende unos 4 cm.

d.

Se llevará a cabo con aguja a través del segundo espacio intercostal en la línea clavicular media del hemitórax afectado y/o con tubo de drenaje pleural (trocar o

pleurecath) en el tercer o cuarto espacio intercostal en la línea axilar anterior, ya que en la gestante el diafragma asciende unos 4 cm.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se llevará a cabo con aguja a través del segundo espacio intercostal en la línea claviclar media del hemitórax afectado y/o con tubo de drenaje pleural (trocar o pleurecath) en el tercer o cuarto espacio intercostal en la línea axilar anterior, ya que en la gestante el diafragma asciende unos 4 cm.

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Con respecto a la hipervolemia de la gestante, señalar la falsa:

Seleccione una:

a.

Puede perder 1200-1500 ml de volumen sanguíneo antes de presentar signos o síntomas de hipovolemia.

b.

Las hemorragias son mejor toleradas por la madre que por el feto.

c.

Una anomalía de la frecuencia cardíaca en el feto puede sugerirnos una hipovolemia.

d.

el volumen plasmático aumenta de forma constante a lo largo del embarazo, alcanzado su máximo alrededor de la semana 20 de gestación.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: el volumen plasmático aumenta de forma constante a lo largo del embarazo, alcanzado su máximo alrededor de la semana 20 de gestación.

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

El síndrome de vena cava en la gestante cursa con:

Seleccione una:

a.

Hipotensión.

b.  
Bradycardia.

c.  
Mareo.

d.  
Todas son correctas.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Para evitar el síndrome de la vena cava:

Seleccione una:

a.  
A partir de la semana 20 de gestación, se coloca a la gestante en posición de decúbito lateral derecho.

b.  
A partir de la semana 30 de gestación, se coloca a la gestante en posición de decúbito lateral izquierdo.

c.  
A partir de la semana 30 de gestación, se coloca a la gestante en posición de decúbito lateral derecho.

d.  
A partir de la semana 20 de gestación, se coloca a la gestante en posición de decúbito lateral izquierdo.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: A partir de la semana 20 de gestación, se coloca a la gestante en posición de decúbito lateral izquierdo.

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Son lesiones específicas de la embarazada tras un traumatismo:

Seleccione una:

a.  
Embolismo de líquido amniótico.

b.  
Hemorragia fetomaterna.

c.  
Rotura uterina.

d.  
Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una de las formas de identifica una rotura uterina en una gestante es:

Seleccione una:

a.  
Palpación de partes fetales libres en el abdomen.

b.  
Signos de irritación peritoneal.

c.  
Shock hipovolémico.

d.  
Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

La tinción de Kleihauer-Betke es:

Seleccione una:

a.

Un examen sanguíneo en el que se mide el número de glóbulos blancos fetales en la sangre de la mujer embarazada.

b.

Una tinción que se hace para identificar toxoplasmosis en la gestante.

c.

Una prueba genética que determina el sexo del bebe.

d.

un examen sanguíneo en el que se mide el número de glóbulos rojos fetales en la sangre de la mujer embarazada.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: un examen sanguíneo en el que se mide el número de glóbulos rojos fetales en la sangre de la mujer embarazada.

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Son cambios anatomofisiológicos circulatorios de la mujer gestante:

Seleccione una:

a.

Hipovolemia.

b.

Descenso de la frecuencia cardíaca basal.

c.

la tensión arterial aumenta en el primer trimestre.

d.

La tensión arterial disminuye en el segundo trimestre.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: La tensión arterial disminuye en el segundo trimestre.

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Son cambios anatomofisiológicos de la vía aérea en el paciente geriátrico:

Seleccione una:

a.

La cavidad bucal puede verse comprometida por una macroglosia o una microstomía.

b.

Las prótesis dentales pueden provocar obstrucción de la vía aérea.

c.

El edentulismo, o falta de dentadura, provoca cambios en el contorno facial interfiriendo en el correcto sellado con la mascarilla facial.

d.

Todas son correctas.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Son cambios anatomofisiológicos del aparato respiratorio en el paciente geriátrico:

Seleccione una:

a.

Hay una disminución de la capacidad para expandir la caja torácica

b.

la respiración depende más de la actividad diafragmática, por lo que son especialmente sensibles a las variaciones en la presión intraabdominal.

c.

El decúbito supino o la sobredistensión gástrica tras una comida abundante pueden provocar una insuficiencia ventilatoria.

d.

Todas son correctas.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

La disminución de la masa pulmonar y el aumento de la rigidez torácica hacen que el pulmón del paciente geriátrico:

Seleccione una:

a.  
Sea menos vulnerable ante una contusión.

b.  
Se vea reforzado ante un eventual traumatismo.

c.  
Pueda aumentar su capacidad máxima.

d.  
sea más vulnerable ante una contusión.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: sea más vulnerable ante una contusión.

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Algunos ancianos con enfermedades pulmonares crónicas retienen CO<sub>2</sub>, en caso de que sea necesario administrarles oxígeno:

Seleccione una:

a.  
No se debería administrar. Es mejor la hipoxia.

b.  
Es preferible ser agresivos y aplicar una ventilación mecánica a través de un tubo endotraqueal como única opción.

c.  
Puede ser que una disminución de la PCO<sub>2</sub> provoque somnolencia.



- d.  
Será necesario instaurar ventilación mecánica invasiva o no invasiva.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Será necesario instaurar ventilación mecánica invasiva o no invasiva.

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

La frecuencia cardiaca es un mal indicador de gravedad tras un traumatismo debido a los posibles efectos de la medicación y la menor respuesta del corazón a las catecolaminas circulantes, es una afirmación relacionada con el paciente:

Seleccione una:



- a.  
Pediátrico.



- b.  
Adulto.



- c.  
Gestante.



- d.  
Geriátrico

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Geriátrico

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Cuál de los siguientes signos no serían indicadores fiables para conocer el estado circulatorio de un paciente geriátrico tras un traumatismo

Seleccione una:



- a.  
Relleno capilar



- b.  
Frecuencia cardíaca.
- c.  
Tensión arterial.
- d.  
Ninguno sería un indicador fiable.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ninguno sería un indicador fiable.

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En tratamientos con sueroterapia hay que tener especial cuidado para no inducir una sobrecarga de volumen debido a la pérdida de distensibilidad del sistema cardiocirculatorio y la frecuente rigidez del ventrículo derecho, es una afirmación acerca del paciente:

Seleccione una:

- 
- a.  
Pediátrico.
- b.  
Adulto.
- c.  
Gestante.
- d.  
Geriátrico

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Geriátrico

Pregunta **29**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los ancianos tienen más tendencia a la hipotermia debido a:

Seleccione una:

- 
- a. Debido a los problemas de termorregulación.
- 
- b. Debido al menor metabolismo basal
- 
- c. Debido a los efectos de algunos fármacos.
- 
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

No es cierto con respecto al dolor en el paciente pediátrico.

Seleccione una:

- 
- a. Aumenta el tono parasimáptico.
- 
- b. Disminuye el consumo de oxígeno.
- 
- c. Aumenta la respuesta inmune.
- 
- d. Ninguna es cierta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ninguna es cierta.