



[Página Principal](#)

[Mis cursos](#)

[AV.Q069_24](#)

[Evaluación Agosto](#)

Curso: Atención enfermera en urgencias vasculares extrahospitalarias

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Comenzado el | jueves, 8 de agosto de 2024, 13:16 |
| Estado | Finalizado |
| Finalizado en | jueves, 8 de agosto de 2024, 13:48 |
| Tiempo empleado | 32 minutos 40 segundos |
| Puntos | 30,00/30,00 |
| Calificación | 10,00 de 10,00 (100%) |
| Comentario - | Apto |



Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿En qué condiciones aumenta el dolor del miembro inferior afectado por trombosis venosa profunda?

Seleccione una:

- a. Con la elevación del miembro afectado.
- b. Con el reposo y la inmovilización.
- c. Con la palpación y la bipedestación. ✓
- d. Con un vendaje compresivo.

La respuesta correcta es: Con la palpación y la bipedestación.



Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El concepto de enfermedad tromboembólica venosa incluye las siguientes entidades clínicas, señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. Trombosis venosa profunda y embolia grasa.
- b. Tromboembolismo pulmonar y hemoptisis.
- c. Trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. ✓
- d. Todas las patologías cuyo origen es un trombo, con independencia de su localización.

La respuesta correcta es: Trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar.



Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El síndrome aórtico agudo es una emergencia con alta mortalidad ¿cuál es el principal factor de riesgo?

Seleccione una:

- a. EPOC.
- b. Ateroesclerosis.
- c. Tabaquismo.
- d. Hipertensión. ✓

La respuesta correcta es: Hipertensión.



Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Señale la respuesta incorrecta con respecto a la atención extrahospitalaria de un paciente con sospecha de síndrome aórtico agudo:

Seleccione una:

- a. Mantener la presión arterial por encima de 120mmhg. ✓
- b. Mantener la frecuencia cardiaca a un ritmo cercano a los 60 latidos por minuto.
- c. Está indicada la toma de pulsos periféricos y de presión arterial en ambos brazos.
- d. Se proporcionará mínima Fio2, suficiente para mantener saturación igual o superior al 90%.

La respuesta correcta es: Mantener la presión arterial por encima de 120mmhg.



Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Las paredes de los vasos sanguíneos están formadas por las capas:

Seleccione una:

- a. Túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. ✓
- b. Túnica interior, túnica exterior y túnica vascular.
- c. Capa media, capa externa y capa vascular.
- d. Ninguna de las opciones es correcta.

La respuesta correcta es: Túnica íntima, túnica media y túnica adventicia.



Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Entre las características de las venas se encuentra:

Seleccione una:

- a. Sacan la sangre desde el corazón a los capilares.
- b. Devuelven la sangre desde los capilares al corazón. ✓
- c. Suelen ser perpendiculares a las arterias.
- d. Sus paredes son de mayor grosor que las de las arterias generalmente.

La respuesta correcta es: Devuelven la sangre desde los capilares al corazón.



Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00



Con relación a los vasos linfáticos, señala la opción correcta:

Seleccione una:

- a. Se localizan en todo el cuerpo sin excepciones.
- b. Se encargan de filtrar la sangre.
- c. Se localizan en todo el cuerpo a excepción del sistema nervioso central, oído interno, orbita, cartílago y hueso. ✓
- d. Se localizan en el sistema nervioso central, oído interno, orbita, cartílago y hueso.

La respuesta correcta es: Se localizan en todo el cuerpo a excepción del sistema nervioso central, oído interno, orbita, cartílago y hueso.



Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Es cierto en relación con la disección aortica:

Seleccione una:

- a. Es más común en mujeres.
- b. Suele ocurrir a edades tempranas, antes de los 40 años de edad.
- c. El progreso de la disección no está condicionado por la presión arterial.
- d. entre sus factores de riesgo se incluyen la hipertensión arterial y la aterosclerosis. ✓

La respuesta correcta es: entre sus factores de riesgo se incluyen la hipertensión arterial y la aterosclerosis.



Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Entre las causas de la disección aortica se puede encontrar.
Señala la opción falsa:

Seleccione una:

- a. Desgarro primario de la capa intima.
- b. Hemorragia de la vasa vasorum.
- c. Desgarro de la capa adventicia exclusivamente. ✓
- d. Rotura de una placa aterosclerótica.

La respuesta correcta es: Desgarro de la capa adventicia exclusivamente.



Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Entre los síntomas clínicos de la disección aortica No se encuentra:

Seleccione una:

- a. Dolor.
- b. Hipertensión unilateral.
- c. Hipotensión generalizada. ✓
- d. Soplo diastólico.

La respuesta correcta es: Hipotensión generalizada.





Con relación a la isquemia arterial aguda periférica, señala la opción correcta:

Seleccione una:

- a. Ocurre a causa de una interrupción brusca del flujo arterial. ✓
- b. No supone ningún riesgo añadido para el paciente.
- c. Es una patología benigna que se resuelve espontáneamente.
- d. Su único factor de riesgo es la edad avanzada.

La respuesta correcta es: Ocurre a causa de una interrupción brusca del flujo arterial.

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Entre los síntomas precoces de la isquemia arterial aguda periférica se incluyen:

Seleccione una:

- a. Cianosis del miembro.
- b. Gangrena.
- c. Pulsos periféricos saltones.
- d. Frialdad y palidez del miembro. ✓

La respuesta correcta es: Frialdad y palidez del miembro.



Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La clasificación de Stanford es útil para la clasificación de:

Seleccione una:

- a. La isquemia arterial.
- b. El síndrome varicoso.
- c. La disección de aorta. ✓
- d. La trombosis venosa profunda.

La respuesta correcta es: La disección de aorta.



Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

De las siguientes clasificaciones, cual no es útil para la disección de aorta:

Seleccione una:

- a. Clasificación de Bakey.
- b. Clasificación de Stanford.
- c. Clasificación según el tiempo de evolución.
- d. Clasificación de Rutherford. ✓

La respuesta correcta es: Clasificación de Rutherford.



Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Entre los cuidados de enfermería en relación con la isquemia arterial aguda periférica, ¿Cuál estaría desaconsejado?

Seleccione una:

- a. Control del dolor.
- b. Bipedestación y elevación del miembro afectado. ✓
- c. Valoración de los pulsos del miembro afectado.
- d. Vigilancia de la aparición de posibles complicaciones.

La respuesta correcta es: Bipedestación y elevación del miembro afectado.



Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El tratamiento de la isquemia arterial aguda periférica incluye:

Seleccione una:

- a. Revascularización precoz en tiempo inferior a 6 horas. ✓
- b. Revascularización precoz en tiempo inferior a 12 horas.
- c. Revascularización precoz en tiempo inferior a 18 horas.
- d. Revascularización precoz en tiempo inferior a 24 horas.

La respuesta correcta es: Revascularización precoz en tiempo inferior a 6 horas.



Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Para el tratamiento de la isquemia arterial aguda se pueden emplear los siguientes tratamientos excepto:

Seleccione una:

- a. Anticoagulación.
- b. Revascularización quirúrgica y/o fibrinólisis.
- c. AINES. ✓
- d. Amputación.

La respuesta correcta es: AINES.



Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Para el diagnóstico de la isquemia arterial aguda podemos realizar todo lo siguiente excepto:

Seleccione una:

- a. Anamnesis.
- b. Estudio Doppler.
- c. Radiografía de tórax. ✓
- d. Valoración clínica.

La respuesta correcta es: Radiografía de tórax.



Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Entre los factores de riesgo de la trombosis venosa profunda se incluye:

Seleccione una:

- a. Ejercicio activo intenso.
- b. Inmovilidad y embarazo. ✓
- c. Inmovilidad y corta edad de vida.
- d. Embarazo y ejercicio físico.

La respuesta correcta es: Inmovilidad y embarazo.



Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00



La tríada de Virchow se caracteriza por:

Seleccione una:

- a. Ingurgitación yugular, ruidos cardiacos apagados e hipotensión.
- b. Éxtasis venoso, lesión endotelial e hipercoagulabilidad. ✓
- c. Hipoventilación de un hemicampo pulmonar, desviación de la tráquea y disnea.
- d. Dolor, edemas en miembros inferiores e hipotensión.

La respuesta correcta es: Éxtasis venoso, lesión endotelial e hipercoagulabilidad.



Pregunta

21

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué síntomas puede presentar la trombosis venosa profunda?

Señala la incorrecta:

Seleccione una:

- a. Dolor.
- b. Ingurgitación yugular. ✓
- c. Calor local.
- d. Edema del miembro afecto.

La respuesta correcta es: Ingurgitación yugular.



Pregunta

22

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Entre los cuidados de enfermería a un paciente con trombosis venosa profunda se encuentran todos excepto:

Seleccione una:

- a. Reposo en cama con declive del miembro afecto. ✓
- b. Reposo en cama con elevación del miembro afecto.
- c. Control del dolor.
- d. Uso de sistemas de compresión del miembro afecto.

La respuesta correcta es: Reposo en cama con declive del miembro afecto.



Pregunta

23

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes escalas mide la probabilidad de padecer una trombosis venosa profunda?

Seleccione una:

- a. Escala de Glasgow.
- b. Escala LLANTO.
- c. Escala EVA.
- d. Escala de Wells. ✓

La respuesta correcta es: Escala de Wells.



Pregunta

24

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Para el tratamiento de la trombosis venosa profunda están indicados los siguientes fármacos excepto:

Seleccione una:

- a. Analgésico.
- b. Anticoagulantes.
- c. Fibrinolíticos.
- d. Antidepresivos. ✓

La respuesta correcta es: Antidepresivos.



Pregunta

25

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La presentación clásica de la trombosis venosa profunda incluye:

Seleccione una:

- a. Dolor, edema y calor local. ✓
- b. Hipertensión, dolor y cansancio.
- c. Ingurgitación yugular y hepatomegalia.
- d. Febrícula, hipotensión deshidratación.

La respuesta correcta es: Dolor, edema y calor local.



Pregunta

26

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Entre las causas del síndrome varicoso de incluye:

Seleccione una:

- a. Obesidad. ✓
- b. Cirugías previas.
- c. Vida activa.
- d. Hipotensión.

La respuesta correcta es: Obesidad.



Pregunta

27

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

De las complicaciones del síndrome varicoso, señala la falsa:

Seleccione una:

- a. Trastornos cutáneos.
- b. Trombosis venosa profunda.
- c. Hemotórax. ✓
- d. Varicoflebitis.

La respuesta correcta es: Hemotórax.



Pregunta

28

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Para el diagnóstico del síndrome varicoso estará indicado realizar

Seleccione una:

- a. Una radiografía del miembro afecto.
- b. un eco-dopler del miembro afecto. ✓
- c. Una sangría del miembro afecto.
- d. La amputación del miembro afecto.

La respuesta correcta es: un eco-dopler del miembro afecto.



Pregunta

29

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Entre los cuidados de enfermería al paciente con síndrome varicoso se incluyen, señale la opción falsa:

Seleccione una:

- a. Vendajes compresivos.
- b. Realización de cura seca. ✓
- c. Mantener piel limpia e hidratada.
- d. Valoración de las lesiones.

La respuesta correcta es: Realización de cura seca.



Pregunta

30

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Entre los signos clínicos del síndrome varicoso se incluye:

Seleccione una:

- a. Dolor, edema y arañas vasculares. ✓
- b. Edema, hipotensión y pulsos periféricos débiles.
- c. Aparición del ulceras arteriales.
- d. Edema, hipercoagulabilidad y dificultad respiratoria.

La respuesta correcta es: Dolor, edema y arañas vasculares.

Actividad previa

◀ Documento de
estudio PDF

Ir a...

Siguiente actividad

Encuesta de satisfacción
del alumnado ▶



