

**Los problemas de salud de un recién nacido a término con CIR se relacionan con:**

Seleccione una:

- ☒ **a. La malnutrición fetal ✓**
- ☐ b. La inmadurez fetal
- ☐ c. El peso al nacimiento
- ☐ d. Todas son correctas

**El diagnóstico prenatal de un CIR se realiza a través de:**

Seleccione una:

- ☐ a. Medición ecográfica del volumen de líquido amniótico
- ☐ b. Fluxometría fetal
- ☒ **c. Medición ecográfica de la biometría fetal ✓**
- ☐ d. Todas son ciertas

**¿Cuál de las siguientes no es una complicación frecuente en el recién nacido CIR?**

Seleccione una:

- ☒ **a. Hiperglucemia ✓**
- ☐ b. Hiperbilirrubinemia
- ☐ c. Policitemia
- ☐ d. Hipocalcemia

**Indique la opción incorrecta. De forma general, las intervenciones enfermeras en el cuidado a un niño con CIR, han de ir dirigidas a:**

Seleccione una:

- ☒ **a. Inicio temprano de la alimentación con biberón ✓**
- ☐ b. Monitorización de la función cardiorrespiratoria
- ☐ c. Administración de calor
- ☐ d. Monitorización de las alteraciones del hematocrito y bioquímicas

**A la hora de planificar cuidados enfermeros al niño con CIR, es preciso tener en cuenta:**

Seleccione una:

- ☐ a. Realizar una valoración de los requerimientos generales de cuidados de un recién nacido
- ☐ b. Realizar una valoración de los requerimientos específicos de cuidados derivados de su situación particular de salud

- ☐ c. Realizar una valoración de las necesidades de los padres y la relación con su hijo
- ☒ **d. Todas las opciones son ciertas ✓**

**Una vez realizado el diagnóstico prenatal de CIR asimétrico la conducta obstétrica de elección es:**

Seleccione una:

- ☐ a. Prolongar el embarazo
- ☐ b. Inducir el parto
- ☒ **c. Valorar el estado de bienestar fetal ✓**
- ☐ d. Programar una cesárea

**A la hora de realizar la valoración de un neonato con policitemia, ¿cuál de los siguientes no es un parámetro a tener en cuenta?**

Seleccione una:

- ☒ **a. Monitorizar la aparición de coloración icterica ✓**
- ☐ b. Vigilar la aparición de coloración pletórica
- ☐ c. Vigilar signos de distrés respiratorio
- ☐ d. Monitorizar el hematocrito

**La fluximetría Doppler sirve para:**

Seleccione una:

- ☐ a. Confirmar la existencia de CIR en el feto
- ☐ b. Diferenciar el tipo de CIR que presenta el feto
- ☐ c. El grado de CIR que presenta el feto
- ☒ **d. Ninguna es correcta ✓**

**Al realizar la valoración de la piel del niño, el signo que indica la presencia de policitemia es:**

Seleccione una:

- ☐ a. Temblores
- ☐ b. Coloración cianótica
- ☐ c. Diaforesis
- ☒ **d. Coloración pletórica ✓**

**La probabilidad de que un recién nacido con CIR presente hipoglucemia es del:**

Seleccione una:

- ☐ a. 10-15%
- ☒ b. 15-20% ✓
- ☐ c. 10-25%
- ☐ d. 30-35%

**En los neonatos con CIR una de las siguientes etiquetas diagnósticas está siempre presente:**

Seleccione una:

- ☐ a. Limpieza ineficaz de las vías áreas
- ☐ b. Riesgo de daño tisular
- ☒ c. Termorregulación ineficaz ✓
- ☐ d. Riesgo de infección

**La hipoglucemia del neonato con CIR se produce por:**

Seleccione una:

- ☐ a. Escasez de grasa parda
- ☐ b. Escasez de panículo adiposo
- ☒ c. Escasez de glucógeno hepático ✓
- ☐ d. Exceso de insulina

**La relación entre las malformaciones y el CIR en el neonato es:**

Seleccione una:

- ☐ a. Las malformaciones son la causa del CIR asimétrico
- ☐ b. Las malformaciones no son una consecuencia del CIR asimétrico
- ☒ c. Las malformaciones son la causa del CIR simétrico ✓
- ☐ d. Ninguna es correcta

**En el proceso de evitación del riesgo de conflicto del rol parental, una de las NIC es apoyo a la familia. ¿Qué actividad no estará incluida entre las actividades posibles a realizar para conseguir el objetivo de apoyar a la familia?**

Seleccione una:

- ☒ a. Rechazar aquellos valores familiares que consideremos no adecuados ✓
- ☐ b. Asegurar a la familia que al paciente se le brindan los mejores cuidados posibles

- ☐ c. Favorecer una relación de confianza con la familia
- ☐ d. Responder a todas las preguntas de los miembros de la familia

**De todos los recién nacidos con CIR, al CIR asimétrico corresponde el siguiente porcentaje:**

Seleccione una:

- ☐ a. De un 80-90%
- ☒ **b. De un 60-70% ✓**
- ☐ c. De un 40-50%
- ☐ d. De un 20-30%

**La extracción de un feto con CIR asimétrico está indicada cuando, señale la respuesta incorrecta:**

Seleccione una:

- ☐ a. El perfil biofísico es bajo
- ☐ b. Se ha detenido el crecimiento fetal
- ☐ c. Existe maduración pulmonar
- ☒ **d. El peso del feto es superior a 2.200kg ✓**

**Para realizar la observación de la función respiratoria del niño, se utiliza la siguiente herramienta de valoración:**

Seleccione una:

- ☐ a. Test de Apgar
- ☐ b. Test de Yesavage
- ☒ **c. Test de Silverman-Anderson ✓**
- ☐ d. Test de la posición del trípode

**El tratamiento de la hipoglucemia en los neonatos con CIR consiste en:**

Seleccione una:

- ☐ a. Iniciar la alimentación precoz con leche humanizada
- ☐ b. Iniciar la alimentación precoz con suero glucosado al 5%
- ☒ **c. Iniciar la alimentación precoz con lactancia materna ✓**
- ☐ d. Iniciar el aporte de glucosa con suero glucosado al 10% por vía intravenosa

**El recién nacido con CIR, en la etapa de lactante, tiene mayor riesgo de:**

Seleccione una:

- ☐ a. Presentar problemas cardiovasculares
- ☐ b. Presentar diarreas
- ☐ c. Presentar problemas de lenguaje
- ☒ **d. Todas son ciertas ✓**

**El cordón umbilical del recién nacido con CIR es:**

Seleccione una:

- ☒ **a. De longitud normal y delgado ✓**
- ☐ b. De longitud y grosor normal
- ☐ c. De longitud corta y delgado
- ☐ d. De longitud corta y con mucha gelatina

**El diagnóstico enfermero Riesgo de deterioro de la integridad cutánea presente en un niño con CIR, no está relacionado con el factor relacionado:**

Seleccione una:

- ☐ a. Lesión secundaria a encamamiento
- ☐ b. Monitorización con electrodos
- ☐ c. Falta de tejido adiposo
- ☒ **d. Falta de flora saprofita en el piel ✓**

**El CIR asimétrico se caracteriza por:**

Seleccione una:

- ☒ **a. Diámetro biparietal adecuado, longitud del fémur adecuado y diámetro abdominal transversal bajo ✓**
- ☐ b. Diámetro biparietal adecuado, longitud del fémur y diámetro abdominal transversal bajo
- ☐ c. Diámetro biparietal bajo, longitud del fémur adecuada y diámetro abdominal transversal bajo
- ☐ d. Diámetro biparietal, longitud del fémur y diámetro abdominal transversal bajo

**Los factores maternos que favorecen el nacimiento de un niño con CIR asimétrico son:**

Seleccione una:

- ☐ a. Dieta poco equilibrada
- ☒ **b. Bajo peso de la madre antes de la gestación ✓**
- ☐ c. Consumo de sustancias tóxicas antes de la gestación
- ☐ d. Ejercicio durante el embarazo

**El sufrimiento fetal agudo como complicación en el nacimiento de un recién nacido con CIR se debe a:**

Seleccione una:

- ☐ a. El estrés del parto
- ☐ b. Alteración en la función placentaria
- ☒ **c. Ambas opciones de respuesta son correctas ✓**
- ☐ d. ninguna es cierta

**Entre un 12-50% de los recién nacidos con CIR presentan policitemia, su hematocrito venoso es superior al:**

Seleccione una:

- ☐ a. 45%
- ☐ b. 50%
- ☐ c. 60%
- ☒ **d. 65% ✓**

**En la monitorización para la prevención o detección precoz de las complicaciones propias del recién nacido con CIR ha de estar incluida:**

Seleccione una:

- ☐ a. La distensión abdominal.
- ☐ b. El color de la piel y mucosas
- ☐ c. El aspecto de las heces
- ☒ **d. Todas son correctas. ✓**

**Al nacimiento el neonato con CIR simétrico presenta:**

Seleccione una:

- ☐ a. Piel seca, descama y con pliegues
- ☐ b. Aspecto de "viejo"
- ☒ **c. Curva de crecimiento intrauterino retardada ✓**
- ☐ d. Todas son ciertas

**El CIR en un neonato de madre adicta a drogas se debe principalmente:**

Seleccione una:

- ☐ a. Al consumo de drogas
- ☒ **b. Al consumo añadido de otras sustancias como el tabaco ✓**
- ☐ c. Al embarazo no controlado
- ☐ d. Al interés prioritario de la madre sobre la obtención y el consumo de drogas

**Las complicaciones más frecuentes en el momento del nacimiento de un neonato con CIR son:**

Seleccione una:

- ☐ a. Asfixia perinatal
- ☐ b. Sufrimiento fetal
- ☐ c. Aspiración de líquido meconial
- ☒ **d. Todas son ciertas ✓**

**La prevención del CIR ha de estar basada en la educación sanitaria sobre:**

Seleccione una:

- ☐ a. Las consecuencias de la adicción al tabaco en el feto
- ☐ b. Las consecuencias de una mala alimentación en el feto
- ☐ c. Los beneficios del buen control de enfermedades maternas sobre el feto
- ☒ **d. Todas son ciertas ✓**