

Se entiende por recién nacido pretérmino aquel que:

Seleccione una:

- ☐ a. La edad gestacional es inferior a 30 semanas
- ☐ b. Madurez de sus órganos
- ☒ **c. La edad gestacional es inferior a 37 semanas completas de gestación ✓**
- ☐ d. La edad gestacional es superior a 37 semanas

Entre las complicaciones de la cirugía fetal se encuentran:

Seleccione una:

- ☐ a. Parto prematuro
- ☐ b. Muerte fetal
- ☐ c. Lesión de órganos fetales
- ☒ **d. Todas son ciertas ✓**

Al clasificar los recién nacidos según la relación edad gestacional-peso, indique la respuesta falsa:

Seleccione una:

- ☐ a. Recién nacido de peso adecuado para su edad gestacional
- ☐ b. Recién nacido de bajo peso para su edad gestacional
- ☒ **c. Recién nacido de peso elevado para su edad gestacional con un peso inferior al percentil 90 ✓**
- ☐ d. Recién nacido de peso elevado para su edad gestacional con un peso superior al percentil 90

No es cierto en referencia a la fetoscopia que:

Seleccione una:

- ☐ a. Consiste en la visualización del feto
- ☐ b. Es una técnica mínimamente invasiva ✗
- ☒ **c. Se realiza vía transcervical**
- ☐ d. Se utiliza un instrumento endoscópico que se introduce en la cavidad amniótica o en el propio feto

La capacidad digestiva de los prematuros se caracteriza por:

Seleccione una:

- ☐ a. Capacidad gástrica de 100 ml
- ☒ **b. Capacidad gástrica de menos de 30 ml ✓**
- ☐ c. Hipertonía pilórica y de cardias

- ☐ d. Mejor digestión de grasas saturadas que de insaturadas, lo que produce esteatorrea

Llamamos Prematuro de alto riesgo a aquel que su edad gestacional corresponde a:

Seleccione una:

- ☒ **a. De la 26 a la 30 semana de gestación ✓**
- ☐ b. Es menor de 25 semanas de gestación
- ☐ c. Es menor de 35 semanas de gestación
- ☐ d. Es menor de 37 semanas de gestación

Los cuidados enfermeros, en el transporte neonatal van dirigidos a:

Seleccione una:

- ☐ a. Mantener las vías aéreas permeables
- ☐ b. Proporcionar una oxigenación adecuada
- ☐ c. Evitar complicaciones
- ☒ **d. Todas son ciertas ✓**

Uno de los objetivos, en la necesidad de respirar será:

Seleccione una:

- ☒ **a. Conseguir un intercambio gaseoso efectivo con el mínimo esfuerzo respiratorio del neonato ✓**
- ☐ b. Conseguir un intercambio gaseoso efectivo con el máximo esfuerzo respiratorio del neonato
- ☐ c. Evitar complicaciones
- ☐ d. Proporcionar una oxigenación adecuada

Hacer profilaxis oftálmica, umbilical y administrar vitamina K es una acción de enfermería para satisfacer:

Seleccione una:

- ☒ **a. La necesidad mantener la higiene corporal ✓**
- ☐ b. La necesidad comer y beber
- ☐ c. La necesidad mantener la temperatura corporal
- ☐ d. La necesidad de respirar

El Pretérmino necesita para una adecuada función respiratoria:

Seleccione una:

- ☐ a. Surfactante pulmonar ✗
- ☐ b. Sacos alveolares suficientes
- ☐ c. Alvéolos suficientes para el intercambio gaseoso

- ☒ **d. Todas son correctas**

En las acciones de enfermería cuando existen fases de apnea, una de las siguientes respuesta no es cierta, señálela:

Seleccione una:

- ☐ a. Estimulación cutánea difusa
- ☒ **b. Hiperventilar ✓**
- ☐ c. Ventilar con ambú
- ☐ d. Aspirar mucosidades

Señale la afirmación correcta entre las siguientes respecto al recién nacido prematuro:

Seleccione una:

- ☐ a. Su metabolismo basal es elevado, lo que explica su escaso panículo adiposo y su alta producción de calor corporal
- ☒ **b. Su metabolismo basal es bajo, lo que con su escaso panículo adiposo explica su tendencia a la hipotermia ✓**
- ☐ c. Su metabolismo basal es bajo, lo que explica su rico panículo adiposo y su tendencia a la acumulación de calor corporal
- ☐ d. Todas son falsas

La administración de surfactante exógeno es el tratamiento idóneo para:

Seleccione una:

- ☐ a. La hemorragia intracraneal
- ☒ **b. El distrés respiratorio ✓**
- ☐ c. La enterocolitis necrotizante
- ☐ d. Todas son ciertas

A la hora de administrar oxigenoterapia la enfermera/o deberá tener en cuenta:

Seleccione una:

- ☐ a. La situación del niño
- ☐ b. La concentración de oxígeno
- ☐ c. Administra oxígeno siempre húmedo y caliente
- ☒ **d. Todas son ciertas ✓**

En la alimentación enteral por sonda para evaluar la tolerancia la enfermera/o se guiara:

Seleccione una:

- ☐ a. Por la cantidad de residuos gástricos
- ☐ b. La presencia de vómitos
- ☐ c. Distensión abdominal
- ☒ **d. Todas son correctas ✓**

¿Cuál de las posibles alteraciones digestivas del prematuro que se enumeran a continuación es más grave?

Seleccione una:

- ☐ a. Distensión gástrica
- ☐ b. Diarreas por un excesivo aporte de nutrientes dada su escasa capacidad gástrica
- ☒ **c. Enterocolitis necrotizante ✓**
- ☐ d. Ninguna se presenta en el prematuro

A los diagnósticos que podemos llegar en la necesidad de de mantener la higiene, la integridad de la piel son todos los siguientes, excepto:

Seleccione una:

- ☐ a. Deterioro de la movilidad física relacionado con prematuridad
- ☒ **b. Interrupción de los procesos familiares relacionados con el desempeño del nuevo rol ✓**
- ☐ c. Riesgo de lesión relacionado con procedimientos invasivos
- ☐ d. Riesgo de traumatismo relacionado con aumento del riesgo de lesión tisular accidental

Los cartílagos auriculares en el Pretérmino están:

Seleccione una:

- ☐ a. Muy desarrollados
- ☒ **b. Poco desarrollados**
- ☐ c. Son de baja implantación
- ☐ d. La consistencia del cartílago es normal ✗

Una de las siguientes alteraciones se ve influenciada en el prematuro por la inmadurez hepática fetal. Señálela:

Seleccione una:

- ☐ a. Hipoglucemias
- ☐ b. Hipoproteinemias
- ☐ c. Hiperbilirrubinemias

- ☒ **d. Todas están influenciadas por la inmadurez hepática fetal ✓**

Cuál de la relación siguiente es la característica principal del Pretérmino:

Seleccione una:

- ☐ a. La edad gestacional es inferior a 42 semanas completas de gestación
- ☒ **b. Inmadurez de sus órganos ✓**
- ☐ c. La edad gestacional es inferior a 35 semanas de gestación
- ☐ d. La edad gestacional es superior a 40 semanas de gestación

Evitaremos el exceso de ruido, luces y sobreestimulación, bajando el volumen de monitores, alarmas, voz, luces... son acciones de enfermería encaminadas a satisfacer:

Seleccione una:

- ☐ a. La necesidad mantener la higiene corporal
- ☐ b. La necesidad comer y beber
- ☐ c. La necesidad mantener la temperatura corporal
- ☒ **d. La necesidad de evitar los peligros, dormir descansar y comunicarse ✓**

Una de las siguientes características digestivas no es típica del prematuro:

Seleccione una:

- ☐ a. Reflejos de succión y deglución muy debilitados y sin coordinar hasta las semanas 34-35
- ☒ **b. La motilidad digestiva está aumentada por el gran desarrollo muscular**
- ☐ c. Escasa fuerza de la musculatura bucal
- ☐ d. Reducida capacidad gástrica con forma tubular ✗

Las acciones de enfermería en la nutrición parenteral son todas, excepto una. ¿Cuál?

Seleccione una:

- ☐ a. Administrar la alimentación, vigilando el ritmo de perfusión
- ☐ b. Vigilar la aparición de signos de reacciones agudas a la alimentación
- ☒ **c. Realizar succión no nutritiva ✓**
- ☐ d. Prevenir infecciones

Las acciones de enfermería en la nutrición enteral son:

Seleccione una:

- ☐ a. Detectar los signos de intolerancia digestiva
- ☐ b. Pesar al neonato a diario y medir la talla y el perímetro cefálico semanalmente
- ☐ c. Realizar succión no nutritiva
- ☒ **d. Todas son ciertas ✓**

A los diagnósticos que podemos llegar en la necesidad de evitar los peligros, dormir y descansar son:

Seleccione una:

- ☐ a. Riesgo de infección relacionado con inmadurez del sistema inmunitario del prematuro
- ☐ b. Riesgo de alteración de la vinculación entre los padres y el neonato relacionado con la separación padres-hijo
- ☐ c. Alteración de los procesos de relación de la familia y patrones familiares relacionados con el nacimiento de un hijo pretérmino
- ☒ **d. Todos son ciertos ✓**

En la terapia génica no es cierto que:

Seleccione una:

- ☐ a. Utiliza la fetoscopia como guía
- ☐ b. Emplea células que actúan como un trasplante
- ☒ **c. La incorporación a la práctica clínica es ya una realidad**
- ☐ d. Su objetivo son ciertas enfermedades hereditarias ✗

La piel del Pretérmino es:

Seleccione una:

- ☐ a. Cianótica
- ☐ b. Ictérica
- ☒ **c. Roja, fina, transparente ✓**
- ☐ d. Sonrosada

En cuanto a la técnica PLUG es falso que:

Seleccione una:

- ☐ a. Se utiliza en la reparación de hernias diafragmáticas
- ☒ **b. Se introduce un balón que ocluye el defecto diafragmático**
- ☐ c. Es una técnica que utiliza la fetoscopia
- ☐ d. La gestación se finaliza mediante técnica EXIT ✗

Procurar mantener al niño en posición fetal es una acción de enfermería para satisfacer:

Seleccione una:

- ☐ a. La necesidad mantener la higiene corporal
- ☐ b. La necesidad comer y beber
- ☒ **c. La necesidad mantener la temperatura corporal ✓**
- ☐ d. La necesidad de respirar

Las principales anomalías fetales que se pueden corregir por fetoscopia son:

Seleccione una:

- ☐ a. Hernias diafragmáticas
- ☐ b. Mielomeningocele
- ☐ c. Obstrucciones del tracto urinario
- ☒ **d. Todas son correctas ✓**