

La etapa del embarazo en la que se consume alcohol:

Seleccione una:

- ☐ a. No tiene importancia en la gravedad de los efectos en el RN
- ☐ b. En el tercer trimestre no reviste consecuencias graves
- ☒ **c. En el primer trimestre se producen las alteraciones más graves ✓**
- ☐ d. Afecta en todos los trimestres por igual

En el tratamiento del síndrome de alcoholismo fetal:

Seleccione una:

- ☐ a. Es importante instaurar un tratamiento farmacológico personalizado al RN
- ☒ **b. El único tratamiento eficaz es la abstinencia materna ✓**
- ☐ c. Con programas de estimulación adecuados el niño resuelve su retraso cognitivo
- ☐ d. Una vez pasada la fase de abstinencia no se necesitan más controles

Dentro de las anomalías faciales que se dan el síndrome de alcoholismo fetal:

Seleccione una:

- ☐ a. La más característica es la macrocefalia
- ☒ **b. Suelen tener el labio superior delgado y los ojos pequeños ✓**
- ☐ c. Se da una característica pigmentación en la zona occipital
- ☐ d. La nariz suele ser más alargada y aplanada

Los hijos de madres consumidoras de..... tienen menos riesgo de EMH (enfermedad de la membrana hialina):

Seleccione una:

- ☐ a. Cannabis
- ☐ b. LSD
- ☒ **c. Heroína ✓**
- ☐ d. Tabaco

Respecto al análisis de tóxicos en orina, no es cierto:

Seleccione una:

- ☐ a. Detecta cocaína, anfetaminas, barbitúricos, marihuana y opiáceos
- ☐ b. Indica si ha habido consumo sólo en los días previos al parto
- ☒ **c. Es una prueba altamente fiable ✓**

- ☐ d. La detección se puede realizar tanto en orina materna como del RN

El test de Finnegan se realizará:

Seleccione una:

- ☒ a. Con el niño despierto y calmado ✓
- ☐ b. Con el niño dormido y lo más tranquilo posible
- ☐ c. Hay que evaluarlo como este en ese momento para no enmascarar puntuaciones
- ☐ d. Se realizará inmediatamente antes de la toma para poder dar la correcta puntuación a su estado

Como problemas tardíos en niños que han sufrido SAN no se encuentra:

Seleccione una:

- ☐ a. Retraso madurativo
- ☐ b. Retraso pondoestatural
- ☒ c. Hipoactividad ✓
- ☐ d. Mayor incidencia de muerte súbita del lactante

Los hijos de mujeres consumidoras de heroína no tienen riesgo de presentar:

Seleccione una:

- ☒ a. Macrosomía ✓
- ☐ b. Infección respiratoria
- ☐ c. Prematuridad
- ☐ d. Deficiencia en el desarrollo neurológico

Los bebés prematuros:

Seleccione una:

- ☐ a. Presentan el mismo síndrome de abstinencia que un bebé a término
- ☐ b. Presentan un síndrome de abstinencia más grave que un bebé a término
- ☒ c. Presentan menos predisposición a sufrir el síndrome de abstinencia ✓
- ☐ d. Presentan menos predisposición a sufrir el síndrome de abstinencia pero su intensidad es mayor que en bebés a término

Los síntomas del síndrome de abstinencia a drogas son más graves:

Seleccione una:

- ☐ a. En RN < 35 semanas
- ☒ **b. Si hay policonsumo de drogas ✓**
- ☐ c. Si no se consume la última semana
- ☐ d. Todas las respuestas son ciertas

El test de Finnegan se debe hacer al RN con sospecha de SAN cada:

Seleccione una:

- ☒ **a. Cada 2-3 horas durante las primeras 48 horas de vida ✓**
- ☐ b. No se realizara si el RN no presenta clínica
- ☐ c. Cada 12 horas durante la primera semana de vida
- ☐ d. Todas son ciertas

Como factores de riesgo asociados al SAN no se encuentra:

Seleccione una:

- ☐ a. Ambiente socioeconómico adverso
- ☒ **b. Madres mayores de 35 años ✓**
- ☐ c. Deficiencia nutricional
- ☐ d. Riesgo de padecer diferentes infecciones

El síndrome de abstinencia al alcohol:

Seleccione una:

- ☐ a. No suele aparecer en RN de madres bebedoras
- ☐ b. Se trata con antabus
- ☒ **c. Puede durar hasta 18 meses ✓**
- ☐ d. No aparece si se produce un consumo habitual pero controlado

¿Cuál es la escala de valoración del SAN más utilizada?

Seleccione una:

- ☐ a. Silverman
- ☐ b. Ostrea
- ☒ **c. Finnegan ✓**
- ☐ d. Lipsitz

El síndrome de alcoholismo fetal se diagnostica por:

Seleccione una:

- ☒ **a. Aspecto físico del bebé y antecedentes de la madre ✓**
- ☐ b. Niveles de alcohol en el RN
- ☐ c. Test del aliento en madre y RN
- ☐ d. Test de Finnegan

Son problemas para el diagnóstico del SAN:

Seleccione una:

- ☐ a. Negación y falta de reconocimiento materno
- ☐ b. Policonsumidoras
- ☐ c. Confusión sobre datos perinatales
- ☒ **d. Todas son ciertas ✓**

Respecto a la prevención del síndrome de alcoholismo fetal:

Seleccione una:

- ☒ **a. Lo grupos de apoyo son importantes ✓**
- ☐ b. No es necesaria la ayuda profesional si la embarazada abusa del alcohol
- ☐ c. El síndrome de alcoholismo fetal se puede prevenir en un 20%
- ☐ d. Todas son ciertas

El porcentaje de RN expuestos a drogas durante el periodo intrauterino es:

Seleccione una:

- ☐ a. El 2%
- ☐ b. Del 5 al 50%
- ☒ **c. Del 5 al 10% ✓**
- ☐ d. Ninguna es correcta

Dentro de las complicaciones obstétricas es cierto:

Seleccione una:

- ☐ a. Prematuridad
- ☐ b. Riesgo infeccioso
- ☐ c. Corioamnionitis
- ☒ **d. Todas son ciertas ✓**

Respecto a la duración del síndrome de abstinencia es incierto:

Seleccione una:

- ☐ a. La metadona puede presentar un síndrome de abstinencia precoz
- ☐ b. La aparición del síndrome de abstinencia a metadona puede retrasarse hasta las 3-4 semanas de vida (clínica tardía)
- ☐ c. El síndrome de abstinencia más precoz es el que se da con el consumo de heroína y/o alcohol
- ☒ **d. Las drogas de diseño no suelen presentar un síndrome de abstinencia ✓**

No es motivo de sospecha SAN:

Seleccione una:

- ☐ a. Madres carentes de atención prenatal (embarazo mal o poco controlado)
- ☒ **b. Madres que reclaman atención continuamente ✓**
- ☐ c. Puérperas que desean abandonar el hospital de forma inmediata tras el parto
- ☐ d. Madres con historia psicosocial que sugiera relación con drogas

Sobre el síndrome de abstinencia en el RN una de las siguientes afirmaciones es incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. El síndrome de abstinencia es diferente dependiendo de la droga usada por la madre
- ☒ **b. El cannabis por sí solo no provoca síndrome de abstinencia en el RN ✓**
- ☐ c. Todas las drogas tienen algún efecto en el RN
- ☐ d. El síndrome de abstinencia más común es el que se da por el consumo de opiáceos

Respecto al síndrome de abstinencia a opiáceos es falso:

Seleccione una:

- ☐ a. Provoca el síndrome de abstinencia más frecuente y prolongado
- ☐ b. No aparece si no hubo consumo en el último mes de gestación
- ☒ **c. No produce clínica digestiva ✓**
- ☐ d. El 60-90% de los RN que han sido expuestos a estas drogas desarrollan el síndrome de abstinencia

Como complicaciones obstétricas características del consumo de cocaína en el embarazo son:

Seleccione una:

- ☐ a. Crisis de HTA
- ☐ b. Desprendimiento de placenta
- ☐ c. Aborto espontáneo
- ☒ **d. Todas son ciertas ✓**

¿Cuál de estas sustancias no provoca síndrome de abstinencia en el RN?

Seleccione una:

- ☐ a. Opiáceos
- ☐ b. Drogas de diseño
- ☐ c. Cannabis
- ☒ **d. Todas son falsas ✓**

Según la puntuación obtenida en el test de Finnegan, el tratamiento farmacológico se instaurara:

Seleccione una:

- ☐ a. Si hay una primera puntuación mayor de 8
- ☒ **b. Si se obtiene una media > 8 en tres puntuaciones seguidas ✓**
- ☐ c. Si se obtiene una media > 8 en tres puntuaciones alternas
- ☐ d. Da igual la puntuación, siempre que presente sospecha y al menos tres síntomas

El síndrome de abstinencia en el niño no se caracteriza:

Seleccione una:

- ☐ a. Hiperactividad y Temblor
- ☐ b. Llanto y convulsiones
- ☒ **c. Anorexia y somnolencia ✓**
- ☐ d. Irritabilidad

En el síndrome de alcoholismo fetal las anomalías más características son:

Seleccione una:

- ☐ a. Anomalías faciales
- ☐ b. Retraso mental
- ☒ **c. A y b son ciertas ✓**
- ☐ d. Alopecia

El diagnóstico diferencial en el síndrome de abstinencia a drogas:

Seleccione una:

- ☐ a. Hay que hacerlo con aquellas patologías que cursan con disminución de la actividad neurológica
- ☒ **b. Hay que descartar hipoglucemia, sepsis, hipocalcemia ✓**
- ☐ c. No hay patologías que puedan confundirse con el SAN a drogas
- ☐ d. Hay que descartar hipercalcemia e hipotiroidismo

En el tratamiento del SAN a drogas:

Seleccione una:

- ☒ **a. Inicialmente hay que instaurar un tratamiento de apoyo ✓**
 - ☐ b. Rara vez se utiliza tratamiento farmacológico
 - ☐ c. Se puede instaurar un tratamiento farmacológico preventivo
 - ☐ d. Las dosis medicación se pautaran en base a las puntuaciones obtenidas en el test de Silverman
-