

Cuando una madre quiere amamantar a sus hijos ¿Qué debemos evitar?

Seleccione una:

- ☐ a. Ayudar a colocar de forma correcta a los niños
- ☐ b. Crear un clima de intimidad
- ☒ **c. Retrasar el inicio de la lactancia ✓**
- ☐ d. Explicar a la madre la forma de realizar la extracción de la leche cuando los niños no pueden mamar

Respecto a la zigosidad, señale la correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Los gemelos monocigotos se desarrollan a partir de dos óvulos fecundados
- ☐ b. Los gemelos monocigotos son fáciles de diagnosticar por el sexo de los fetos
- ☐ c. El diagnóstico de la zigosidad se suele hacer con dos parámetros clínicos
- ☒ **d. El ser mono o dicigótico influye en el riesgo de presentar complicaciones ✓**

Tras la reanimación en el paritorio sería adecuado...

Seleccione una:

- ☐ a. Reponer la medicación usada
- ☐ b. Limpiar el material
- ☐ c. Comprobar que todo el material está repuesto y en perfecto orden
- ☒ **d. Todas las afirmaciones son correctas ✓**

Los gemelos siameses se producen si la división del óvulo se produce:

Seleccione una:

- ☐ a. En los 3 primeros días
- ☐ b. Entre los días 4 al 8
- ☐ c. Entre los días 9 al 12
- ☒ **d. Posterior a los 12-15 días ✓**

Los defectos estructurales precoces se caracterizan por:

Seleccione una:

- ☐ a. Son más frecuentes en los gemelos dicigóticos
- ☐ b. Se producen en la zona caudal y urológica

- ☒ **c. No tienen su origen en alteraciones cromosómicas ✓**
- ☐ d. Si se presentan en un solo gemelo, nos sirven para establecer el origen dicigoto de ambos

Una incubadora nos permite...

Seleccione una:

- ☐ a. Mantener la temperatura corporal del niño
- ☐ b. Administrar oxígeno si fuera necesario
- ☐ c. Realizar una observación directa
- ☒ **d. Todas las afirmaciones son correctas ✓**

Para mantener un ambiente térmico neutro la enfermera no debe olvidar...

Seleccione una:

- ☐ a. Bañar al niño bajo un foco de calor
- ☐ b. Colocar un gorro al nacimiento
- ☐ c. Evitar manejar al niño con las manos frías
- ☒ **d. Todas las afirmaciones son correctas ✓**

¿Qué acceso venoso central no es habitual canalizar en los recién nacidos?

Seleccione una:

- ☒ **a. Vena subclavia ✓**
- ☐ b. Arteria umbilical
- ☐ c. Vena umbilical
- ☐ d. Catéter venoso central de acceso periférico

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

Seleccione una:

- ☐ a. Los partos múltiples suponen un factor de riesgo
- ☐ b. La colaboración entre el servicio de ginecología y pediatría es básica en los partos múltiples
- ☒ **c. La mayor parte de las madres que tienen gemelos no pueden alimentar con lactancia materna exclusiva a sus hijos ✓**
- ☐ d. La Conserjería de Bienestar Social facilita ayudas a las familias de partos múltiples

¿Qué afirmación es errónea?

Seleccione una:

- ☒ **a. La enfermería de neonatología no precisan un alto grado de especialización para realizar su trabajo ✓**
- ☐ b. La colaboración con los padres es muy importante en las unidades de neonatología
- ☐ c. Es misión de la enfermera integrar a los padres en las unidades de neonatología
- ☐ d. El personal de enfermería debe permitir que los padres permanezcan junto a sus hijos todo el tiempo posible

El síndrome de transfusión feto fetal (señale la correcta):

Seleccione una:

- ☐ a. Se produce indistintamente de si la placenta es mono o bicorial
- ☐ b. El feto donante se caracteriza por presentar plétora y policitemia
- ☐ c. Mientras que el feto donante tiene siempre muy mal pronóstico, el receptor suele salir adelante
- ☒ **d. Aunque la afectación principal es hemodinámica y renal, neurológicamente sí que suelen tener secuelas importantes ✓**

Cuando unos gemelos están de alta , no sería correcto que los cuidados...

Seleccione una:

- ☐ a. Se planifiquen con anterioridad
- ☐ b. Incluyan una valoración de familiar y de los niños
- ☐ c. Es una actividad incluye al personal de neonatos y a los padres
- ☒ **d. Se realizan el día del alta ✓**

No se considera un objetivo dentro de los cuidados enfermeros a...

Seleccione una:

- ☐ a. Vigilar el deterioro clínico del neonato
- ☐ b. Atender a la familia de los niños
- ☐ c. Fomentar la lactancia materna
- ☒ **d. Todas las afirmaciones son correctas ✓**

Cuando se prepara el equipo para la reanimación neonatal ¿qué acción no sería adecuada?

Seleccione una:

- ☐ a. Comprobar el equipo de succión
- ☐ b. Verificar el funcionamiento de la luz del laringoscopio

- ☒ **c. No es necesario probar la bolsa de ventilación ✓**
- ☐ d. Abrir la fuente de oxígeno y ajustar el flujo a 5-8 l/m

Respecto a la mortalidad fetal, señale la correcta:

Seleccione una:

- ☒ **a. La muerte de al menos uno de los fetos se produce en un 9% de los embarazos ✓**
- ☐ b. La mortalidad intraparto es tres veces mayor que en los partos monofetales
- ☐ c. El gemelo de mayor riesgo es el primero
- ☐ d. La anestesia materna, adecuadamente indicada por el Obstetra, disminuye las complicaciones perinatales

La prematuridad, en los embarazos múltiples:

Seleccione una:

- ☐ a. Afecta a un 30% de dichos embarazos
- ☐ b. Es el doble que en los embarazos monofetales
- ☒ **c. La edad media al nacimiento es de 36 semanas para los gemelos ✓**
- ☐ d. Aun siendo mayor que en los monofetales, no aumenta el riesgo de complicaciones en los fetos gemelares

Respecto a las gestaciones múltiples, señale la falsa:

Seleccione una:

- ☐ a. Es un embarazo en el que se gestan dos ó más fetos
- ☐ b. Han aumentado en los últimos 20 años
- ☐ c. Los fetos tienen mayor riesgo de presentar complicaciones
- ☒ **d. La incidencia de monocigotos varía mucho según las zonas ✓**

En una sala de neonatología, ¿Qué se debe evitar?

Seleccione una:

- ☒ **a. Mantener las luces intensas con el fin de vigilar mejor a los niños ✓**
- ☐ b. Hablar con un tono medio
- ☐ c. Crear periodos de día y noche
- ☐ d. Todas las afirmaciones son ciertas

¿Cuál de los siguientes objetivos no es primordial para los cuidados de los neonatos?

Seleccione una:

- ☐ a. Vigilar el deterioro clínico del neonato
- ☐ b. Atender a la familia
- ☐ c. Conocer los factores de riesgos maternos y neonatales
- ☒ **d. Todas son correctas ✓**

¿Cuál de las siguientes medicaciones no se administra en los cuidados de rutina en un recién nacido?

Seleccione una:

- ☒ **a. Atropina ✓**
- ☐ b. Vacuna de la hepatitis
- ☐ c. Vitamina K
- ☐ d. Colirio de Aureomicina

Las gasometrías de control en el recién nacido ¿pueden ser?

Seleccione una:

- ☒ **a. Capilares o arteriales si el RN tiene canalizada la arteria umbilical ✓**
- ☐ b. Siempre serán capilares
- ☐ c. Las capilares no son válidas
- ☐ d. Sólo se sacarán gasometrías arteriales

¿Qué material no se considera opcional para la intubación?

Seleccione una:

- ☒ **a. Mascarilla facial ✓**
- ☐ b. Capnógrafo
- ☐ c. Mascarilla laríngea
- ☐ d. Monitor de ECG

Ante un parto múltiple, en paritorio debe haber, al menos:

Seleccione una:

- ☐ a. Una matrona, un anestesista y al menos dos pediatras
- ☐ b. Un obstetra, una matrona, un anestesista, dos pediatras y al menos un enfermero experto cuidados intensivos neonatales
- ☐ c. Un obstetra, una matrona, un anestesista, y al menos un pediatra por cada feto

- ☒ d. Un obstetra, una matrona, un anestesista, un pediatra por cada feto y sería recomendable un enfermero experto en cuidados neonatale ✓

Respecto al riesgo de malformaciones, señale la falsa:

Seleccione una:

- ☐ a. Las presentan un 6% de los embarazos gemelares
- ☒ b. Los gemelos monocigóticos tienen un riesgo de presentar anomalías genéticas algo mayor del doble que los monofetales ✓
- ☐ c. El riesgo de malformaciones en general es mayor en los monocigóticos respecto a los dicigóticos
- ☐ d. Se pueden producir en cualquier momento de la gestación

No sería correcto decir que la arteria umbilical es...

Seleccione una:

- ☒ a. Un acceso venoso periférico ✓
- ☐ b. Permite la administración de fluidos intravenosos
- ☐ c. Se utiliza para sacar gasometrías arteriales
- ☐ d. Permite monitorizar la tensión arterial invasiva

No sería adecuado afirmar que...

Seleccione una:

- ☒ a. En los partos múltiples todos los niños deben ser ingresados en neonatología ✓
- ☐ b. Las técnicas invasivas se limitan para el control de los niños más graves
- ☐ c. Es importante ampliar los periodos de descanso
- ☐ d. Utilizar técnicas de consuelo es muy importante para evitar el dolor en los neonatos

No sería correcto decir que la arteria umbilical es...

Seleccione una:

- ☒ a. Un acceso venoso periférico ✓
- ☐ b. Permite la administración de fluidos intravenosos
- ☐ c. Se utiliza para sacar gasometrías arteriales
- ☐ d. Permite monitorizar la tensión arterial invasiva

La inserción filamentososa del cordón se caracteriza por:

Seleccione una:

- ☐ a. Los vasos umbilicales poseen un exceso de gelatina que los comprime
- ☒ **b. Son vasos placentarios vulnerables a la compresión ✓**
- ☐ c. Es una patología grave pero que puede proteger de hemorragias al feto
- ☐ d. Es una anomalía de los grandes vasos fetales

Cuando ingresa un gemelar ¿qué acción no sería adecuada?

Seleccione una:

- ☐ a. Realizar la somatometría
- ☐ b. Tomar las constantes vitales
- ☒ **c. Prepara una incubadora a 30° ✓**
- ☐ d. Administrar la profilaxis oftálmica

En relación a la valoración de enfermería señale la respuesta falsa:

Seleccione una:

- ☐ a. Es un proceso continuo
- ☐ b. Está basada en las necesidades básicas
- ☒ **c. Se realiza solo al ingreso de los niños en neonatología ✓**
- ☐ d. Permite determinar cuáles son las necesidades que están alteradas

¿Qué material no sería adecuado preparar para la reanimación en el paritorio?

Seleccione una:

- ☒ **a. Gafas nasales ✓**
- ☐ b. Resucitador manual de 250-500 ml
- ☐ c. Laringoscopio
- ☐ d. Son das de aspiración