

Pregunta 1

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Ante un paciente que tras iniciar tratamiento con neurolépticos presenta temperatura corporal elevada, confusión y diaforesis sospechamos de:

Seleccione una:

- a. Gripe estacionaria.
- b. Síndrome neuroléptico maligno.
- c. Síndrome metabólico.
- d. Distonía tardía.

Pregunta 2

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En el plan de cuidados del paciente con SCA, incluiría las siguientes intervenciones de enfermería excepto:

Seleccione una:

- a. Manejo ambiental.
- b. Orientación a la realidad.
- c. Orientación cognitiva.
- d. Apoyo emocional.

Pregunta 3

Sin responder aún
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Nos encontramos ante un paciente que presenta: actividad verbal o motora incrementada, repetitiva y sin propósito, hiperexcitabilidad y síntomas de activación simpática (taquicardia, sudor, boca seca). Sospechamos que el paciente está sufriendo:

Seleccione una:

- a. Brote psicótico.
- b. Trastorno ansiedad generalizada.
- c. Agitación psicomotriz.
- d. Síndrome confusional agudo.

Pregunta 4

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Según la clasificación de los trastornos de la personalidad, cuál de estas afirmaciones es verdadera:

Seleccione una:

- a. En el grupo C incluye los trastornos de la personalidad que suelen parecer raros o excéntricos en sus pensamientos, actitudes y comportamientos.
- b. El grupo A engloba los trastornos caracterizados especialmente por la ansiedad o el temor.
- c. En el grupo B encontramos los trastornos calificados de impulsivos, emotivos o inestables.
- d. En el grupo C se incluyen el resto de trastornos, es decir aquellos no debidos a la ansiedad o temor, que no son impulsivos, emotivos o inestables y de apariencia normal.

Pregunta 5

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Dentro de las intervenciones de enfermería para disminuir la ansiedad se encuentran:

Seleccione una:

- a. Terapia de relajación.
- b. Reestructuración cognitiva.
- c. Autocontrol de la ansiedad.
- d. A y B son correctas.

Pregunta 6

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

De las siguientes alteraciones, ¿cuál no corresponde a una alteración del lenguaje?

Seleccione una:

- a. Bradifemia.
- b. Ecolalia.
- c. Neologismos.
- d. Dismegalopsia.

Pregunta 7

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En la intoxicación por cocaína no aparece:

Seleccione una:

- a. Agitación psicomotriz.
- b. Alteración del juicio de realidad.
- c. Depresión.
- d. Ansiedad.

Pregunta 8

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La definición "aparición súbita de miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos" corresponde a:

Seleccione una:

- a. Agorafobia.

- b. Trastorno de ansiedad generalizada.
- c. Trastorno de pánico.
- d. Trastorno de estrés postraumático.

Pregunta 9

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Dentro de los estresores del ámbito físico no se encuentra:

Seleccione una:

- a. Ruido.
- b. Violencia.
- c. Temperatura.
- d. Catástrofes naturales.

Pregunta 10

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El tratamiento farmacológico de elección para el síndrome confusional agudo son:

Seleccione una:

- a. Benzodicepinas.
- b. Neurolépticos.
- c. Antidepresivos.
- d. No es necesario tratamiento farmacológico, sólo medidas conductuales.

Pregunta 11

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Uno de los signos que indican gravedad en una reacción distónica aguda por antipsicóticos es:

Seleccione una:

- a. Disfagia.
- b. Disfonía.
- c. Disnea.
- d. Todas son verdaderas.

Pregunta 12

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Son medidas importantes para el cuidado de un paciente con síndrome confusional agudo:

Seleccione una:

- a. Control de la iluminación y del ruido de la habitación.
- b. Intentar compensar los déficits sensoriales: gafas, audífonos...
- c. Favorecer el ritmo sueño vigilia.
- d. Todas las anteriores son correctas.

Pregunta 13

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

De las alteraciones neurológicas desencadenadas por el uso de antipsicóticos descritos a continuación ¿cuál es la más grave?

Seleccione una:

- a. Acatisia.
- b. Discinesia tardía.
- c. Contracciones involuntarias de los músculos oculares.
- d. Rigidez.

Pregunta 14

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En una intoxicación por benzodiazepinas con sintomatología de depresión respiratoria...

Seleccione una:

- a. No se debe hacer nada si las benzodiazepinas ingeridas son de vida media corta, ya que se recuperará espontáneamente en unos minutos.
- b. Se debe intubar al paciente.
- c. Se debe administrar adrenalina para prevenir la depresión cardio-respiratoria.
- d. Se debe administrar Flumazenilo para contrarrestar el efecto.

Pregunta 15

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Complete la siguiente frase referente al trastorno bipolar. Los episodios mixtos se caracterizan por la aparición simultánea de sintomatología :

Seleccione una:

- a. Alucinaciones e histeria.
- b. Agresiva y maníaca.
- c. Maníaca y depresiva.
- d. Ninguna de las anteriores.

Pregunta 16

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los signos y síntomas que nos hacen sospechar de la aparición de un síndrome neuroléptico maligno son, entre otros:

Seleccione una:

- a. Dificultad de concentración, disminución de la velocidad del pensamiento, empobrecimiento del lenguaje, apatía, aplanamiento afectivo y reducción de la iniciativa, con una aparición lenta de la sintomatología.
- b. Hipotermia, bradicardia, sudoración, bradipnea y disminución de conciencia con aparición rápida de los síntomas.
- c. Hipertermia, taquicardia, sudoración, estremecimientos, taquipnea y respiración dificultosa, con aparición muy paulatina de los síntomas.
- d. Hipertermia, taquicardia, sudoración, estremecimientos, taquipnea y respiración dificultosa, con instauración rápida de los síntomas.

Pregunta 17

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El rango terapéutico del carbonato de litio es muy estrecho, señala el rango en el que se deben encontrar los niveles de litio en la litemia para ser adecuados:

Seleccione una:

- a. 0,2-0,9 mEq/l.
- b. 0,5-0,9 mEq/l.
- c. 0,5-1,2mEq/l.
- d. 1,2-2 mEq/l.

Pregunta 18

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En las primeras horas del síndrome de abstinencia a opiáceos aparece:

Seleccione una:

- a. Craving, ansiedad, búsqueda de la sustancia.
- b. Midriasis, piloerección, escalofríos, calambres musculares, irritabilidad.
- c. Lagrimeo, sudoración, rinorrea, bostezos.
- d. Insomnio, febrícula, enlentecimiento motor, náuseas, vómitos, taquipnea, taquicardia, hipertensión.

Pregunta 19

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En la atención a las personas con conducta suicida es necesario tener en cuenta:

Seleccione una:

- a. Las personas con muchas tentativas de suicidio no tienen riesgo de cometer suicidio porque saben hasta donde llegar, lo hacen como un método de llamada de atención.
- b. Durante la entrevista clínica, si el paciente no lo expresa voluntariamente es mejor no preguntarle ya que podemos potenciar la idea de suicidio.
- c. Cuando las personas hablan de suicidio no lo van a llevar a cabo.
- d. Ninguna de las anteriores es correcta.

Pregunta 20

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En relación al suicidio se puede afirmar que:

Seleccione una:

- a. Las mujeres realizan con más frecuencia suicidios consumados que los hombres, que son quienes realizan más tentativas de suicidio.
- b. Los momentos con más riesgo de intentos y de suicidios consumados son la adolescencia y la edad avanzada.
- c. Los intentos de suicidio son más frecuentes en personas mayores debido, entre otros factores, a que usan métodos menos letales debido a que tienen menos medios a su alcance.
- d. El riesgo de suicidio disminuye al iniciar tratamiento farmacológico.