

**Pregunta 1**

Sin responder aún  
Puntúa como 1,00

Texto de la pregunta

Las indicaciones de realización de una traqueostomía son (indique la respuesta correcta):

Seleccione una:

- a. Evitar obstrucción de la vía aérea.
- b. Prevenir daño laríngeo en intubaciones prolongadas.
- c. Manejo de secreciones y prevención de aspiración de secreciones orales o gástricas.
- d. Todas las anteriores son correctas.

**Pregunta 2**

Sin responder aún  
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La inflamación superficial y difusa de la faringe, que puede ser de naturaleza infecciosa, alérgica, química o traumática, se denomina:

Seleccione una:

- a. Laringitis alérgica.
- b. Faringoamigdalitis.
- c. Faringitis aguda.
- d. Laringitis aguda.

**Pregunta 3**

Sin responder aún  
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El lavado por irrigación para la extracción de cuerpos extraños alojados en el oído está contraindicado en qué situaciones:

Seleccione una:



a. Objetos que puedan aumentar de volumen con el agua.



b. Pilas de botón.



c. Antecedentes personales de cirugía ótica.



d. Todas las anteriores son correctas.

#### Pregunta 4

Sin responder aún  
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué signos y síntomas son característicos de un cuerpo extraño alojado en el oído?

Seleccione una:



a. Otolgia, otorragia, disminución o pérdida total de la audición, acúfenos, vértigos y tos.



b. Acúfenos, otalgia, náuseas y vómitos.



c. Vértigos, otorrea y acúfenos.



d. Tos, acúfenos, otalgia y sialorrea.

#### Pregunta 5

Sin responder aún  
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale la respuesta correcta sobre el tratamiento de la laringitis alérgica:

Seleccione una:



a. En casos leves: antihistamínicos orales, corticoides tópicos inhalados y mucolíticos.



b. En casos graves: antihistamínicos intravenosos, corticoides sistémicos intravenosos y sueroterapia.



c. En caso de compromiso respiratorio importante: adrenalina intravenosa o intramuscular, intubación orotraqueal o traqueostomía si precisa.



d. Todas las anteriores son correctas.

#### Pregunta 6

Sin responder aún  
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Para la realización de un taponamiento posterior clásico ante una epistaxis, es necesario (señale la respuesta correcta):

Seleccione una:

- a. Analgesiar correctamente al paciente, ya que es un procedimiento doloroso.
- b. Precisa tratamiento antibiótico sistémico.
- c. Es necesario el ingreso hospitalario.
- d. Todas las anteriores son correctas.

**Pregunta 7**

Sin responder aún  
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Con respecto a la educación sanitaria ante problemas óticos, es correcto:

Seleccione una:

- a. Evitar el uso de tapones impermeables.
- b. Uso de bastoncillos de limpieza para evitar la acumulación de secreciones.
- c. Aplicar calor a través de compresas húmedas en el pabellón auricular para disminuir el dolor.
- d. En caso de crisis aguda de vértigo, evitar permanecer tumbado.

**Pregunta 8**

Sin responder aún  
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El taponamiento posterior, ¿en qué tipo de epistaxis está indicado?

Seleccione una:

- a. Superiores o posteriores.
- b. Sangrado leve de las fosas nasales.



c. Sangrado abundante de la parte inferior de las fosas nasales.



d. Ninguna de las anteriores es correcta.

**Pregunta 9**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Dentro de las complicaciones inmediatas de la realización de una traqueostomía percutánea, no encontramos:

Seleccione una:



a. Hemorragia.



b. Enfisema subcutáneo.



c. Estenosis traqueal.



d. Parada respiratoria y/o cardiaca.

**Pregunta 10**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La actitud ante una epistaxis debe ser:

Seleccione una:



a. Identificarla y valorar su repercusión.



b. Asegurar el tratamiento.



c. Encontrar la causa subyacente.



d. Todas son correctas.

**Pregunta 11**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Dentro del tratamiento postquirúrgico del paciente laringectomizado, y más específicamente de los problemas de la traqueostomía y de la cánula, ¿cuál debe ser la frecuencia de limpieza de la cánula interna y cómo ha de realizarse?

Seleccione una:

- a. Varias veces al día con agua caliente, jabón y un cepillo circular.
- b. Una vez al día, solo con agua tibia y un cepillo circular.
- c. Tres veces a la semana, con agua y un antiséptico.
- d. Ninguna de las anteriores es correcta.

**Pregunta 12**

Sin responder aún  
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué signos y síntomas forman la triada clásica de aspiración de cuerpo extraño?

Seleccione una:

- a. Tos súbita más intensa al principio de la aspiración, inspiración disminuida y sibilancias.
- b. Disnea, aleteo nasal, cianosis y estridor.
- c. Afonía, tos crupal y dificultad respiratoria.
- d. Tos súbita menos intensa en el momento de la aspiración, sibilancias y espiración disminuida.

**Pregunta 13**

Sin responder aún  
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En el cuadro clínico de la faringitis aguda grave predominan los síntomas:

Seleccione una:

- a. Locales, como disfagia, odinofagia, constricción faríngea y sensación de quemazón.
- b. Generales, como fiebre, escalofríos y/o cefalea.
- c. Locales, como fiebre, escalofríos o cefalea.
- d. Generales, como disfagia, odinofagia, constricción faríngea y sensación de quemazón.

**Pregunta 14**

Sin responder aún  
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El taponamiento nasal anterior, para no provocar isquemia y necrosis de la mucosa, debe mantenerse un tiempo máximo de:

Seleccione una:

- a. 24 horas.
- b. 48 horas.
- c. 72 horas.
- d. 96 horas.

**Pregunta 15**

Sin responder aún  
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Entre los cuidados de enfermería al paciente traqueostomizado, no encontramos:

Seleccione una:

- a. Cura de la herida cada 24 horas o cuando el apósito se encuentre manchado, únicamente.
- b. Cambiar la camisa interna de la cánula de traqueostomía y limpiar la anterior. La camisa interna de repuesto solo debe permanecer puesta como máximo 15 minutos.
- c. Aspiración de secreciones previa oxigenación con FiO2 del 100% con técnica estéril.
- d. Revisar la presión del neumotaponamiento antes y después de las curas, o cuando lo precise manteniéndola entre 20 y 30 cmH2O.

**Pregunta 16**

Sin responder aún  
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Para la realización de una traqueostomía (percutánea o quirúrgica), la posición en la que debemos colocar al paciente es:

Seleccione una:

- a. Decúbito supino con cuello en hiperextensión.
- b. Decúbito supino con cuello en posición neutra.
- c. Posición semifowler con cuello en hiperextensión.
- d. Posición semifowler con cuello en posición neutra.

**Pregunta 17**

Sin responder aún  
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La enfermedad del oído interno, que afecta a la cóclea y al vestíbulo, de etiología desconocida, se denomina:

Seleccione una:

- a. Enfermedad de Menière.
- b. Síndrome de Menière.
- c. Otitis interna.
- d. Síndrome vertiginoso.

**Pregunta 18**

Sin responder aún  
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cómo se denomina el área responsable de 90% de las epistaxis, que se encuentra en la porción anteroinferior del tabique nasal?

Seleccione una:

- a. Área de Wernicke.
- b. Área de Kisselbach.
- c. Área de Treves.
- d. Área de Broca.

**Pregunta 19**

Sin responder aún  
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál es la secuencia adecuada de intervenciones que debemos llevar a cabo ante un paciente consciente con obstrucción completa de la vía aérea?

Seleccione una:

- a. Maniobra de Heimlich siempre en primer lugar y posteriormente cinco golpes interescapulares.
- b. Inicialmente cinco golpes interescapulares y, si no son efectivos, maniobra de Heimlich.
- c. Únicamente se darán tres golpes interescapulares, y si no son efectivos, realizaremos la maniobra de Heimlich.
- d. Ninguna respuesta anterior es correcta.

**Pregunta 20**

Sin responder aún  
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué es el signo del trago positivo?

Seleccione una:

- a. Presencia de disfagia a líquidos.
- b. Dolor a la palpación del cartílago que se encuentra junto por delante de la entrada al conducto auditivo.
- c. Dolor a la palpación en la parte superior del pabellón auricular.
- d. Dolor al pedir al paciente que trague.

Siguiente