



A Project of the European Multiple Sclerosis Platform

[Inicio](#) [Supporters](#) [Declaración de la Misión](#) [Comité](#) [Acreditación](#) [Mi Plan de Acción](#) [Aprobación](#) [Recursos](#) [Glosario](#) [Comuníquese con Nosotros](#)Módulo 1  
Comprensión de la EMMódulo 2  
Presentación ClínicaMódulo 3  
Diagnóstico y EvaluaciónMódulo 4  
TratamientoMódulo 5  
Cuidado y Apoyo Module 6

Página 3 de 4

**Módulo 2: Presentación Clínica****Acreditación**

Responda a todas las preguntas a continuación escogiendo la mejor respuesta. Debe lograr un resultado de al menos 75% para completar correctamente el módulo y obtener créditos.

**21. ¿Cuál de los siguientes síntomas no se encuentra comúnmente en una persona que sufre de disfunción en el vaciado de la vejiga?**

- ☐ a) Frecuencia
- ☐ b) Nicturia
- ☐ c) Retención
- ☐ d) Exceso de líquido
- ☒ e) Reflujo urinario

**22. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a la disfunción cognitiva en personas con EM es verdadera?**

- ☐ a) Las personas con deterioro sensorial o motor mínimo no tienen riesgo de disfunción cognitiva
- ☐ b) No se ha demostrado una alta correlación entre el alcance de la disfunción cognitiva y los índices de discapacidad
- ☒ c) Los déficits cognitivos y neurológicos se desarrollan en paralelo
- ☐ d) Existe una correlación positiva estrecha entre la evolución de la enfermedad y el desarrollo de la disfunción cognitiva

**23. Los trastornos de la deglución en personas con EM se correlacionan con la gravedad de la enfermedad.**

- ☒ a) Verdadero
- ☐ b) Falso

**24. Algunos ejemplos de dolor neuropático en una persona con EM incluye todo lo siguiente, excepto:**

- ☐ a) Neuralgia del trigémino
- ☐ b) Dolor relacionado con los espasmos tónicos
- ☐ c) Signo de Lhermitte
- ☒ d) Todos los anteriores son ejemplos de dolor neuropático

**25. ¿Cuál de los siguientes eventos o situaciones se ha demostrado en estudios científicos que actúa como un desencadenante de la recaída para algunas personas con EM?**

- ☐ a) Infecciones víricas
- ☐ b) Vacunaciones
- ☐ c) Embarazo
- ☐ d) Período posparto (hasta 3 meses)
- ☐ e) Estrés
- ☐ f) A, C y E

## 1.0 Introducción

## 2.0 Tipos y Características Clínicas

## 3.0 Signos y Síntomas Trépicos

## 4.0 Diferenciación de la Presentación Clínica Inicial y Un Brote

## 5.0 Presentación Atípica

## 6.0 Pronóstico

## Resumen del Módulo

## Evaluación de Acreditación

## Realizar la Evaluación

## Evaluar Módulo

## Lectura Recomendada

## Referencias Completas

## Casos Clínicos



Descarga para imprimir

☐ g) B, D y E☒ h) A, D y E☐ i) Ninguno de las anteriores

## 26. Todas las siguientes afirmaciones son verdaderas acerca del inicio de la EM, excepto:

- ☐ a) La EM puede desarrollarse a cualquier edad, pero se diagnostica más comúnmente entre las edades de 20 y 50 años
- ☐ b) Cuando la EM se desarrolla después de los 50 años, tiende a tener una evolución progresiva más estable
- ☒ c) Cuando la EM se desarrolla después de los 50 años, tiende a tener una evolución más benigna
- ☐ d) Todas las anteriores son verdaderas

## 27. Existen varias formas menos comunes de EM que se han identificado. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

- ☐ a) La EM maligna genera una acumulación rápida de discapacidad importante y puede llevar a la muerte a los meses de su aparición
- ☐ b) La EM benigna exhibe una recuperación completa de ataques aislados, pero con una acumulación pequeña de discapacidad
- ☐ c) El síndrome de Devic es un trastorno inflamatorio producido principalmente en los nervios ópticos y la médula espinal
- ☒ d) Todas las anteriores son verdaderas

## 28. ¿Cuál de los siguientes pacientes tiene el pronóstico más favorable?

- ☒ a) Mujer de 32 años con ataxia y disartria
- ☐ b) Hombre de 28 años con nistagmo y temblores
- ☐ c) Hombre de 42 años con ataques polirregionales frecuentes
- ☐ d) Mujer de 40 años con EM desde los 28 años, con ataques no regionales con dos embarazos

## 29. ¿Cuál de los siguientes resultados de la RM en un ataque inicial se correlaciona con un mayor riesgo de progresar a EMCD?

- ☐ a) Múltiples lesiones en la sustancia blanca en una RM ponderada en T2
- ☐ b) Múltiples lesiones realzadas con gadolinio en RM dT1
- ☐ c) Atrofia cerebral grave
- ☒ d) Todo lo anterior

## 30. ¿Cuál de los siguientes factores clínicos está asociado con una mayor probabilidad de discapacidad en EMRR?

- ☐ a) Sexo femenino
- ☐ b) Aparición inicial de neuritis óptica
- ☒ c) Intervalo corto entre el primer y segundo ataque clínico
- ☐ d) Todo lo anterior

Continuar

[Volver Arriba](#)