

Cuál es la finalidad última del triage

Seleccione una:

- a. Diagnosticar la enfermedad del niño.
- b. Tomar los datos del niño para su identificación.
- c. Priorizar la velocidad de atención de cada niño en función de un sistema de clasificación.
- d. Ninguna de las anteriores.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Priorizar la velocidad de atención de cada niño en función de un sistema de clasificación.

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál no es una razón para realizar un traslado intrahospitalario de un niño

Seleccione una:

- a. Para la realización de técnicas diagnósticas.
- b. Para aumentar la comodidad del niño.
- c. Para su ingreso en planta o en la UCI.
- d. Para llevarlo a quirófano.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Para aumentar la comodidad del niño.

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la etapa de destino debemos comprobar:

Seleccione una:

- a. El procedimiento a realizar.
- b. Colocar los aparatos en un lugar visible y conectarlo si es posible a tomas de pared.
- c. Todas las anteriores opciones son correctas.
- d. La identificación del paciente.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores opciones son correctas.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la etapa de preparación previa para el transporte (señale la incorrecta)

Seleccione una:

- a. Verificar la colocación de la pulsera identificativa.
- b. Asegurarnos de que el trayecto hasta el destino es practicable.
- c. Acompañar con el paciente la documentación necesaria.
- d. Informar a admisión de su traslado.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Informar a admisión de su traslado.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es un factor fundamental para evitar las complicaciones durante el traslado

Seleccione una:

- a. El material adecuado para el traslado.
- b. El personal adecuado para el acompañamiento.
- c. Todas las opciones son correctas.
- d. Comunicación y coordinación previa.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es un modelo de triaje:

Seleccione una:

- a. ESI.
- b. CTAS.
- c. MAT.
- d. PETAS.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: PETAS.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A qué velocidad debemos realizar las compresiones torácicas en el niño

Seleccione una:

- a. 100 - 120 lpm

- b. 70 - 90 lpm
- c. 90 - 100 lpm
- d. Ninguna de las opciones son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 100 - 120 lpm

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Al encontrarnos un niño en un restaurante que comienza a toser repentinamente, qué debemos realizar

Seleccione una:

- a. Dar 5 golpes interescapulares si la tos es ineficaz
- b. Animar a seguir tosiendo si la tos es ineficaz
- c. Ninguna de las opciones son correctas.
- d. Dar 5 golpes interescapulares si la tos es eficaz

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dar 5 golpes interescapulares si la tos es ineficaz

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cómo se debe dar la información a los padres ante el fallecimiento de su hijo. Señale la falsa

Seleccione una:

- a. Elegir un lugar adecuado, para facilitar la intimidad y a solas en una habitación

- b. Explicar inmediatamente y utilizando palabras claras que el niño ha fallecido
- c. Si se les va a solicitar la autopsia o la donación de órganos, esta petición debe hacerse lo antes posible, ya que es muy importante para el adecuado mantenimiento de los órganos.
- d. La actitud debe ser profesional, explicando de forma sencilla y clara lo hechos, pero también compasiva, comprendiendo las actitudes y reacciones de los padres.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si se les va a solicitar la autopsia o la donación de órganos, esta petición debe hacerse lo antes posible, ya que es muy importante para el adecuado mantenimiento de los órganos.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es el acceso vascular de elección en una RCP avanzada

Seleccione una:

- a. Vía intravenosa canalizada antes de un minuto
- b. Vía intraósea
- c. Vía venosa central
- d. Ninguna de las opciones son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vía intravenosa canalizada antes de un minuto

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es la diferencia fundamental entre la RCP pediátrica y la RCP de adultos

Seleccione una:

- a. No hay diferencias fundamentales entre ambas.
- b. En que se deben hacer 5 ventilaciones iniciales y un minuto de RCP antes de buscar ayuda.
- c. Ninguna de las opciones es correcta.
- d. Son completamente distintas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En que se deben hacer 5 ventilaciones iniciales y un minuto de RCP antes de buscar ayuda.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es la energía utilizada para un choque eléctrico en la edad pediátrica

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones son correctas.
- b. 4 J/k
- c. 9 J/K
- d. 5 J/K

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 4 J/k

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Al aumento de la frecuencia respiratoria superficial se llama

Seleccione una:

- a. Taquipnea.
- b. Polipnea.
- c. Bradipnea.
- d. Ninguna de las opciones son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Polipnea.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante un paciente pediátrico con un traumatismo genitourinario. Indica que actuación de enfermería es correcta

Seleccione una:

- a. Dejar el niño en la sala de espera hasta que tengamos una muestra de orina.
- b. Realizar una valoración y recogida de muestras de orina y descartar hematuria micro y macroscópica, vigilar si realiza micción espontánea o se le realiza un sondaje vesical en caso de retención o control de la diuresis del niño.
- c. Si se considera oportuna canalizar una vía venosa de calibre normal.
- d. Ninguna de las opciones son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Realizar una valoración y recogida de muestras de orina y descartar hematuria micro y macroscópica, vigilar si realiza micción espontánea o se le realiza un sondaje vesical en caso de retención o control de la diuresis del niño.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante una otalgia, cuál es la principal patología a descartar

Seleccione una:

- a. Otitis media aguda
- b. Ninguna de las opciones es correcta.
- c. Faringoamigdalitis
- d. Mastoiditis

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mastoiditis

Pregunta **16**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cómo realizaríamos la tolerancia oral en un niño de 2 años que llega a urgencias y es diagnosticado de gastroenteritis aguda

Seleccione una:

- a. procederemos a iniciar la tolerancia oral de forma progresiva, iremos administrando al paciente grandes cantidades cada 5-10 minutos de una solución oral electrolítica.
- b. Ninguna de las opciones es correcta
- c. procederemos a iniciar la tolerancia oral de forma progresiva, iremos administrando al paciente pequeñas cantidades cada 5-10 minutos de una solución oral electrolítica
- d. procederemos a iniciar la tolerancia oral de forma progresiva, iremos administrando al paciente pequeñas cantidades cada 30 minutos de una solución oral electrolítica

Retroalimentación

La respuesta correcta es: procederemos a iniciar la tolerancia oral de forma progresiva, iremos administrando al paciente pequeñas cantidades cada 5-10 minutos de una solución oral electrolítica

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con un niño con sospecha de neumonía, dentro de la sala de observación. Cuál de estos cuidados no debemos realizar

Seleccione una:

- a. Colocaremos al niño en posición decúbito supino.
- b. Todas las opciones son correctas
- c. Realizar lavados nasales o aspiración de secreciones en caso de ser necesario para favorecer la expectoración de secreciones y mantener las vías aéreas libres, y siempre antes de las tomas.
- d. Es importante mantener la Temperatura en valores normales, ya que por cada grado que se aumenta la misma, se incrementa la FR en 4-6rpm.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Colocaremos al niño en posición decúbito supino.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es el principal criterio de riesgo cuando acude un niño a urgencias con disuria o hematuria

Seleccione una:

- a. Picor intenso
- b. Ninguna de las opciones es correcta
- c. Deshidratación
- d. Edad del paciente


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Edad del paciente

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A qué concentración administraremos el oxígeno si sospechamos de una intoxicación por monóxido de carbon

Seleccione una:

- a. Al 50 por ciento
- b. Al 21 por ciento, oxígeno ambiental
- c. Ninguna de las opciones es correcta
- d. Al 100 por cien


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Al 100 por cien

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cómo definimos el casi - ahogamiento

Seleccione una:

- a. Engloba a las víctimas que sobreviven al menos 6h
- b. Engloba a las víctimas que sobreviven al menos 24h
- c. Ninguna de las opciones es correcta
- d. Engloba a las víctimas que sobreviven al menos 12h

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Engloba a las víctimas que sobreviven al menos 24h

Pregunta **21**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuáles son las intoxicaciones medicamentosas más frecuentes en la edad pediátrica

Seleccione una:

- a. Intoxicación por antitérmicos
- b. Intoxicación por productos del hogar
- c. Ninguna de las opciones es correcta
- d. Intoxicación por monóxido de carbono

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Intoxicación por antitérmicos

Pregunta **22**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De estos síntomas cuáles no aparecen en una intoxicación etílica

Seleccione una:

- a. Gastritis aguda
- b. Hipotermia
- c. Depresión del SNC
- d. Hiperglucemia

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hiperglucemia

Pregunta **23**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes cuáles no forman parte de las principales causas de muerte en la edad pediátrica

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones es correcta.
- b. Accidentes de tráfico
- c. Ahogamiento
- d. Heridas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Heridas

Pregunta **24**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes, cuáles son escalas de valoración de la extensión de la superficie corporal quemada

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones es correcta
- b. Lund y Browder
- c. Glasgow
- d. PIPP

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Lund y Browder

Pregunta **25**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con qué tipo de mascarilla podemos llegar a una FiO₂ del 100 por ciento usando un flujo de entre 6-15 l/min

Seleccione una:

- a. Mascarilla Venturi.
- b. Ninguna de las opciones es correcta
- c. Mascarilla simple.
- d. Mascarilla con reservorio.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mascarilla con reservorio.

Pregunta **26**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a la administración de enemas. Indica el correcto.

Seleccione una:

- a. Opción 1: La profundidad es variable dependiendo de la edad del paciente: 2.5-3.5cm en lactantes y 5-7.5cm en niños.
- b. Las opciones 1 y 2 son correctas.
- c. Ninguna de las opciones es correcta.
- d. Opción 2: Presionar e introducir lentamente la solución. En caso de sensación de plenitud, calambres, dolor o reacción vagal, disminuir o suspender la infusión.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las opciones 1 y 2 son correctas.

Pregunta **27**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a la toma de la frecuencia respiratoria. Indica la correcta:

Seleccione una:

- a. Se debe realizar sin que el paciente ejerza ningún tipo de acción sobre su respiración, haciendo que sea lo más natural posible. Comprobar que no haya realizado ningún ejercicio físico ni emocional antes, si es así, esperar 30 - 40 min para realizar la técnica.
- b. Si durante la toma el paciente tose, habla o experimenta algún cambio que pueda alterar el parámetro, se anota y no se repite la medición.
- c. Ninguna de las opciones es correcta.
- d. Dejar al descubierto el tórax de paciente. Observar y contar las elevaciones del tórax y abdomen del paciente durante 1 minuto.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dejar al descubierto el tórax de paciente. Observar y contar las elevaciones del tórax y abdomen del paciente durante 1 minuto.

Pregunta **28**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a la toma de la saturación de oxígeno. Indica la correcta.

Seleccione una:

- a. En condiciones normales debe estar por encima del 90%.
- b. Ninguna de las opciones es correcta.
- c. Hay que tener en cuenta que si vamos a mantener puesto el pulsioxímetro durante días hay que cambiar la localización del sensor una vez al día, para evitar lesiones en la piel.



d. Comprobar que la toma de la saturación que registramos es la que coincide cuando la curva del aparato es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Comprobar que la toma de la saturación que registramos es la que coincide cuando la curva del aparato es correcta.

Pregunta **29**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a las consideraciones a tener en cuenta con el niño a la hora de la realización de una técnica. Indica la correcta.

Seleccione una:



a. Ninguna de las opciones es correcta.



b. Opción 2: Tener en cuenta que cada niño reacciona de manera diferente ante una misma situación, que su reacción no es mejor ni peor, no se debe comparar. Si el niño presenta una rabieta debemos obviarla, manteniendo una actitud firme y positiva.



c. Opción 1: Siempre hay que decir la verdad al niño, ya que la mentira hace perder la confianza del niño hacia los profesionales.



d. Las opciones 1 y 2 son correctas.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las opciones 1 y 2 son correctas.

Pregunta **30**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a las consideraciones que tenemos que tener en cuenta con la familia del paciente a la hora de realizar una técnica. Indica la correcta

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones es correcta.
- b. Siempre que el procedimiento lo permita, serán los padres los que lo realicen, como la toma de medicación oral, recogida de muestra de orina, etc.
- c. Es adecuado pedir ayuda a los familiares para inmovilizar al niño, ya que suponen un apoyo en procedimientos desagradables.
- d. La presencia de los padres durante la realización del procedimiento debe ser obligatoria en todos los procedimientos; en muchas ocasiones la familia va a ser el mejor apoyo que el niño puede tener durante la realización de la técnica.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Siempre que el procedimiento lo permita, serán los padres los que lo realicen, como la toma de medicación oral, recogida de muestra de orina, etc.